

UTICAJ TJELESNOG VJEŽBANJA PO PROGRAMU ZA RAZVO...

By: Sami Sermaxhaj

As of: Jun 25, 2019 7:54:29 PM
50,539 words - 345 matches - 67 sources

Similarity Index

12%

Mode: Similarity Report ▼

paper text:**UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE mr**

58

Sami Sermaxhaj UTICAJ TJELESNOG VJEŽBANJA PO PROGRAMU ZA RAZVOJ GIPKOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS MLADIH FUDBALERA

DOKTORSKA DISERTACIJA Mentor: prof. dr Stevo Popović Komentor: prof. dr Duško Bjelica Nikšić, 2019. i UNIVERSITY OF MONTENEGRO FACULTY FOR SPORT AND PHYSICAL EDUCATION

4

Sami Sermaxhaj, MSc THE EFFECT OF PHYSICAL EXERCISE ACCORDING TO THE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY IN THE ANTHROPOLOGICAL STATUS OF YOUNG SOCCER PLAYERS PhD Dissertation Mentor: Assoc. Prof. Stevo Popović, PhD Comentor: Assoc. Prof. Duško Bjelica, PhD Nikšić, 2019 ii

PODACI I INFORMACIJE O DOKTORANDU Ime i prezime: Sami Sermaxhaj Datum i mjesto rođenja: 10.11.1972. godine, Hogošt, Kosovo Naziv završenog postdiplomskog studijskog programa: Akademske postdiplomske magistarske studije, Fizička kultura Godina završetka: 2005.

4

INFORMACIJE O DOKTORSKOJ DISERTACIJI Naziv doktorskih studija: Akademske doktorske studije, Fizička kultura Naslov teze:

Uticao tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera

Fakultet na kojem je disertacija odbranjena: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore. UDK, OCJENA I ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE Datum prijave doktorske teze: 28. 5. 2015. godine Datum

4

sjednice Senata Univerziteta na kojoj je prihvaćena teza: 19. 11. 2015. **godine Komisija za ocjenu podobnosti teze i kandidata:** 1. **dr**

30

Kemal Idrizović,

redovni profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet **Crne Gore,** predsjednik Komisije 2. **dr** Stevo Popović, **vanredni profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje,** Univerzitet **Crne Gore,** mentor 3. **dr** Duško Bjelica, redovni **profesor Fakulteta za sport i fizičko**

22

vaspitanje, Univerzitet Crne Gore, komentor

Komisija za ocjenu doktorske disertacije: Komisija za odbranu doktorske disertacije: Datum odbrane:

46

i

ZAHVALNICA Posebno zahvaljujem mentoru prof. dr Stevu Popoviću i komentoru prof. dr Dušku Bjelici za profesionalne savjete i kontinuiranu pomoć, od samog početka doktorskih studija, pa sve do završetka doktorske disertacije. Takođe, zahvaljujem Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću,

4

Kolegji Univerzitetu iz Prištine i njegovim profesorima za fizičko vaspitanje, sport i rekreaciju, stručnom timu iz Centra za sportsku medicinu u Prištini, trenerima i fudbalerima Fudbalskog kluba „Ramiz Sadiku“ iz Prištine i

svima koji su dali doprinos i pomogli u realizaciji projekta:

4

„Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera“.

Beskrajno zahvaljujem mojoj porodici koja me sve vrijeme podržavala u svim aspektima ličnog i profesionalnog usavršavanja.

4

ii SAŽETAK Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje uticaja vježbi statičkog istezanja na antropološki status tj. nivo morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod mladih fudbalera, kao i utvrđivanje uticaja redovnog programa rada. Ukupan broj ispitanika bio je 68 mladih fudbalera, (početnika, pionira i kadeta) uzrasta od 11.

do 17. godina iz fudbalskog kluba „Ramiz Sadiku” iz Prištine. Uzorak ispitanika je bio podijeljen na kontrolnu i eksperimentalnu grupu. U istraživanju je primijenjeno 35 varijabli: 17

varijabli za procjenu morfoloških **karakteristika** i 18 **varijabli za procjenu motoričkih** i **12**
funktionalnih **sposobnosti**. Obrada podataka izvršena **je u**

programskom paketu SPSS, verzija 21.0. Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera analiziran je univarijantnom, multivarijantnom i diskriminativnom analizom, dok je uticaj redovnog programa utvrđen na osnovu T-testa i

diskriminativnom analizom. Program rada kontrolne i eksperimentalne grupe realizovan je **66**

u okviru redovnih treninga fudbalskog kluba „Ramiz Sadiku”. Tokom pripremnog i takmičarskog perioda, trenažni program je sproveden tri puta sedmično, za obje grupe. Jedino je različit bio način izvođenja eksperimentalnog programa (17 vježbi statičkog istezanja) za razvoj gipkosti, koji je bio realizovan samo sa eksperimentalnom grupom u okviru povećanog trajanja rada na završnom dijelu treninga. Dobijeni rezultati ukazuju da je primijenjeni program za razvoj gipkosti (vježbe statičkog istezanja) imao statistički značajan uticaj samo u varijabli fleksibilnosti “duboki pretklon u sjedjenju” kod eksperimentalne grupe kategorije kadeta, i bez statistički značajnog uticaja na morfološke karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti ispitanika početnika, pionira i kadeta. Stoga, može se potvrditi da statičke vježbe istezanja imaju značajan uticaj na poboljšanje gipkosti ispitanika starijih od 15 godina, ali bez pozitivnog ili negativnog uticaja na druge varijable morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti mladih igrača. Takođe, rezultati istraživanja potvrđuju da je redovni program treninga uticao na značajne promjene morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod mladih fudbalera. Rezultati ovog istraživanja predstavljaju dalji napredak u prepoznavanju kada i u kojoj mjeri treba primijeniti vježbe statičkog istezanja i njihov uticaj na antropološki status fudbalera. Prema tome, istraživanje ima važnu praktičnu vrijednost posebno u dijelu koji jasno razjašnjava da li vježbe istezanja imaju pozitivan, odnosno negativan uticaj na određene sposobnosti i karakteristike mladih fudbalera, i precizno preporučuje kada ih primjenjivati. Ključne riječi: mladi fudbaleri; antropološki status; gipkost; statičko istezanje; uticaj. iii

ABSTRACT The aim of this research is to establish **the** effect **of the** static stretching **39**
exercise **on the**

anthropological status i.e. the level of morphological characteristics, motoric and functional abilities with young football players, as well as to determine the effect of regular training. The total number of samples was 68 young football players (beginners, pioneers and cadets) age 11 to 17 from Football Club “Ramiz Sadiku” from Prishtina. Samples of participants were divided into control and experimental group. The research implemented 35 variables: 17 variables for estimation of morphological characteristics and 18 variables for estimation of motoric and functional abilities. Data

processing was conducted with the software package SPSS, 21.0 version. The effect of physical exercise according to the program of flexibility on the anthropological status of young football players was analyzed with uni-variant, multi-variant and discriminant analysis, whereas the effect of regular program was established based on T-test and discriminant analysis. The program of control and experimental group was realized within the frame of regular training of Football Club „Ramiz Sadiku“. In the course of preparatory and competition period training program

was conducted three times per week, for both of the groups. Only the manner of 65

execution of experimental program was different (17 exercises of static stretching) for development of flexibility, which was conducted only with experimental group within the frame of increased duration by the end of the training. Acquired results show that conducted program for development of flexibility (exercised of static stretching) have statistically important effect only on flexibility variable "sit and reach test" with the experimental; group of cadets, and with no statistically essential influence on morphological characteristics, motoric and functional ability of beginners, pioneers and cadets. Therefore, it can be confirmed that static exercises have essential effect on improvement of flexibility of samples older than 15 years old, but without positive or negative effect on other variables of anthropological characteristics of young players. As well, results of the research confirm that regular training program had effect essential changes of morphological characteristics, and motoric and functional abilities with young football players. The results of this research present further development in recognizing when and in which manner the static stretching exercises should be implemented and its effect on anthropological status of football players. Furthermore, the research is of practical value especially in the part that clearly explain if flexibility exercise has positive or negative impact on some specific abilities and characteristics of young football players, and precisely recommend when it employed it.

Keywords: young football players; anthropological status; flexibility; static stretching; effect. iv SADRŽAJ 1. 2. 3. UVOD

.....	1 TEORIJSKI OKVIR RADA
.....	3 PROBLEM, PREDMET I CILJEVI ISTRAŽIVANJA
.....	9 3.1. .Problem
istraživanja.....	9 3.2. .Predmet
istraživanja.....	9 3.3.

.Ciljevi istraživanja	9	23
4. 5. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA		
11 METOD RADA	14	5.1.
.Tok i postupci istraživanja	14	5.2.
.Uzorak ispitanika	14	5.3.
.Uzorak varijabli	14	5.3.1.
Opis varijabli morfoloških karakteristika	16	5.3.2.

Opis varijabli motoričkih sposobnosti.....	18	5.3.3.Opis varijabli funkcionalne sposobnosti	20	5.3.4.Opis instrumenata potrebnih za
--	----	---	----	--------------------------------------

sprovođenje mjerenja morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti

.....	21	5.4. .Osnovni zadaci, sadržaj i metode rada sa ispitanicima
.....	21	5.4.1.Struktura redovnog treninga u radu sa ispitanicima
.....	22	5.4.2.Opis i način primjene redovnog programa rada
.....	22	5.4.3.Struktura treninga u radu sa eksperimentalnom grupom ispitanika
.....	23	5.4.4.Opis i način primjene eksperimentalnog tretmana
.....	23	

5.5. .Statistička obrada

32

podataka..... 28 **6. REZULTATI**

I DISKUSIJA 29 **6.1. .Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i**

razlike između grupa na inicijalnom mjerenju 29 6.1.1 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u morfološkim karakteristikama na inicijalnom mjerenju 29
6.1.1.1 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama **na inicijalnom** **mjerenju** 1

kod početnika 30 6.1.1.2 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama **na inicijalnom** **mjerenju** 1

kod pionira 32 6.1.1.3 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama **na inicijalnom** **mjerenju** 1

kod kadeta 34 6.1.2 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u motoričkim sposobnostima na inicijalnom mjerenju 36 6.1.2.1 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim sposobnostima na inicijalnom mjeranju

1

kod početnika 36 6.1.2.2 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim sposobnostima na inicijalnom mjeranju

1

kod pionira 38 v 6.1.3 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim sposobnostima na inicijalnom mjeranju

1

kod kadeta..... 40 6.1.4 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjeranju 42 6.1.4.1 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjeranju

1

kod početnika 42 6.1.4.2 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjeranju

1

kod pionira..... 43 6.1.4.3 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjeranju

1

kod kadeta 44 6.2. .Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa na finalnom mjeranju 46 6.2.1. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u morfološkim

karakteristikama na finalnom mjerenju 47 6.2.1.1. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama na finalnom mjerenju 1

kod početnika 47 6.2.1.2. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama na finalnom mjerenju 1

kod pionira 48 6.2.1.3. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama na finalnom mjerenju 1

kod kadeta 50 6.2.2. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u motoričkim sposobnostima na finalnom mjerenju 52 6.2.2.1. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim sposobnostima na finalnom mjerenju 1

kod početnika..... 52 6.2.2.2. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim sposobnostima na finalnom mjerenju 1

kod pionira..... 54 6.2.2.3. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim sposobnostima na finalnom mjerenju 1

kod kadeta..... 56 6.2.3.Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju 59 6.2.3.1.

Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju

1

kod početnika 59 6.2.3.2. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju

1

kod pionira 60 6.2.3.3. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju

1

kod kadeta 62 6.3. .Analiza razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja

..... 63 6.3.1.Analiza razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja u morfološkim karakteristikama, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe 63

6.3.1.1. Analiza razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja u morfološkim karakteristikama posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe početnika 63 vi 6.3.1.2. Analiza razlika između inicijalnog i

finalnog mjerenja u morfološkim karakteristikama, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe

pionira..... 66 6.3.1.3. Analiza razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja u

morfološkim karakteristikama, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe

kadeta..... 68 6.3.2.Analiza razlika

između inicijalnog i finalnog mjerenja u motoričkim sposobnostima, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe.....

16

71 6.3.2.1. Analiza razlika

između inicijalnog i finalnog mjerenja u motoričkim sposobnostima, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe

16

početnika 71 6.3.2.2.

Analiza razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja motoričkih **spособnosti**, posebno **kod** 1
kontrolne i eksperimentalne grupe

pionira..... 73 6.3.2.3. Analiza razlika

između inicijalnog i finalnog mjerenja u motoričkim sposobnostima, posebno **kod** kontrolne i 16
eksperimentalne grupe

kadeta..... 77 6.3.3. Analiza razlike između inicijalne i finalne mjerenje u funkcionalnim sposobnostima, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe.....

80 6.3.3.1. Analiza razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja u funkcionalnim sposobnostima, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe početnika 80 6.3.3.2. Analiza razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja u funkcionalnim sposobnostima, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe pionira.....

82 6.3.3.3.

Analiza razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja **funkcionalnih sposobnosti**, posebno 1
kod kontrolne i eksperimentalne grupe

kadeta..... 85 7. ZAKLJUČAK

..... 88 LITERATURA

..... 91 PRILOG

..... 99 vii 1. UVOD Fudbal je postao jedan od najpopularnijih, najatraktivnijih i najekspoziranijih sportova današnjice, koji privlači velike svote novca, enormne sponzorske ugovore i televizijska prava, a samim tim i veliku konkurenciju. Generalno gledano, možda i najveću konkurenciju za postizanje uspjeha u nekom sportu, imaju upravo fudbaleri.

Uspjeh u fudbalu zavisi od niza faktora, **među kojima su** najvažniji: morfološke 29
karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti, konativne i kognitivne dimenzije,

kao i motivaciona struktura (Jakšić, 2009). Fudbal je sport koji karakterišu brojne i

raznovrsne složene dinamičke kineziološke aktivnosti sa **velikim brojem cikličnih i** acikličnih 63
 pokreta (Bjelica

i sar., 2013; Gardasevic i sar., 2016b). Samim tim, savremeni fudbal zahtijeva temeljno i sukcesivno praćenje, te provjeru cjelokupnog antropološkog statusa fudbalera od najranijih dana do završetka igračke karijere. Kako bi se dostigao profil vrhunskog fudbalera, potrebna je dugotrajna tjelesna vježba, koja predstavlja didaktički proces oblikovanja vještina i navika. Ciljevi tjelesnog vježbanja u fudbalu jesu: poboljšanje specifične radne sposobnosti igrača, prevencija povreda, unapređenje oporavka igrača i podsticanje i održavanje optimalnog zdravstvenog stanja igrača. Tokom fudbalske utakmice igrač obavlja razne aktivnosti, oko 1200-1400 različitih kretanja, od toga 700-800 su pokreti sa promjenama pravca, sprint, skokovi, zaustavljanja, a samo 11% ukupnog zbira ovih pokreta je izvršeno sa visokim intenzitetom i presudnim uticajem na ishod utakmice (Reilly i Williams, 2003; Stolen i sar., 2005; Hughes i Bartlett, 2008). Može se tako pretpostaviti da je preciznost izvođenja motoričkih performansi odgovorna za sprovođenje ovih pokreta za igrače na visokom profesionalnom nivou u odnosu na amatere na niskom nivou stručnosti (Popović i sar., 2014). Izvođenje velikog broja pokreta u fudbalu (poput sprinta, promjene smjera kretanja, skočnosti, izvođenja tehničkih elemenata, zavisi između ostalog i od gipkosti lokomotornog sistema igrača (amplitudi pokreta u odgovarajućim zglobovima: zglobu kuka, koljena, stopala, leđa, itd.).

Naime, samo fudbaler sa optimalno razvijenom gipkošću, može do maksimalnih granica iskoristiti sve svoje potencijale u ostalim motoričkim sposobnostima, posebno u svim tipovima eksplozivne snage (tipa sprinta, udarca, skoka i bacanja) i agilnosti (Vučetić i sar., 2003).

3

Gipkost je sposobnost izvođenja pokreta sa što većom amplitudom (Lucas i Koslow, 1984; Walker, 2006; Magnusson i sar., 1998; Bjelica i Fratić, 2011; Gardašević i Bjelica, 2013). Statička istezanja decenijama su bila dio obuke zagrijavanja, kao i tokom takmičenja, kako bi se povećala gipkost lokomotornog sistema i sprečavale sportske povrede. Istraživanja posljednje decenije pokazala su da statičko istezanje primijenjeno tokom zagrijavanja, utiče na smanjenje specifičnih motoričkih performansi, odnosno brzinu, agilnost, i eksplozivnu snagu (Nelson i sar., 2004; Chaouachi i sar., 2008; Behm i sar., 2011; Gelen, 2010; Albrecht i sar., 2001; Zakas, 2005; La Torre i sar., 2010; Haddad i sar., 2014; Sayers i sar., 2008). Sprovedena istraživanja ukazuju da usljed zagrijavanja, vježbe dinamične gipkosti treba primijeniti u kombinaciji sa statičkim vježbama istezanja sa kontrolisanim pokretima i optimalnom amplitudom te su efikasniji u razvoju gipkosti i unapređenju eksplozivne snage za sprint (Frederick i Szimanski, 2001; Sporiš, 2007; Andersen, 2005). 1 Posljednji dio treninga, "smirivanje organizma", veoma je važan za oporavak fudbalera. Lagano trčanje i statičko istezanje su tipične aktivnosti ovog dijela, ali je jedna od najkontroverznijih tema u medicini i sportu - kada i u kojem obliku statičko istezanje mora da se koristi i kako to utiče na specifične motoričke sposobnosti. Relaksacija tijela postiže se statičkim istezanjem, kao jedan od osnova procesa primjene preventivnih zaštitnih elemenata kondicione pripreme, odnosno oporavka igrača (Mayorga i sar., 2014). Vježbe statičkog istezanja se izvode bez prisustva tjelesnog pokreta i svi oblici istezanja su efikasni za povećanje amplitude pokreta i za povećanje spojeva (Lucas i Koslov, 1984; Walker, 2006; Magnusson i sar, 1998). Dosadašnja istraživanja ukazuju na prednosti primjene istezanja nakon treninga, odnose se na povećanje amplitude pokreta i smanjivanje rizika od povreda donjih ekstremiteta kod velike napetosti mišića (Witvrouw i sar., 2003). Opšte je poznato da istezanje nakon treninga obezbjeđuje fizičku i mentalnu relaksaciju i opšte raspoloženje. Takođe, iako su istraživanja na tom polju ograničena, smatra se da primjena istezanja nakon treninga smanjuje bol u mišićima nakon izrazitih trenažnih napora (Jamtvedt i sar., 2010). Neki autori smatraju da je važno

uključiti statička istezanja na kraju treninga da bi se nastavilo sa poboljšanjem ukupnog obima pokreta (Taylor i sar., 1990), da bi se otklonili otpadni produkti poput mliječne kiseline i da bi se povećala stopa oporavka sportista (Bale i James, 1991). Nažalost, mnoge fudbalske ekipe ne pridaju dovoljno pažnje pravilnom zagrijavanju i smirivanju organizma, zbog čega je gipkost, kao latentna motorička sposobnost, jedna od slabijih tačaka fudbalera (Popović i sar., 2009). Primjećuje se da treneri mlađih kategorija fudbalera ne pridaju važnost adekvatnim oblicima tjelesnog vježbanja (statičkim i dinamičkim) neophodnim za razvoj gipkosti u fazi zagrijavanja i smirivanja organizma. Glavni razlog primjene vježbi istezanja na kraju treninga je podizanje fleksibilnosti ili amplitude kretanja kao i promovisanje oporavka mišića – relaksacija mišića (Sands i sar., 2013). O vježbama statičkog istezanja kao strategiji oporavka u fudbalu, obimno je diskutovano, ali trenutno nema dovoljno jakih naučnih dokaza da vježbe statičkog istezanja doprinose regenerisanju igrača (Sands i sar., 2013; Nedelec i sar., 2013) i samo 50% profesionalnih klubova u Francuskoj koristi vježbe istezanja na kraju treninga, kao strategiju za oporavak (Nedelec i sar., 2013). Iz svega navedenog, jasno se kristališe israživačko pitanje, da li tjelesno vježbanje usmjereno na razvoj gipkosti (statička istezanja) koje se primjenjuje u fazi smirivanja organizma, treba primijeniti kod mladih fudbalera, i da li te vježbe mogu dovesti do unapređenja i kod drugih antropoloških obilježja mladih fudbalera, te upravo zbog toga je urađeno istraživanje, sa nadom da će pružiti originalan doprinos, kako teoriji tako i praksi.

2. TEORIJSKI OKVIR RADA

Kako se fudbalska igra razvijala, javljale su se nove aktivnosti, tjelesne vježbe i nova znanja, a uloga teorije treninga fudbala bila je da taj razvoj isprati i objasni značaj faktora koji imaju pozitivan uticaj na uspjeh fudbalske igre. Tokom posljednjih godina značajno se povećao broj istraživanja sa mladim kategorijama na unapređenju fudbalske igre. Međutim, posebno mjesto zauzimaju istraživanja uticaja programa rada na antropološki status (morfološke karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti), kao i optimalne metode tjelesnog vježbanja (treninga) za oporavak fudbalera. Morfološke karakteristike predstavljaju karakteristike čovjeka koje opisuju građu tijela na osnovu većeg broja antropometrijskih mjera i sastava tijela. Osnovne morfološke karakteristike su:

longitudinalna dimenzionalnost skeleta, transversalna dimenzionalnost skeleta, cirkularna dimenzionalnost, potkožno masno tkivo

16

i tjelesna kompozicija. Sa ciljem pronalaženja adekvatnih metoda i postupaka izbora dječaka za fudbal, i to longitudinalnim praćenjem nekih antropometrijskih mjera, rezultati istraživanja su pokazali da je program rada sa mladim fudbalerima, značajno poboljšao njihove morfološke karakteristike. Program treninga najviše može da utiče na morfološke varijable za procjenu mase tijela (mišićna masa) i potkožnog masnog tkiva (Helgerud i sar., 2001). Prosječni rezultati vrijednosti longitudinalne dimenzionalnosti skeleta različitih uzrasnih mladih kategorija (od U13 do U19) pokazuju opštu tendenciju povećanja rezultata mjera longitudinalne dimenzionalnosti skeleta tretiranih od mladih ka starijim uzrasnim kategorijama (Radosav 1990; Panojitis i sar., 2005; Vanttinen i sar., 2011). Mjere varijabilnosti ukazuju na to da su početnici najhomogeniji u tretiranim mjerama longitudinalne dimezionalnosti skeleta, dok su stariji pioniri najheterogeniji (Smajić i sar., 2009).

Mladi fudbaleri su bili viši od dječaka iste dobi u opštoj populaciji, što može biti zbog procesa selekcije prema većim i jačim dječacima

4

(Gil i sar., 2007). Takođe, istraživanja su pokazala da su mladi igrači (U11, U13, U15) koji su redovno dvije godine trenirali fudbal, imali drugačiju kompoziciju tijela u odnosu na dječake koji nijesu igrali fudbal (Vänttinen i sar., 2011). Kroz petogodišnju studiju (Philippaerts i sar., 2006) utvrdili su da do najvećeg prirasta dolazi kod $13,8 \pm 0,8$ godina, a najveći prirast u visini i masi za godinu iznosi $9,7 \pm 1,5$ cm te $8,4 \pm 3$ kg. Najveći prirast u visini i masi se poklapa u gotovo istom vremenskom trenutku. Promjene u sastavu tijela (morfološki status) pod uticajem sportskih aktivnosti u fazi rasta i razvoja mladih igrača, u velikoj mjeri prate temeljne promjene motoričkih sposobnosti (snage, brzine, izdržljivosti, koordinacije, agilnosti, gipkosti, itd.) i funkcionalnih sposobnosti (respiratorni i kardiovaskularni sistem). Jedan od najbitnijih i najčešće testiranih segmenata antropološkog statusa su motoričke sposobnosti sportista. Procesi izbora, usmjeravanja i praćenja u području vrhunskog sporta nezamislivi su bez informacija o motoričkim sposobnostima sportista.

Istraživanja motoričkih sposobnosti, s obzirom na ciljeve, nastoje da: definišu motoričke sposobnosti;

6

prate promjene i dinamiku promjena motoričkih sposobnosti i utvrde promjene

strukture motoričkih sposobnosti pod uticajem specifičnih sadržaja treninga u okviru pojedinih perioda i faza priprema za takmičenje

6

(Sporiš, 2007). Ako želimo da provjerimo od čega zavisi uspjeh igrača u fudbalu, mi moramo znati i strukturu pokreta igrača tokom fudbalske utakmice. Istraživanja su pokazala da tokom jedne fudbalske utakmice igrači izvedu različite promjene aktivnosti, mijenjajući ih svakih 4-6 sekundi. Među njima dominiraju česte i brze promjene smjera kretanja, sprintovi, skokovi i neočekivana zaustavljanja (Reilly i Williams, 2003), pa je za pretpostaviti, kako upravo motoričke dimenzije koje su odgovorne za izvođenje tih kretanja, u velikoj mjeri odvajaju vrhunske fudbalere od amatera. Uzme li se u obzir

hijerarhijsku strukturu motoričkih sposobnosti fudbalera, kao i mišljenja fudbalskih stručnjaka, dolazimo do zaključka da su za uspjeh u fudbalu najvažniji: izdržljivost (30%), zatim snaga (20%) brzina (20%), koordinacija sa 15%, preciznost 10% i gipkost sa 5% (Glinder, 1984).

3

Novija istraživanja potvrdila su kako su sposobnosti kao što su: brzina, agilnost, eksplozivna snaga, odgovornije za uspjeh od ostalih (Mujika i sar., 2009; Sermahaj i Telai 2014; Milanović i sar., 2013, Keiner i sar., 2015). Nije dovoljno samo znati relevantne motoričke sposobnosti sa fudbalsku igru, ali moramo znati koliko su važne te motoričke sposobnosti, koliko se mogu razvijati, kada se mogu razvijati (senzitivne faze) i sa kojim programom treninga se mogu razvijati.

Jedan dio motoričkih sposobnosti pod uticajem **je genetičkih faktora, dok je drugi**

3

pod uticajem egzogenih faktora (treeninga). Sa ciljem da se utvrdi uticaj trenažnog procesa na uspješnost fudbalske igre, obavljena su mnoga dosadašnja istraživanja sa mladim kategorijama u prostoru motoričkih sposobnosti. Istraživanja su pokazala da postoje značajne korelacije između bazično-motoričkih i specifično- motoričkih sposobnosti mladih uzrasnih kategorija fudbalera (11-13, 14-16 i 17-18 godina), takođe,

utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika između svih uzrasnih **grupa u**

27

bazično-motoričkim i specifično- motoričkim sposobnostima (Rašić, 1998; Erceg, 2011; Malina i sar., 2004). Utvrđeno je i da su: snaga trupa, eksplozivna snaga, brzina, agilnost, anaerobna izdržljivost, ravnoteža, imali vrhunac razvoja prilikom najvećeg prirasta u visini $13,8 \pm 0,8$ godina (Philippaerts i sar., 2006). Jedino je gipkost imala vrhunac rasta 12 mjeseci nakon GNPV-a (godine najvećeg prirasta u visini).

Kod dječaka uzrasta od 12-14 godina, motoričke sposobnosti koje su testirane, razvijaju se na račun kritičnog, senzitivnog perioda, a nakon 15. godine, testirane sposobnosti pokazuju napredak na račun porasta mišićne snage.

4

Studije potvrđuju i da

motoričke sposobnosti mogu da se razvijaju do 16-17 godine, a nakon tog perioda, prostor za poboljšanje ovih sposobnosti je minimalan

4

(Bugarski i sar., 2013).

Trenažni program rada u pripremnom periodu, gdje uglavnom dominira situacioni treninga, veoma je efikasan način rada u pogledu podizanja nivoa gipkosti fudbalera kadeta

14

(Gardašević i Bjelica, 2013), takođe, u trenažnom procesu treba raditi na ispravljanju mišićnih disbalansa radi uspostavljanja balansa agonista i antagonista. Posebno treba obratiti pažnju na jačanje mišića zadnje lože buta (Doder i Petrić, 2007). Studije pokazuju da je obrtni momenat vrijednosti fleksora koljena i ekstenzora, varirao različito kod obučanih mladih fudbalera u zavisnosti od mišićne grupe i brzine kretanja sa statistički značajnim promjenama samo u fleksoru koljena (Lehnert i sar., 2014). Potvrđena je korelacija između rezultata u primijenjenim testovima za procjenu snage (jačina mišića fleksora i ekstenzora u zglobov koljena) sa rezultatima u primijenjenim testovima za procjenu

agilnosti (Grbović, 2013). Takođe, poznato je da su slabosti mišića ili nejednakosti utvrđene izokinetičkim testiranjem, gotovo uvijek povezane sa trenutnim ili prethodnim povredama (Wrigley, 2000). Rezultati istraživanja uticaja 12 sedmica SAQ programa treninga (speed, agility, quickness) brzine, agilnosti i akceleracije, ukazuju da može biti efikasan za poboljšanje sprinta, ali više istraživanja je potrebno da bi se utvrdile idealne metode obuke za poboljšanje ubrzanja i gipkosti mladih fudbalera (Milanović i sar., 2014). Istraživanje ukazuje i na to da je sezonski fudbalski trening u toku 8 mjeseci bio u stanju da pruži poboljšanje motoričkih sposobnosti u testovima: 5 skokova, skok iz polučučnja sa i bez pripreme i brzine (5m, 10 m, 30 m) kod mladih fudbalera (Hammami i sar., 2013). Značajan broj autora istraživalo je uticaj različitih sadržaja programa rada na funkcionalne sposobnosti fudbalera. Funkcionalne sposobnosti predstavljaju sposobnosti da se efikasno iskoriste energetske procesi u organizmu, a to podrazumijeva efikasnost aerobnih i anaerobnih funkcionalnih mehanizama u organizmu. Vrlo često se u kontekstu fizičke

pripreme povezuju termini izdržljivost i funkcionalne sposobnosti. Takva povezanost je logična s 31
obzirom da su energetske kapacitete preduslov **za** manifestaciju **izdržljivosti.**

Redovni program treninga pozitivno utiče na povećanje volumena krvi i hipertrofiju miokarda, što dovodi do toga da srce pumpa veću količinu krvi u jedinici vremena. Takođe, veća količina kiseonika se prenosi na aktivne mišiće, što omogućava povećanu proizvodnju aerobne energije tokom treninga (Weineck, 2000).

Fudbalski trening ima veliki uticaj na razvoj funkcionalnih sposobnosti, a rezultati su bolji

4

kod starije kategorije fudbalera. (Erceg, 2011). Fudbaleri pionirskog uzrasta iz Španije (Gravina i sar., 2008) imaju vrijednosti unosa kiseonika (57,74 mL/min/kg), međutim, istraživanja fudbalera pionirskog uzrasta iz Tunisa (Chamari i sar., 2005) navode vrijednosti maksimalnog unosa kiseonika u iznosu do 66,5 mL/min/kg. Gil i saradnici (2007) su sproveli istraživanje o fiziološkim karakteristikama mladih fudbalera uzrasta od 14 do 17 godina, maksimalnoj potrošnji kiseonika (VO₂max) koja je određena Astrandovim testom (Astrand, 1980), a najbitnije razlike su uočene između selektiranih i neselektiranih igrača starosti od 14 godina. Rezultati ukazuju da su u periodu puberteta parametri povezani sa tjelesnom zrelošću kao što su visina i masa tjela, brzina, agilnost i maksimalna potrošnja kiseonika (VO₂max) važni u definisanju selektiranih i neselektiranih igrača (Gil i sar., 2007). Utvrđeno je da kod mladih fudbalera od 14 do 18 godina fiziološki relevantni parametri nijesu dovoljno razvijeni u odnosu na razvijenost tijela (Meyer i sar., 2005), tek nakon uzrasta od 16 godina fiziološki parametri dozvoljavaju specifične kondicione podstreke u brzini i specifičnoj snazi kao neophodnim elementima za razvoj fudbalskih sposobnosti. Efikasnost trenažnog rada u predtakmičarskom periodu dovodi do razvoja funkcionalnih sposobnosti kod mladih fudbalera (Raičković, 2007). Rezultati istraživanja (Sporiš, 2007) potvrdili su da su situacioni intenzivni treninzi imali veći efekat od pravolinijskog sprinta na povećanje anaerobne izdržljivosti kod uzrasne kategorije juniora. Potvrđeno je i da je aerobni intervalni trening (dva puta sedmično, u trajanju od 10 sedmica pored redovnog treninga) uticao na pozitivne promjene maksimalne potrošnje kiseonika (4.45 L/min do 4.87 L/min) i relativne potrošnje kiseonika

(63.4 ml/kg/min do 69.8 ml/kg/min)

64

kod kadeta Seltika (McMillan i sar., 2005). Međutim, potvrđeno je da kratki pripremni period nije uticao na značajne promjene respiratornih parametara (forsirani vitalni kapacitet, forsirani ekspiratorni volumen) kod igrača 17-18 godina, koji su trenirali fudbal najmanje 5 godina (Malgorzata i sar., 2018). Kako bi se jasnije shvatio uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera, potrebno je naglasiti da se pod treningom podrazumijeva vježbanje i poboljšanje sposobnosti. Poznavanje pravila, principa, forme, strukture treninga i trenažnih metoda je neophodno za rad. Teorije treninga u fudbalu danas zagovaraju integralni kondicioni aspekt pripreme sportista počev od mlađih kategorija.

Isto tako, važno je naglasiti da dobra kondiciona priprema nije zastupljena samo u pravilnom izboru sadržaja, opterećenja i metoda, već i u oporavku - preventivnim tj. zaštitnim elementima kondicione pripreme.

19

Struktura treninga fudbala se sastoji od uvodnog (pripremnog), glavnog i završnog dijela. Za razliku od dijela zagrijavanja i glavnog dijela, završnom dijelu (oporavak igrača) fudbalski treneri i igrači ne pridaju dovoljno pažnje. Doduše, glavni problem sportiste prilikom modernog treninga jeste kako da se fizički i psihički opusti i relaksira svoje tijelo (Popović, 2009). Zadnji dio treninga je veoma važan za oporavak i smirivanje fudbalera. Lagano trčanje i vježbe istezanja su tipične aktivnosti ovog dijela. Da bi se olakšao proces oporavka, predloženi su različiti načini oporavka nakon vježbanja, široko klasifikovani u dvije kategorije - aktivni i pasivni oporavak (Bompa, 1999). Aktivni oporavak može uključivati lagano trčanje i vježbe istezanja. U praksi, sadašnji aktivni oporavak koristi se u svrhu poboljšanja oporavka tokom hlađenja nakon treninga i nakon utakmica u profesionalnim fudbalskim klubovima (Dabedo i sar., 2004). Takođe, istraživanje pokazuje da istrčavanje u laganom tempu i vježbe statičkog istezanja služe kao trenažna sredstva regeneracije igrača - smirivanja organizma (Rey i sar., 2012), zadatak završnog dijela treninga

je smanjiti napetost, kako fizičku tako i psihičku, što djeluje pozitivno na cijelo tijelo

19

(Chan i sar., 2012). Međutim, nema dovoljno naučnih dokaza koji podržavaju primjenu aktivnog oporavka i njihovu implementaciju. Prednost aktivnog oporavka sa laganim trčanjem je što sprečava stvaranje vena u mišićima, ublažava indukciju bola u mišićima i povećava oporavak kod oštećenja mišića (Tessitore i sar., 2007), a primjena statičkog istezanja poslije vježbanja je preporučena kao preventivna mjera za smanjenje napetosti u mišićima i poboljšanje gipkosti igrača (Chan i sar., 2012).

Mnogi autori napominju (Weineck, 2000; Bangsbo, 1994; Verheijen, 1997), da je optimalno razvijena gipkost fudbalera jedan od preduslova maksimalnog ispoljavanja koordinacije, preciznosti i brzine

17

izvođenja motoričkih

zadataka. U naučnoj teoriji i praksi je poznato da dobro razvijena gipkost (Nićin, 2000) doprinosi pozitivnim promjenama u mišićima i zglobovima. Takođe, ona pomaže u prevenciji od povreda, a razvojem ove sposobnosti poznato je da se smanjuje bol u mišićima i da se poboljšava efikasnost u svim fizičkim aktivnostima (Fernandez i sar., 2016). Na osnovu sprovedenih istraživanja, može se zaključiti da je fudbalerima potrebna optimalna gipkost u zglobu koljena, zatim gipkost kuka, skočnog zgloba, stražnje lože, kičmenog stuba. U isto vrijeme, osim razvoja optimalne gipkosti - pokretljivosti u pomenutim zglobovima, obavezno treba raditi i na razvijanju i dostizanju optimalne snage regiona zglobova kod fudbalera. Igrači sa gipkijim i snažnijim područjima tih zglobova, imaju preduslov da

treniraju i igraju ekonomičnije i racionalnije, uz manju mogućnost povređivanja.

17

Generalno, svaki pokret koji zahtijeva kretanje nekog od djelova tijela do tačke u kojoj se javlja porast amplitude kretanja, može biti nazvan vježbom istezanja. Međutim, postoje različite forme vježbi istezanja, a prema Walker-u (2006), grupisane su u dvije forme: statičku i dinamičku formu vježbi istezanja. Statičke vježbe istezanja su one tjelesne vježbe koje se izvode bez prisustva kretanja, a dinamičke vježbe se izvode uz njegovo prisustvo. O gipkosti i tjelesnom vježbanju gipkosti u fudbalu, kao i o ulozi i uticaju gipkosti u antropološkom smislu, postoje različita mišljenja koja zavise od načina primjene, od toga kada i u kojoj mjeri se koriste određene forme vježbi istezanja (dinamičke i statičke) za razvoj gipkosti (Brandey i sar., 2012). Uticaj na gipkost, ne zavisi samo od motoričkih sposobnosti, nego

i od nekih morfoloških obilježja (od građe zgloba i od elastičnih veza – ligamenata i tetiva), 14

pola, uzrasta, umora, doba dana, temperature, genetike, gipkosti i drugih elemenata. Gipkost kao motorička sposobnost u nedostatku vježbanja padne na određenom stepenu razvoja, tako da može se reći da je genetski koeficijent relativno nizak (Smajić i sar., 2009b). Solverborn (1997) je smatrao da su za održavanje tijela u najboljoj formi potrebna tri faktora podjednako: snaga, koordinacija i agilnost, za koje su potrebne vježbe istezanja prilikom bilo koje vrste treninga u fazi zagrijavanja i tokom završne faze treninga (opuštanja). Anderson (2006) je u ovoj oblasti dao najveći naučni doprinos, dao je temeljne osnove vezane za istezanje, a prema njegovoj teoriji cilj vježbi istezanja jeste ne samo da se poboljša pokretljivost (mobilnost), već i doprinese emocionalnoj dobrobiti, oslobađanju od teškoća i napetosti. Tjelesne vježbe za razvoj gipkosti moraju se prilagođavati specifičnim zahtjevima samoga sporta – fudbala (Albrecht i sar., 2001). Vježbe istezanja za razvoj gipkosti potrebno je raditi postepeno, usavršavati u razdoblju prije puberteta, a posebno u fazama ubrzanog rasta i razvoja, kako bi u seniorskom dobu mogle dovesti do optimalnog nivoa. Rezultati istraživanja razlika između dvije grupe igrača, fleksibilnih i nefleksibilnih, pokazali su da igrači fleksibilne grupe imaju bolje rezultate u testovima sprinta, skokova i agilnosti kod mladih fudbalera, što potvrđuje da gipkost mora biti razvijena kod fudbalera u ranom uzrastu (Garcia-Pinillos i sar., 2015). Tema vježbi istezanja (stretching) je trenutno jedna od najkontroverznijih tema u sportu i medicini. Istezanje treba provoditi u fazi zagrijavanja ili u fazi smirivanja, radi preventive povreda ili sprečavanja mišićne upale i brojnih drugih razloga.

Danas postoje različita mišljenja koja zavise od načina primjene tj. razmatra se kada i u kojoj mjeri

19

korišćenje vježbi istezanja ima prednosti, a kada se ispoljavaju nedostaci istezanja. Međutim, raspoloživi dokazi istraživanja sugeriraju da prije vježbanja istezanja, a posebno statičkog istezanja, nema koristi od prevencije povrede (Albrecht i sar., 2001). Takođe, većina istraživanja ne podržava tradicionalno vjerovanje da statičko istezanje u uvodnom djelu treninga poboljšava sposobnosti - brzinu, agilnost i eksplozivnu snagu igrača (La Torre, 2010; Albrecht i sar., 2001; Nelson i sar., 2004; Sayers i sar., 2008). Zapravo, ogromna većina studija je došla do suprotnog zaključka - da vježbe statičkog istezanja imaju negativan uticaj ako se primenjuju direktno pred testiranje eksplozivne snage, brzine i agilnosti (McHugh, 2006; Kay i Blazeovich, 2011; Behm i Kibele, 2007). Nasuprot tome, drugi istraživači su pokazali da u fazi zagrijavanja, uticaj kombinacije dinamičkog i statičkog istezanja može povećati opseg kretanja bez negativnog uticaja na motoričke sposobnosti (Behm i sar., 2011; Kyranoudis i sar., 2018; Brandey i sar., 2012). Provedena istraživanja sugeriraju da prilikom zagrijavanja treba primijeniti vježbe dinamičkog istezanja u kombinaciji sa vježbama statičkog istezanja koje utiče na razvoj gipkosti i poboljšanje eksplozivne snage tipa sprinta (Frederick i Szimanski, 2001; Sporiš, 2007; Albrecht i sar., 2001; Amiri-Khorasani i Sotoodeh, 2013), a statičke forme istezanja u završnom dijelu treninga - fazi oporavka (Silveira i sar., 2010; Mayorga i sar., 2014; Chan i sar., 2012; Fernandez i sar., 2016). Oporavak igrača sa ciljem opuštanja tijela se postiže statičkim istezanjem, kao jednim od fundamentalnih procesa koji se primenjuje za prevenciju i održavanje komponenti motoričkih sposobnosti (Mayorga i sar., 2014). Neka istraživanja pokazala su da dugotrajna primjena vježbi istezanja doprinosi pozitivnom uticaju na gipkost igrača i bez značajnih promjena na brzinu, agilnost i vertikalne skokove (Fernandez i sar., 2016; Gonçalves i sar., 2013; Akbulut i Agopyan 2015; Zakas 2005). Međutim, mali broj studija istraživao je hroničan uticaj vježbi statičkog istezanja na aktivan oporavak igrača. Rezultati studije (Rey i sar., 2012) pokazuju da oporavak laganim trčanjem (8 minuta) i statičkim istezanjem (12 min), može pomoći poboljšanju vertikalnog skoka, ali ne donosi poboljšanje u brzini, agilnosti i gipkosti kod profesionalnih fudbalera (24 sata nakon treninga). Tessitore i saradnici (2007) su istraživali razlike između dva načina oporavka nakon treninga, tokom pripremnog perioda sa igračima do 19 godina iz fudbalskog kluba „Roma“. Utvrđeno je da nema razlike između oporavka sa laganim trčanjem i statičkog istezanja i oporavka sa aerobnim vježbama u vodi i statičkog istezanja, na motoričke sposobnosti (brzina i vertikalni skokovi). Reilly and Rigby (2002) istraživali su razlike između grupe igrača koja je imala aktivan oporavak (lagano trčanje i vježbe statičkog istezanja) i grupe igrača sa pasivnim oporavkom 24 sata nakon utakmice, te su uočene razlike u korist aktivne grupe u vertikalnom skoku i brzine sprinta na 30m. Na osnovu prethodnih činjenica, naglašeno je da još nije dovoljno poznato u kojoj mjeri vježbe statičkog istezanja koje se primenjuju nakon treninga u fazi aktivnog oporavka, utiču na antropološki status fudbalera. Iz svega navedenog dolazi se do zaključka da postoji neophodnost sprovođenja istraživanja uticaja primjenom vježbe statičkog istezanja na morfološke karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti mladih fudbalera.

3. PROBLEM, PREDMET I CILJEVI ISTRAŽIVANJA

3.1. Problem istraživanja

Osnovni problem ovog istraživanja je da utvrdi: da li će tjelesno vježbanje po programu za razvoj gipkosti doprinijeti promjenama antropološkog statusa tj. nivoa morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ispitanika eksperimentalne grupe. Rezultati istraživanja bi trebalo da prikažu u kojem obimu i kakvom kvalitetu se pojavljuju promjene antropološkog statusa tj. nivoa morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ispitanika. U

skladu sa tim činjenicama, bilo je potrebno dobiti i odgovor na pitanje: da li će

42

tjelesno vježbanje po programu za razvoj gipkosti, kao eksperimentalni faktor, doprinijeti saznanju da se utvrđeni nivo morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ispitanika eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju, statistički značajno razlikuje od nivoa istih antropoloških obilježja ispitanika kontrolne grupe koji učestvuju u redovnom trenažnom radu u svojoj ekipi. 3.2. Predmet istraživanja Predmet ovog istraživanja je eksperimentalni program pripremljen za mlade fudbalere (početnike, pionire i kadete), kao i uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status tj. nivo

morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ispitanika **eksperimentalne grupe.** Predmet istraživanja je, takođe, i

13

redovni trenažni proces mladih fudbalera i njegov uticaj na antropološki status tj. nivo morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ispitanika kontrolne grupe. 3.3. Ciljevi istraživanja Na osnovu predmeta i problema istraživanja, prilikom projektovanja ove studije postavljena su dva cilja: 1. osnovni cilj istraživanja predstavlja utvrđivanje uticaja tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status tj. nivo morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti mladih fudbalera eksperimentalne grupe. 2. dodatni cilj predstavlja utvrđivanje uticaja redovnog programa rada na antropološki status tj. nivo morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti mladih fudbalera kontrolne grupe. Da bi se postavljeni osnovni i dodatni cilj ostvarili, potrebno je da se sa ispitanicima realizuju sljedeći eksperimentalni zadaci: - utvrditi

inicijalno stanje morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod kontrolne i **eksperimentalne grupe** ispitanika; - **utvrditi** kvantitativne i kvalitativne **razlike u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim** sposobnostima **između ispitanika kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju;** - utvrditi **finalno stanje morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod** kontrolne i **eksperimentalne grupe**

13

ispitanika; -

utvrditi kvantitativne i kvalitativne **razlike u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim** sposobnostima **između ispitanika kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju**

13

tj. uticaj eksperimentalnog postupka na morfološke karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti; - utvrditi kvantitativne i kvalitativne razlike između inicijalnog i finalnog stanja u morfološkim karakteristikama, motoričkim i

funkcionalnim sposobnostima kod kontrolne i eksperimentalne grupe. 4. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA Teorijski i praktični dio ovog istraživanja kretaće se oko hipoteze koja je definisana kao nulta hipoteza (H0). Pored nulte hipoteze, postavljeno je još nekoliko hipoteza (Hn) i podhipoteza (Hnn) koje su zavisne od nulte hipoteze i predstavljaju način na koji istraživač može dopuniti svoja saznanja.

Na osnovu definisanog predmeta, problema, cilja i zadataka istraživanja, nulta hipoteza, pomoćne 50
hipoteze i podhipoteze glase: **H0**

– ne postoji statistički značajan uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status tj. nivo morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti; H1 – ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H1.1 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije početnika, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H1.2 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H1.3 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije kadeta, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H2 – ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H2.1 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije početnika, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H2.2 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H2.3 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije kadeta, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H3 – ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H3.1 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije početnika, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H3.2 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H3.3 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije kadeta, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju; H4 – ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H4.1 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije početnika, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H4.2 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H4.3 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije kadeta, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H5 – ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H5.1 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije početnika, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H5.2 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod

testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H5.3 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije kadeta, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H6 – ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H6.1 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije početnika, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H6.2 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H6.3 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije kadeta, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju; H7 – ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne i eksperimentalne grupe; H7.1 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije početnika, između inicijalnog i finalnog mjerenja, kod kontrolne i eksperimentalne grupe; H7.2 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije pionira, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne i eksperimentalne grupe; H7.3 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije kadeta, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne i eksperimentalne grupe; H8 – ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne i eksperimentalne grupe; H8.1 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije početnika, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne i eksperimentalne grupe; H8.2 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije pionira, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne i eksperimentalne grupe; H8.3 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije kadeta, između inicijalnog i finalnog mjerenja, kod kontrolne i eksperimentalne grupe; H9 – ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne i eksperimentalne grupe; H9.1 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije početnika, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne i eksperimentalne grupe; H9.2 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije pionira, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne i eksperimentalne grupe; H9.3 ne postoje statistički značajne razlike rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije kadeta, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne i eksperimentalne grupe. 5. METOD RADA 5.1. Tok i postupci istraživanja Na početku pripremnog perioda bilo je izvršeno inicijalno testiranje antropološkog statusa (morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti) ispitanika kontrolne i eksperimentalne grupe kategorija - fudbaleri početnici, pioniri i kadeti. Nakon primjene četiri mjeseca redovnog i eksperimentalnog programa rada, sprovedeno je finalno testiranje. Mjerenje morfoloških karakteristika obavio je stručni tim iz Centra za sportsku medicinu u Prištini, nezavisno od mjerenja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i realizovano je u ranim prijepodnevnim časovima. Testiranje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sprovedeno je putem nove tehnologije uz neposredno učešće autora ovog rada i sa obučenim stručnim timom Fakulteta za zdravlje, fizičku kulturu, sport i rekreaciju koledža "Universi" iz Prištine. Sva mjerenja izvršena su pod istim uslovima za svaku pojedinačnu grupu ispitanika. Ispitanici su prije samog procesa testiranja bili upoznati o cjelokupnim testovima i metodama rada. 5.2. Uzorak ispitanika Uzorak ispitanika obuhvatio je 68 mlada fudbalera (početnika, pionira i kadeta) uzrasta od 11 do 17

godina fudbalskog kluba "Ramiz Sadiku" iz Prištine, koji su bili aktivni u trenažnom procesu i takmičili se u fudbalskoj ligi za mlade fudbalere na Kosovu. Uzorak ispitanika metodom slučajnog izbora bio je podijeljen na dva subuzorka: ispitanike kontrolne i eksperimentalne grupe. Prije

učešća u eksperimentu, ispitanici su detaljno bili **informisani o cilju istraživanja i planiranim procedurama**

40

mjerjenja. Tabela 1. Uzorak ispitanika po kategoriji i grupi Ispitanici kontrolna grupa eksperimentalna grupa Početnici 10 Pioniri 12 12 Kadeti 12 12 5.3.

Uzorak varijabli U skladu sa postavljenim ciljem, zadacima i hipotezama u ovom **istraživanju**

6

je korišćeno 17 varijabli

za procjenu morfoloških karakteristika, 14 varijabli **za procjenu motoričkih** sposobnosti **i** 4 varijable **za procjenu funkcionalnih sposobnosti.**

43

Predloženi model uzorka antropometrijskih mjera za procjenu morfoloških karakteristika je prihvaćen **na osnovu preporuka**

41

Međunarodnih standarda za antropometrijska mjerjenja - ISAK (Marfell-Jones i sar., 2006) i Priručnika za antropometrijska mjerjenja (Lohman i sar., 1988), a izabrane su sljedeće varijable: 1) Tjelesna visina 2) Dužina noge 3) Sjedeća visina 4) Širina ramena 5) Širina kukova 6) Širina karlice 7)

Srednji obim grudnog koša 8) Obim butine **9) Obim** potkoljenice **10) Kožni nabor** trbuha **11) Kožni nabor** butine **12) Kožni nabor**

24

potkoljenice Sljedeće varijable iz tjelesne kompozicije: 13) Tjelesna masa (0.1kg) 14) Mišićna masa (0.1kg) 15) Masa masnog tkiva (0.1kg) 16) Mišićna masa (%) 17) Masa masnog tkiva (%) Uzorak testova za procjenu motoričkih sposobnosti neophodnih za fudbalsku igru koji su primijenjeni u radu, izrađen je prema preporukama (Radosava i sar 2003; Bjelica i Fratić 2011; Verheijen 1997; Little i Williams 2006), koji su terminološki modifikovani: 1) Duboki pretklon u sjedjenju „seat and reach” 2) Upor ležeći za rukama - sklekovi 3) Podizanje trupa iz ležanja na leđima 4)

Skok iz polučučnja bez pripreme - ruke na bokovima 5) **Skok iz polučučnja sa pripremom – ruke na bokovima** 6) **Maksimalni skok sa pripremom** 5

–zamah rukama 7) Sprint 5m 8) Sprint 10m 9) Sprint 30m 10)

Ajaksov test 5 x 10m 11) **Cik-cak trčanje bez lopte** 11

12) Cik-cak trčanje sa loptom 13) Jačina mišića fleksora u zglobu koljena 14) Jačina mišića ekstenzora u zglobu koljena
Uzorak testova koji su primijenjeni u radu za procjenu funkcionalnih sposobnosti je prema preporukama za procjenu vitalnog kapaciteta pluća spirometrom (Miller i sar., 2005; Erceg 2011) i Astrandov test opterećenja na bicikl-ergometru (Kettler) za procjenu aerobnog kapaciteta je prema preporukama (Gil i sar., 2007; Gjonbalaj 2018). 1)

Forsirani vitalni kapacitet (FVC) i 2) **Forsirani** ekspiratorni **volumen u prvoj sekundi (FEV1)** 17

3) Maksimalna potrošnja kiseonika (VO₂max) i 4) Relativna potrošnja kiseonika (VO₂max) 5.3.1. Opis varijabli morfoloških karakteristika U daljem tekstu daje se opis varijabli morfoloških karakteristika i opis njihovog mjerenja: 1) Tjelesna visina – „Mjerena je antropometrom po Martinu. Pri mjerenju, ispitanik obavezno bos i u gaćicama, stoji u uspravnom stavu na čvrstoj vodoravnoj podlozi. Glava ispitanika bi trebalo da je u takvom položaju da frankfurtska ravan bude horizontalna. Ispitanik ispravlja leđa koliko je moguće, a stopala sastavlja. Ispitivač stoji s lijeve strane ispitanika i kontroliše da li mu je antropometar postavljen neposredno duž zadnje strane tijela i vertikalno, a zatim spušta metalni prsten – klizač, da horizontalna prečka dođe na glavu (tjeme) ispitanika. Tada pročitati rezultat na skali u visini gornje stranice trouglastog proreza prstena - klizača. Rezultat se čita sa preciznošću od 0,1 cm“ (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). 2) Dužina noge – „Mjerena je antropometrom po Martinu. Pri mjerenju, ispitanik obavezno bos i malo spuštenih gaćica, stoji u uspravnom stavu sa sastavljenim petama na čvrstoj vodoravnoj podlozi. Vrh kraka (prečke) antropometra se postavi na lijevu prednje - gornju bedrenu bodlju, a pročitati se njena visina od poda. Rezultat se čita sa preciznošću od 0,1 cm“ (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). 3) Sjedeća visina – „Mjeri se antropometrom. Ispitanik sjedi na stolici, u uspravnom položaju i opruženih nogu (koje ne dodiruju pod), glava je u frankfurtskoj horizontali, instrument dodiruje leđa u sakralnoj i interskapularnoj regiji. Mjeri se udaljenost od podloge stolice do tjemena glave. Rezultat se čita sa preciznošću od 0,1 cm“ (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). 4) Širina ramena – „Mjerena je skraćenim antropometrom po Martinu. Pri mjerenju, ispitanik je u gaćicama i stoji u uspravnom stavu s ležerno opuštenim ramenima. Ispitivač stoji sa zadnje strane ispitanika i postavlja vrhove krakova antropometra na spoljašnji dio jednog i drugog akromiona uz dovoljan pritisak, da se potisne meko tkivo. Rezultat se čita sa preciznošću od 0,1 cm“ (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). 5) Širina kukova – „Mjerena je kod ispitanika koji je u uspravnom stavu sa spojenim stopalima i gaćicama podignutim naviše. Krakovi skraćenog antropometra (pelvimetra) se stavljaju na najlateralnije djelove lijeve i desne kvrge butne kosti - trohanterion tačke. Krakovima skraćenog antropometra bi trebalo pritisnuti mekane djelove tijela. Ukoliko se kod gojaznih osoba pipaju

trohanteri butnih kostiju, ispitaniku se kaže da podigne nogu tako da može lakše da se orijentiše gdje su najisturenije tačke na trohanterima butnih kostiju. Rezultat se čita sa preciznošću od 0,1 cm" (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). 6) Širina karlice – „Mjerena je skraćenim antropometrom po Martinu. Pri mjerenju, ispitanik je u gaćicama koje su malo spuštene i stoji u uspravnom stavu i sastavljenih je peta. Ispitivač stoji sa zadnje strane ispitanika i postavlja vrhove krakova antropometra na jedan i drugi greben karličnih kostiju (na tačke gdje grebene presijeca produžena srednja pazušna linija). Pritisak bi trebalo da je dovoljan da potisne meko tkivo. Rezultat se čita sa preciznošću od 0,1 cm" (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). 7) Srednji obim grudnog koša – „Mjeren je centimetarskom trakom. Pri mjerenju, ispitanik je samo u gaćicama i stoji u uspravnom stavu s rukama opuštenim niz tijelo. Mjerna traka mu se obavije oko grudnog koša uspravno na osovinu tijela, prolazeći horizontalno kroz tačku pripoja 3. i 4. rebra za grudnu kost. Rezultat mjerenja čita se kada je grudni koš u srednjem položaju (pri kraju normalnog izdisaja, odnosno, u pauzi između izdisaja i udisaja). Rezultat se čita sa preciznošću od 0,1 cm" (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). 8) Obim butine – „Mjeren je centimetarskom trakom. Pri mjerenju, ispitanik stoji sa podjednako raspoređenom težinom na obje noge. Stopala su malo odmaknuta i paralelno postavljena. Pantlijka se postavlja vodoravno ispod glutalne brazde. Rezultat se čita preciznošću od 0,1 cm" (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). 9) Obim potkoljenice – „Mjeren je centimetarskom trakom. Pri mjerenju, ispitanik je u gaćicama, stoji u uspravnom stavu s ležerno opuštenim rukama niz tijelo. Mjerna traka se obavije oko lijeve potkoljenice upravno na osovinu u njenoj gornjoj trećini (proba se na 2-3 mesta) i izmjeri na mjestu najvećeg obima. Rezultat se čita sa preciznošću od 0,1 cm" (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). 10) Kožni nabor trbuha – „Mjeren je kaliperom podešenim tako da pritisak vrhova krakova na kožu bude 10gr/mm2. Pri mjerenju, ispitanik je u gaćicama koje su malo spuštene i stoji u uspravnom stavu s ležerno opuštenim rukama niz tijelo i relaksiranim trbuhom. Ispitivač palcem i kažiprstom vodoravno podigne nabor kože na lijevoj strani trbuha u nivou pupka i 5 cm lijevo od njega, pazeći da ne zahvati i mišićno tkivo, obuhvati nabor kože vrhovima krakova kalipera (postavljenih medijalno od svojih vrhova prstiju) i uz pritisak od 10gr/mm2 pročita rezultat. Mjerenje se vrši tri puta, a kao konačna vrijednost se uzima centralna vrijednost. Rezultat se čita sa preciznošću od 0,1 cm" (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). 11) Kožni nabor butine – „Mjeren je kaliperom podešenim tako da pritisak vrhova krakova na koži bude 10 gr/mm2. Pri mjerenju, ispitanik je u gaćicama i stoji uspravno. Ispitivač palcem i kažiprstom uzdužno podigne nabor kože na medijalnoj strani lijeve butine na nivou njenog najvećeg obima, s tim da vodi računa da ne zahvati i mišićno tkivo, zatim obuhvati nabor kože vrhovima krakova kalipera (postavljenih niže od vrhova svojih prstiju) i uz pritisak od 10 gr/mm2 pročita rezultat. Mjerenje se vrši tri puta, a kao konačna vrijednost uzima se centralna vrijednost. Rezultat se čita sa preciznošću od 0,1 cm" (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). 12) Kožni nabor potkoljenice – „Mjeren je kaliperom podešenim tako da pritisak vrhova krakova na kožu bude 10 gr/mm2. Pri mjerenju, ispitanik je u sportskoj opremi i sjedi na stolu ili visokoj klupi, tako da potkoljenica slobodno visi. Ispitivač palcem i kažiprstom uzdužno podigne nabor kože na medijalnoj strani lijeve potkoljenice na nivou njenog najvećeg obima, vodeći računa da ne zahvati i mišićno tkivo, zatim obuhvati nabor kože vrhovima krakova kalipera (postavljen niže od svojih vrhova prstiju) i uz pritisak od 10 gr/mm2 pročita rezultat. Mjerenje se vrši tri puta a rezultat se čita sa preciznošću od 0,1 cm" (Marfell-Jones i sar., 2006; Lohman i sar., 1988). Tjelesna kompozicija

(podaci o masi tijela i sastavu tijela praćeni su na osnovu varijabli): 13) Tjelesna masa 6

(0.1kg), 14) Mišićna masa (0.1kg), 15) Masa masnog tkiva (0.1kg), 16) Mišićna masa (0.1%), 17) Masa masnog tkiva (0.1%). Mjerenje varijabli tjelesne kompozicije izvršeno je aparatom zasnovanim na bio-električnoj impedanci "In body 720" za procjenu tjelesne mase, mišićne mase i mase masnog tkiva (Gil i sar., 2007; Vänttinen, i sar., 2011). Nakon unošenja podataka (visina tijela, godine i pol) ispitanik stane bos na vagu i držanjem ručki elektroda pritisne dugme Start, tako da aparat automatski detektuje stisak i počinje mjerenje. Mjerenje traje 6 minuta, a svi rezultati tjelesne kompozicije (masa tijela, mišićna masa, masa masnog tkiva itd.), očitavaju se na preglednom ekranu.

5.3.2. Opis varijabli motoričkih sposobnosti U daljem tekstu se nalazi detaljan opis varijabli motoričkih sposobnosti.

1) Duboki pretklon u sjedenju – „poznat kao „Seat and Reach” je test za procjenu gipkosti donjeg dijela leđa i hamstringa tj. zadnje lože natkoljenice. Ispitanik sjedi opruženih nogu bez obuće, sa stopalima oslonjenim o prednju stranu klupice. Na znak mjerioca, ispitanik se spušta u pretklon i treba da dohvati mjernu liniju.

Kraj stopala odnosno početak stepenice je nulta tačka. Svi centimetri iznad nule su pozitivni dok 3 centimetar ispod nule, prema koljenima na podu, označavamo negativnim indeksom. Zadatak fudbalera je da izvede što dublji pretklon ispruženim rukama i pokuša ostvariti pozitivan rezultat. Zadrži se 2 sekunde u tom položaju. Test se završava nakon izvođenja tri ispravna pretklona, cilj je izvesti što dublji pretklon. Registruje se maksimalna dubina dohvata u centimetrima, nakon tri pokušaja“

(Sporiš 2007; Fernandez i sar., 2016; Popović i sar. 2009). 2) Upor ležeći za rukama – sklekovi – „Ispitanik se nalazi u uporu ležećem, ruke postavi ispod ramena i zatim opruži ruke, podižući ukrućeno tijelo. Iz tog položaja napravi maksimalan broj pravilnih ponavljanja. Savijanje i opružanje ruku se broji kao jedan ciklus. Svaki ispitanik ima jedan pokušaj, a rezultat je broj pravilno izvedenih ciklusa do otkaza. Test procjenjuje repetitivnu snagu mišića ramenog pojasa“ (Gardašević i sar., 2016b; Radosav i sar. 2003). 3) Podizanje trupa iz ležanja na leđima (Radosav sar. 2003; Molnar i sar., 2009). Ispitanik sjedi, noge su mu savijene u koljenu i fiksirane od strane drugog ispitanika, a palicu drži sa obje ruke iza vrata. Zadatak ispitanika je da dotakne tlo leđima i podigne se ponovo u sjed, što predstavlja jedan ciklus izvođenja. Ispitanik bi trebalo da izvede što više ciklusa, a test se izvodi do otkaza, odnosno koliko pravilnih ciklusa ispitanik može da izvede. Svaki ispitanik ima jedan pokušaj, a rezultat je broj pravilno izvedenih ciklusa do otkaza. Test procjenjuje repetitivnu snagu trupa. 4)

Skok iz polučučnja bez pripreme - ruke na bokovima "Squat Jump-SJ", „izvodi se iz statičnog 5 položaja. Ispitanikove ruke su fiksirane na kukovima,

on stoji u uspravnom položaju nekoliko sekundi iz kojeg se spušta u poziciju polučučnja (noge 7 su flektirane u koljenima pod uglom od 90) gdje miruje 2 sekunde. Nakon faze mirovanja slijedi maksimalan vertikalni skok, te doskok sa laganom fleksijom u koljenima. Slijedi ponovno zauzimanje početnog položaja.

Test je realizovan u tenziometrijskoj platformi "New Test Powertimers" za procjenu eksplozivne snage. Test procjenjuje koncentričnu komponentu eksplozivnosti skoka (visina skoka izmjerena u centimetrima)" Sperlich i sar., 2011; Gonçaves i sar., 2013). 5) Skok iz polučučnja sa pripremom "Counter Movement Jump- CMJ", „izvodi se iz statičnog položaja,

ispitanikove ruke su fiksirane na kukovima (zbog maksimalne izolacije prilikom skoka). On stoji u uspravnom položaju nekoliko sekundi iz kojeg se spušta u poziciju polučučnja (noge su flektirane u koljenima pod uglom od 90 stepeni) i bez zaustavljanja u tački promjene smjera kretanja, izvodi maksimalan vertikalni skok. Slijedi meki doskok sa laganom fleksijom u koljenima, te ponovno zauzimanje početnog položaja.

7

Test je realizovan u tenziometrijskoj platformi "New Test Powertimers" za procjenu eksplozivne snage. Test procjenjuje

ekscentrično-koncentričnu komponentu eksplozivnosti skoka (visina skoka izmjerena u centimetrima)" (Malina i

5

sar., 2004; Gonçaves i sar., 2013). 6)

Maksimalni skok sa pripremom - zamah rukama (Maximal Counter Movement Jump- CMJmax), „izvodi se identično kao skok iz čučnja sa pripremom. Razlika je u tome da se ruke ne izoluju na kukovima, već su u funkciji zamaha (radi postizanja maksimalne visine skoka). Ruke se u početnom položaju nalaze u predručenju u visini grudi. Koordinisano sa spuštanjem u čučanj ispitanik izvodi zaručenje, slijedi maksimalni odraz i zamah rukama kroz fazu predručenja do uzručenja. Test je

7

realizovan u tenziometrijskoj platformi "New Test Powertimers" za procjenu eksplozivne snage. Test procjenjuje

ekscentrično- koncentričnu komponentu eksplozivnosti i koordinaciju ekstremiteta u izvođenju skoka (visina skoka izmjerena u

7

centimetrima)" (Malina i sar., 2004; Gonçaves i sar., 2013). 7, 8, 9) Sprint 30m sa prolaznim vremenom na 5m i 10m.

„Ispitanik iz položaja visokog starta, nakon vizuelnog signala ima zadatak da maksimalno brzo pretrči označenu udaljenost. Test se završava nakon dva ispravno izvedena sprinta (odmor između sprinteva je 2 minuta). Test procjenjuje akceleracije (5m i 10m) i maksimalnu brzinu (sprint 30m). Mjerenje vremena je realizovano uz upotrebu foto-ćelija koje imaju tačnost mjerenja od 1/100 sekunde" (Sander i sar., 2013). 10) Ajaksov test 5 x 10m. „Ispitanik iz položaja visokog starta, nakon vizuelnog signala ima zadatak da maksimalno brzo pretrči udaljenost od 10m pet puta Test se završava

tako što ispitanik nakon petog sprinta protrči između foto-čelija. Mjerenje vremena je realizovano uz upotrebu sistema foto-čelija koje imaju tačnost mjerenja od 1/100 sekunde. Test se koristi za procjenu agilnosti u fudbalu. Test se izvodi dva puta, sa odmorom od tri minuta između ponavljanja" (Verheijen 1997). 11) Cik-Cak trčanje bez lopte. „Ispitanik iz položaja visokog starta, nakon vizuelnog signala ima zadatak da maksimalno brzo pretrči postavljenu cik-cak stazu (mijenjajući pravac za 100° svakih 5 metara) ukupne dužine 20m. Test se koristi za procjenu agilnosti. Pri mjerenju, ispitanici su imali jedan probni pokušaj, a zatim su trčali dva puta sa odmorom od 90 sekundi između ponavljanja. Za statističku obradu korišćen je bolji rezultat. Mjerenje vremena je uz upotrebu foto-čelija koji imaju tačnost mjerenja od 1/100 sekunde" (Idrizovic 2014; Little i Williams 2006). 12) Cik-Cak trčanje sa loptom. „Ispitanik iz položaja visokog starta, sa fudbalskom loptom pored noge koja je bliže startnoj liniji, nakon vizuelnog signala ima zadatak da maksimalno brzo pretrči postavljenu cik-cak (menjajući pravac za 100° svakih 5 metara) stazu ukupne dužine 20m. Prije mjerenja ispitanici su imali jedan probni pokušaj, a zatim su trčali dva puta sa odmorom od 90 sekundi između ponavljanja. Za statističku obradu korišćen je bolji rezultat. Test se koristi za procjenu agilnosti i vještine vođenja lopte. Mjerenje vremena je realizovano uz upotrebu foto-čelija koje imaju tačnost mjerenja od 1/100 sekunde" (Idrizovic 2014; Little i Williams 2006). 13, 14) Maksimalna snaga mišića ekstenzora i fleksora u zglobu koljena. „Testovi za procjenu izokinetičke snage ispitanika vršeni su sa "Isokinetic Dynamometer Biodex System 4". Procjena

jačine mišića vršena je testom naizmjeničnih **maksimalnih kontrakcija izvedenih spontano izabranom frekvencijom.**

6

Na osnovu podataka dobijenih u ovom testu praćeni su maksimumi sila mišića fleksora **i** ekstenzora **u zglobu**

6

koljena. Mjerenje

jačine mišića fleksora **i** ekstenzora **u zglobu** koljena vršeno **je na specijalno konstruisanoj stolici. Stolica je omogućavala fiksiranje** natkoljenice, **karlice i trupa ispitanika u položaju u kome su uglovi u zglobu kuka i** koljena **iznosili 120°/**

6

s.

Merenje jačine mišića fleksora **i** ekstenzora **u zglobu** koljena, **na distalnom** dijelu potkoljenice, **vršeno je kalibrisanom tenziometrijskom sondom** osjetljivom **na istežanje i na sabijanje (Hottinger, tip S9, opseg ±10 kN; linearnost bolja od 1%, tenziona/kompresiona senzitivnost sile 2mV/N).** Tenziometrijska **sonda je**

6

preko pojačivača i AD konvertora, bila povezana sa računarom gdje je izvršena obrada signala. Ispitanik i mjerilac su na kompjuteru, mogli da prate promjene signala (odnosno jačine) u toku trajanja testa.

6

Na osnovu razlike između maksimalne jačine (maksimalna vrijednost tokom cijelog testa) i minimalne jačine (koja se računa za prvih 200 zapisa) dobijene su varijable - maksimumi jačina mišića fleksora i ekstenzora u zglobu

6

koljena za test naizmeničnih mišićnih kontrakcija. Za procjenu jačine mišića fleksora i ekstenzora u zglobu koljena testirana je dominantna „bolja“ noga.

Ispitanici su prije testiranja na Biodex sistemu 4, imali 6 minuta zagrijavanja na bicikl ergometru.

20

Ispitanici su izvodili pet kontinuiranih maksimalnih ponavljanja na obje brzine sa pauzom od 30 s između tih brzina. Vršena vrijednost svakog od ovih 5 testiranih ponavljanja bila je zabilježena za kasnije statističke analize“

20

(Lehnert i sar., 2014; Brito i sar., 2010; Grbović 2013). 5.3.3. Opis varijabli funkcionalne sposobnosti Procjena vitalnog kapaciteta pluća ispitanika obavljena je sa "Spirometrom" u okviru kojeg su praćene varijable: 1)

Forsirani vitalni kapacitet (FVC) koji predstavlja volumen vazduha što se nakon maksimalne inspiracije može izdahnuti iz pluća maksimalnom ekspiracijom; 2) Forsirani ekspiracijski volumen u prvoj sekundi (FEV1) je

25

„zapremina vazduha, koja se poslije maksimalnog inspirijuma, snažnom i forsiranom ekspiracijom, izduva u prvoj sekundi. Ispitanik je u stojećem položaju, duboko udahne vazduh i zadrži ga par sekundi, a zatim stavi usni nastavak spirometra sa piskom u usta i energično izdahne sav vazduh iz pluća. Ovim putem se registruje krivulja maksimalnog ekspiracijskog protoka tj. volumena. Svaki ispitanik imao je tri pokušaja, a upisuje se očitani rezultat na spirometrijskoj skali u cm³“ (Miller i sur., 2005, Erceg 2011); 3) Maksimalna

potrošnja kiseonika (VO2max) **L/min;** 4) **Relativna potrošnja kiseonika** (VO2max) **ml/kg/min;**

17

„Maksimalna i relativna potrošnja kiseonika (VO2max) mjerene su Astrandovim testom na bicikl ergometru za određivanje kondicije (procjena maksimalne i relativne potrošnje kiseonika) putem mjerenja "FS" frekvencija srca tokom jednog sub-maksimalnog opterećenja. Test počinje mjerenjem frekvencija srca ispitanika u stanju mirovanja, zatim se odredi intenzitet opterećenja (koji su u ovom istraživanju bili određeni od strane stručnog kadra Nacionalnog centra za sport i medicinu). Test je trajao 6 minuta i vodilo se računa da frekvencije srca budu više od 120, ali ne preko 170" (Gil i sar., 2007; Gjonbalaj, 2018). 5.3.4. Opis instrumenata potrebnih za sprovođenje mjerenja morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti Primijenjeni mjerni instrumenti pokazali su se u velikom broju istraživanja kao testovi koji ispunjavaju metodološke kriterijume, tj. zadovoljavaju osnovne metrijske karakteristike. Uzorak mjernih instrumenata za procjenu morfoloških karakteristika: • Antropometar po Martinu (GPM, Swiss made) za procjenu tjelesne visine, dužine noge, sjedeće visine, širine ramena, širine kukova i širine karlice; • Metalna centimetarska traka za procjenu obima grudnog koša, obima butine i obima potkoljenice; • Kaliper (GPM, Swiss made) za procjenu kožni nabor trbuha, kožni nabor butine i kožni nabor potkoljenice; • In body 720 (Seoul, Korea) aparat zasnovan na bioelektričnoj impedanci za procjenu tjelesne mase, mišićne mase i mase masnog tkiva. Uzorak mjernih instrumenata za procjenu motoričkih sposobnosti: • Sjedeća klupa sa lenjirom dužine 40 cm „Seat and Reach" za procjenu gipkosti mišića zadnje lože buta i pokretljivosti kičmenog stuba. • Tenziometrijska platforma (New Test Powertimers 300, Newtest Oy, Tyrnävä, Finland) za procjenu eksplozivne snage

(skok iz polučučnja bez pripreme - ruke na bokovima, skok iz polučučnja sa pripremom – ruke na bokovima i maksimalni **skok sa pripremom**

5

–zadah rukama); • Foto – ćelije (New Test Powertimers 300, Newtest Oy, Tyrnävä, Finland) za procjenu brzine i agilnosti (Sprint 30m sa prolaznim vremenom na 5m i 10m, Ajaksov test 5 x 10 m i Cik-Cak trčanje bez i sa loptom); • Isokinetik

Dynamometer Biodex System 4 (Biodex Medical Systems, New York, USA),

67

za procjenu izokinetičke snage (jačina mišića fleksora i ekstenzora u zglobu koljena); Uzorak mjernih instrumenata za procjenu funkcionalnih sposobnosti: • Spirometar (BTL-OB MT Plus ec) za procjenu forsiranog vitalnog kapaciteta i forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi; • Bicikl-ergometar (Kettler) za procjenu aerobnog kapaciteta (maksimalna i relativna potrošnja kiseonika (VO2max). 5.4. Osnovni zadaci, sadržaj i metode rada sa ispitanicima Cjelokupan program rada (redovni i eksperimentalni) sa kontrolnom i eksperimentalnom grupom realizovali su treneri fudbalskog kluba "Ramiz Sadiku" iz Prištine koji su bili upoznati sa svim specifičnostima redovnog i eksperimentalnog programa rada,

ali i sa svakim pojedinačnim treningom i testom koji se sprovodi **u sklopu ovog istraživanja,**

3

uz neposredno učešće autora ovog rada. Treneri su diplomirali na fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i licencirani su od UEFA-e. Tokom četvoromjesečnog rada, kontrolna i eksperimentalna grupa prošle su identičan pripremni i takmičarski period sa tri treninga sedmično, ukupno 48 treninga. Plan i program rada pripremljen je od strane autora ovog istraživanja na osnovu preporuka Njemačke i Švajcarske fudbalske federacije i nekoliko autora koji predstavljaju eminentne stručnjake kada je ova oblast u pitanju (Bisanz i Gerisch 2008; Radosav i sar., 2003; Bjelica i Popović 2012; Jankovski 2015). Detaljan program rada nalazi u prilogu. Jedino je različit bio način izvođenja eksperimentalnog programa (vježbi statičkog istezanja) za razvoj gipkosti koji je realizovan sa eksperimentalnom grupom u okviru povećanog trajanja rada u završnom dijelu treninga. 5.4.1. Struktura redovnog treninga u radu sa ispitanicima Struktura redovnog treninga bila je kvartalna, a sastojala se iz uvodnog, pripremnog, glavnog i završnog dijela. Uvodni dio (5-7 minuta)

imao je za cilj da zagrije organizam ispitanika **i uvede ispitanike organizovano u rad, za realizaciju zadataka u glavnom dijelu.**

18

Pripremni dio (10-15 minuta)

imao je za cilj angažovanje **cijelog mišićnog sistema, pripremu mišića, posebno tetiva i ligamenata, za**

18

realizaciju zadataka u glavnom dijelu. Glavni dio (35-45 minuta) imao je programske sadržaje u skladu sa planom i programom rada sa djecom uzrasta 11 i 17 godina. Završni dio (10 minuta) imao je za cilj da podstiče procese oporavka, odnosno utiče na postepeno smirivanje

svih funkcija organizma i emocija igrača, primjenom sredstava **manje dinamičnosti i slabog intenziteta.**

18

5.4.2. Opis i način primjene redovnog programa rada Na osnovu metodologije primjene tehnički i taktički programskog sadržaja u igri fudbala i principa valorizacije opterećenja tokom sedmičnih ciklusa (tri treninga sedmično), na prvom je treningu na početku svake sedmice dominirala komponenta tehnička priprema, na drugom treningu komponenta kondiciona priprema, a na trećem treningu komponenta taktička priprema i vikendom prijateljske utakmice u pripremnom periodu i takmičarske utakmice tokom takmičarskog perioda. Sadržaj programa zasnovan je na četiri komponente: kondiciona (KO), tehnička (TE), taktička (TA) i mentalna (ME) pripremljenost, koji su razrađeni u tabeli 2. Tabela 2. Opis osnovnog sadržaja programa rada sa ispitanicima ovog istraživanja Uzrasna kategorija Početnici

U12/U13 Pioniri U14/U15 Kadeti U16/U17 Sadržaj treninga Bazični i specifični trening Trening izgradnje igre Trening osvajanja rezultata Glavni zadaci prilikom obučavanja KO-kondicija TE-tehnički TA-taktički, ME-mentalno KO- razvijanje bazične i koordinativne sposobnosti TE- učenje elemenata tehnike u različitoj formi TA- upoznavanje sa osnovnim taktičkim zadacima (odbrana i napad) ME- uz igru druženja i zabavljanja KO- razvijanje koordinacije, bazične izdržljivosti, jačanje mišićne mase i brzine TE- vježbe za poboljšanje tehnike igre. TA- učenje elemenata taktike igre (individualnih i grupnih), poboljšanje fudbalske igre ME- druženje, motivacija, komunikacija, samopouzdanje KO- razvijanje brzinske snage, koordinacije i brzine, izdržljivosti (aerobna- anaerobna) TE- situaciona primjena elemenata tehnike igre TA- kolektivna taktika u funkcionisanju sistema igre (uvježbavanje fudbalske igre) ME- motivacija, hrabrost, želja za pobjedom, timski duh

5.4.3. Struktura treninga u radu sa eksperimentalnom grupom ispitanika

Kako je već pomenuto, eksperimentalni program vježbanja za razvoj gipkosti bio je realizovan u okviru povećanog trajanja rada u strukturi treninga, a to povećanje realizovano je kao peti dio treninga i ogledao se u eksperimentalnom programu vježbi istezanja. Njime nijesu bili obuhvaćeni ispitanici kontrolne grupe. Prema tome, struktura treninga kod eksperimentalne grupe bila je petodjelna i sastojala se iz uvodnog, pripremnog, glavnog, završnog i eksperimentalnog dijela. Sami eksperimentalni dio (u trajanju od 15 minuta) bio je realizovan sa eksperimentalnom grupom i imao je za cilj da putem tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti, izazove uticaje na nivo morfoloških karakteristika, motoričke i funkcionalne sposobnosti kod mladih fudbalera.

5.4.4. Opis i način primjene eksperimentalnog tretmana

Ekperiment je trajao četiri mjeseca (pripremnog i takmičarskog perioda) sa po tri treninga sedmično, što je ukupno 48 treninga eksperimentalnog tjelesnog vježbanja. Ekperimentalna grupa (za razliku od kontrolne grupe) osim redovnog treninga, realizovala je i eksperimentalni program vježbi istezanja za razvoj gipkosti. Ovaj program je pripremljen na osnovu preporuka nekoliko autora koji predstavljaju najeminentnije svjetske stručnjake kada je ova oblast u pitanju (Anderson 2006; Walker 2006), a realizovan je od trenera fudbalskog kluba "Ramiz Sadiku" iz Prištine, uz neposredno učešće autora ovog rada. Sadržaj eksperimentalnog dijela treninga koji je bio sproveden sa ispitanicima eksperimentalne grupe sastojao se iz 17 vježbi istezanja statičkih formi koji je detaljno razrađen u tabeli 3.

Tabela 3. Opis eksperimentalnih tjelesnih vježbi, doziranje i grafički prikaz

Broj vježbe	Opis vježbe i doziranje	Grafički prikaz
1.	Istezanje vrata naprijed, gore, desno-lijevo (Neck stretch; forward, upwards, right-left) Početni stav je raskoračni, ruke su o bok, istezati glavu nazad, napred, lijevo i desno. Zadržati svaki položaj po 20 sekundi. Istezanje trupa i ruku, gornji dio leđa (Trunk Stretch; Upper Back) Početni stav je raskoračni, prsti su prepleteni 2. s opruženim rukama iznad glave, dlanovima okrenutim prema gore, gurati ruke lagano unazad i nagore dok se ne osjeti istezanje u rukama, ramenima i gornjem dijelu leđa. Zadržati položaj 20 sekundi.	
3.	Istezanje trupa, grudi i leđa (Trunk Stretch; Chest & Back) Početni stav je raskoračni, prsti su prepleteni iza leđa, lagano okretati laktove prema unutra opružajući ruke, zatim podizati ruke iza leđa prema gore dok se ne osjeti istezanje u rukama, ramenima i prstima. Zadržati položaj 20 sekundi.	
4.	Istezanje trupa, ramena i gornji dio leđa (Trunk Stretch; Shulder & mid – upper Back) Početni stav je raskoračni, prsti su prepleteni u visini ramena, dlanove okrenuti prema van i istezati ruke prema naprijed dok se ne osjeti istezanje u ramenima, središnjem dijelu leđa, rukama, dlanovima i prstima. Zadržati položaj 20 sekundi.	
5.	Istezanje trupa, rame i triceps (Trunk Stretch; Shoulder & triceps) Početni stav je raskoračni, sa rukom iznad glave uhvatiti lakat sa druge strane, lagano ga povlačiti iza glave i prema dolje, dok se ne osjeti istezanje troglavog mišića nadlaktaka. Zadržati položaj 20 sekundi.	
6.	Istezanje trupa, lateralna fleksija-desno-lijevo (Trunk Stretch; Lateral flexion right-left) Početni stav je raskoračni, stopala su u širini ramena, koljena malo savijena, ruke opružene iznad glave, lijevom uhvatiti dlan desne ruke i polako se nagnuti u lijevo, lijevom rukom povlačiti desnu preko glave i prema dolje. Zadržati položaj 20 sekundi.	
7.	Istezanje zadnje lože buta (Two Leg Hamstring Stretch) Početni stav je raskoračni, stopala u širini ramena, laganim spuštanjem u kukovima dohvatiti prste na nogama, koljena se opružaju	

dok se ne osjeti istežanje u zadnjoj loži buta. Zadržati položaj 20 sekundi. 8. Istežanje leđa i Ahilove tetive (Achilles & Back Stretch) Iz stojećeg položaja čučnuti cijelom površinom stopala na tlo i nožnim prstima pod uglom od 15 stepeni, pete su razmaknute od 5 do 15 cm zavisno od razgibanosti ispitanika, koljena držati sa spoljne strane i lagano istežati prednji dio potkoljenice, koljena, leđa, zglobove, Ahilovu tetivu i dublji dio prepona. Zadržati položaj 20 sekundi. Istežanje kvadricepsa (Quadriceps Stretch) Desnom rukom uhvatiti vrh lijevog stopala 9. iznad zgloba stopala. Lagano spuštati prednji dio kuka i nježno privlačiti lijevu petu prema sredini stražnjice dok se ne osjeti lagano istežanje četvoroglavog mišića prednje lože buta. Zadržati položaj 20 sekundi. Istežanje preponskog dijela (Hamstring Groin Stretch) Iz upora ležećeg za rukama s prednjim koljenom tačno iznad zgloba stopala, težinu tijela 10. prebaciti na prste i jastučić zadnjeg stopala, zadržati taj položaj lagano se istežući i nastojati zadnju nogu držati opruženu. Spuštati prednji dio kuka dok se ne osjeti istežanje u preponama, zadnjoj loži buta i zadnjem dijelu koljena zadnje noge. Zadržati položaj 20 sekundi. Istežanje preponskog dijela (Standing Groin Stretch) U sjedećem položaju sastaviti stopala i 11. obuhvatiti ih rukama, pete zadržati na ugodnoj udaljenosti od prepona, lagano privući trup prema naprijed dok se ne osjeti lagano istežanje u području prepona. Zadržati položaj 20 sekundi. Istežanje preponskog dijela (Groin Stretch) Iz ležećeg položaja na leđima sa zatvorenim 12. očima sastaviti stopala dok koljena padaju sa strane, opustiti kukove i omogućiti sili teže da isteže područje prepona. Zadržati položaj 20 sekundi. Istežanje grudnog dijela (Chest Stretch) Iz ležećeg položaja na leđima, privući desnu nogu 13. prsima, potiljak zadržati na tlu, naprezati se lagano dok se ne osjeti istežanje ruka, ramena, kičme, trbuha, međurebarnih mišića, grudi, stopala i zglobova. Zadržati položaj 20 sekundi. Istežanje zadnje lože buta u sjedećem položaju (Sitting Hamstring Stretch) Iz sjedećeg položaja opružiti desnu nogu, a lijevu 14. saviti, lijevo stopalo okrenuti prema unutrašnjoj strani desne butine, iz kukova se nagnuti dok se ne osjeti napetost u zadnjoj loži buta i donjem delu leđa. Zadržati položaj 20 sekundi. Istežanje spoljne lože buta (Lower Back Stretch) Iz sjedećeg položaja opružiti desnu nogu, saviti 15. lijevu nogu, lijevo stopalo prebaciti preko desne noge položiti ga sa spoljne strane desnog koljena. Koljeno privući prema suprotnom ramenu dok se ne osjeti zatežanje u spoljnoj loži buta. Zadržati položaj 20 sekundi. Istežanje zadnje lože buta iz sjedećeg položaja (Two Leg Seated Hamstring Stretch) Iz sjedećeg položaja sa opruženim rukama i stopalima okrenutim prema gore, pete su 16. razmaknute na 15 cm. Nagnuti se iz zgloba kuka naprijed da bi se osjetilo istežanje iza koljena i zadnjem dijelu natkoljenice, a i u donjem dijelu leđa (koljena su opružena). Zadržati položaj 20 sekundi. Istežanje Ahilove tetive (Achilles Tendon Stretch) Vrhove prstiju jednog stopala postaviti u ravnini prednjeg ruba koljena druge noge. Peta savijene 17. noge može biti podignuta od tla 1 cm. Spuštati petu prema dolje, a butinu gurati grudima prema naprijed. Nije cilj spustiti petu na tlo, već pritiskom ramena i butine lagano istegnuti Ahilovu tetivu. Zadržati položaj 20 sekundi. 5.5. Statistička obrada

podataka Obrada podataka u ovom istraživanju i primjena statističko matematičkih postupaka je
izvršena u programskom paketu **SPSS,**

36

verzija 21.0. Za sve varijable bilo je potrebno izračunati parametre deskriptivne statistike: aritmetičku sredinu (Mean), standardnu devijaciju (Std.Dev.), minimalnu vrijednost (minimum), maksimalnu vrijednost (maximum), koeficijent asimetričnosti (Skewness) i koeficijent zakrivljenosti (Kurtosis) Univarijantnom analizom varijanse (ANOVA) su utvrđene kvantitativne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe za svaku varijablu pojedinačno na inicijalnom i finalnom mjerenju. Multivarijantnom analizom varijanse (MANOVA) su utvrđene međugrupne kvantitativne razlike na inicijalnom i

finalnom mjeranju. Kanoničkom diskriminativnom analizom su utvrđene kvalitativne razlike i hijerarhija promjenljivih koje doprinose razlikovanju (diskriminaciji) između grupa,

na inicijalnom i finalnom mjeranju. T-testom za male zavisne uzorke

60

su utvrđene značajne kvantitativne

razlike između inicijalnog i finalnog mjerjenja, posebno, kod eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanika.

2

Nivo značajnosti za sve statističke analize određen je na $p < 0,05$. 6. REZULTATI I DISKUSIJA U ovom poglavlju će biti testirane hipoteze postavljene u ovoj doktorskoj disertaciji. Radi što jasnijeg prikaza dobijenih rezultata, ovo poglavlje je podijeljeno na tri podpoglavlja i to: u prvom i drugom dijelu se analiziraju parametri deskriptivne statistike, kvantitativne i kvalitativne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima

3

ispitanika početnika, pionira i kadeta, tokom inicijalnog i finalnog mjerjenja. U trećem dijelu analiziraju se kvantitativne i kvalitativne

razlike između inicijalnog i finalnog mjerjenja, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe. 6.1. Analiza

1

osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa na inicijalnom mjeranju U prvom dijelu su prikazani rezultati analize osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima

3

ispitanika u inicijalnom mjeranju. U ovoj analizi prikazani su podaci: Osnovni deskriptivni parametri :

minimalni rezultat (Min), maksimalni rezultat (Max), srednja vrijednost i standardna devijacija (Mean \pm SD), koeficijent asimetričnosti (Skew) i koeficijent zakrivljenosti (Kurt).

35

Za utvrđivanje kvantitativne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe za svaku varijablu pojedinačno primijenjena je univarijantna analiza varijanse (ANOVA): vrijednost koeficijenta za testiranje značajnosti razlika (F – odnos) i koeficijent značajnosti razlika aritmetičkih sredina (P – Level). Za utvrđivanje kvantitativne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u nivou aritmetičkih sredina svih varijabli primijenjena je multivarijantna analiza varijanse (MANOVA): vrijednost koeficijenta Wilkovog testa za jednakost centrioda grupa (Wilk's Lambda Test), koeficijent F-testa za testiranje značajnosti Wilk's Lambda (F – vrijednost) i koeficijent značajnosti razlika aritmetičkih sredina (Q). Kanoničkom diskriminativnom analizom su utvrđene kvalitativne razlike i hijerarhija promjenljivih koje doprinose razlikovanju (diskriminaciji)

između kontrolne i eksperimentalne grupe, na inicijalnom i finalnom mjerenju. U

51

tu svhu izračunate su sljedeće vrijednosti: kvadrat koeficijenta determinacije (Eigen Value), koeficijent kanoničke korelacije (Canonical R), test Vilksove lambde (Wilk's Lambda), Bartletov X2 test (Chi-Sqr), stepen slobode (df) i nivo značajnosti razlika (Sig.) 6.1.1 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u morfološkim karakteristikama na inicijalnom mjerenju Analiza je sprovedena na morfološkim karakteristikama ispitanika kontrolne i eksperimentalne grupe i to na varijablama: tjelesna masa, tjelesna visina, dužina noge, sjedeća visina, širina ramena, širina kukova, širina karlice,

obim grudnog koša, obim butine, **obim** potkoljenice, **kožni nabor trbuha, kožni nabor** butine, **kožni nabor**

8

potkoljenice, mišićna masa i masa masnog tkiva. 6.1.1.1 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama **na inicijalnom** **mjerenju**

1

kod početnika Rezultati deskriptivne statistike (tabela 4) ukazuju da igrači početnici sa Kosova prosječne vrijednosti visine i mase tijela 151,4cm - 38,9 kg, (Sermahhaj i sar., 2018) su slične prosječne vrijednosti sa igračima iz Srbije 151,6cm – 39,1kg (Andrašić i sar., 2017), slični sa igračima iz Vojvodine sa prosječnom visinom i masom tijela 153,4cm – 41,03kg (Smajić i sar., 2015) i igračima iz Finske 153cm - 40,2kg (Vanttinen i sar., 2011), ali sa nešto većim vrijednostima u odnosu na prosječne vrijednosti igrača iz Portugalije 144,6cm – 38,1kg (Figueiredo i sar., 2009). Tabela 4. Deskriptivni parametri i

univarijantna analiza razlika **između kontrolne i eksperimentalne grupe** početnika **u** morfološkim karakteristikama **na** inicijalnom **mjerenju**

1

KG. KG. EG. EG. Min. – Max. Skew. Min. – Max. Skew. F- P- Varijable (Mean± SD) (Kurt.) (Mean±SD) (Kurt.) odnos Level
 Tjelesna masa 30,10-56,60 ,247 29,30-47,00 -,073 1,413 ,250 (42,36±7,29) (,902) (38,91±5,56) (-,410) Tjelesna visina
 142,10-165,90 ,274 139,20-159,10 -,910 ,543 ,471 (153,81±7,80) (-,979) (151,49±6,18) (,573) Dužina noge 81,40-99,20
 ,045 80,10-91,00 -1,225 1,507 ,236 (89,95±6,07) (-1,012) (87,19±3,72) (,441) Sjedeća visina 77,00-86,30 1,254 73,20-
 84,80 -1,044 ,102 ,753 (80,36±2,83) (,668) (79,94±3,04) (2,515) Širina ramena 28,10-35,40 -1,063 28,90-35,00 -1,123 ,040
 ,844 (32,69±2,18) (,868) (32,87±1,83) (1,264) Širina kukova 23,20-29,40 -,456 24,40-27,50 -,693 ,488 ,494 (26,75±2,24)
 (-,994) (26,20±1,07) (-,768) Širina karlice 21,10-27,70 -,225 21,70-27,80 ,043 ,002 ,964 (24,33±2,00) (,240) (24,29±1,95)
 (-,678) Obim grudnog koša 61,70-87,40 ,239 64,20-76,20 -,033 1,285 ,272 (73,59±7,08) (,892) (70,66±4,06) (-1,232) Obim
 butine 34,40-51,80 -,197 37,00-46,00 ,077 ,925 ,349 (43,34±4,27) (3,196) (41,75±3,00) (-,862) Obim potkoljenice 26,70-
 33,00 ,159 26,30-33,00 ,161 ,285 ,600 (29,80±1,91) (-,650) (29,30±2,25) (-,989) Kožni nabor trbuha 3,20-31,00 2,743 3,00-
 22,60 1,975 ,049 ,827 (8,33±8,27) (8,023) (7,60±6,29) (3,315) Kožni nabor butine 4,20-18,40 ,577 6,60-21,00 ,956 ,513
 ,483 (9,95±4,78) (-,776) (11,50±4,88) (-,067) Kožni nabor potkoljenice 5,20-15,20 ,532 5,00-12,80 ,035 ,533 ,475
 (9,69±2,90) (,424) (8,84±2,26) (-,086) Mišićna masa (kg) 13,32-24,63 -,273 13,64-20,32 -1,243 2,023 ,172 (19,95±3,77)
 (-,752) (18,04±1,96) (1,895) Masa masnog tkiva (kg) 1,40-18,50 2,224 2,00-10,90 1,133 ,023 ,882 (5,41±5,07) (5,506)
 (5,13±2,97) (,234) Mišićna masa (%) 36,50-53,40 -,609 41,06-50,56 -,609 ,041 ,841 (46,99±5,33) (,033) (46,60±2,97) (,003)
 Masa masnog tkiva (%) 5,81-23,20 ,878 3,00-32,72 1,316 ,010 ,923 (12,30±9,04) (,034) (12,63±5,60) (1,974) Legenda: KG.
 – kontrolna grupa, EG. – eksperimentalna grupa,

Min – minimalni rezultat, Max – maksimalni rezultat, Mean±SD – srednja vrijednost i **standardna devijacija, Skew. – koeficijent asimetričnosti, Kurt. – koeficijent zakrivljenosti,**

34

F – odnos (vrijednost koeficijenta

F-testa za testiranje značajnosti razlika), P – Level (koeficijent značajnosti razlika aritmetičkih sredina).

48

Raspon između minimalnog i maksimalnog rezultata u morfološkim karakteristikama unutar očekivanih vrijednosti je kada se uzmu u obzir razlike koje postoje između igrača koji igraju na različitim pozicijama u timu. Rezultati skjunisa (Skew) ukazuju da je raspodjela simetrična (koja ne prelazi vrijednost više od 3.00), što znači da su kontrolna i eksperimentalna grupa homogena. Početnici su, u odnosu sa drugim kategorijama, najhomogeniji u tretiranim mjerama longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, potvrđeno je i od drugih autora (Smajić i sar., 2009a). Međutim, odstupanje je od normalne distribucije rezultata, uočene su veće vrijednosti kurtozisa koje ukazuju da je kriva izdužena (prelazi veće vrijednosti od 3.00) kod kontrolne grupe u varijablama: obim butine, kožni nabor trbuha i masa masnog tkiva, a kod eksperimentalne grupe samo u varijabli kožni nabor trbuha. Analizom razlike pojedinačnih varijabli (tabela 4) na osnovu univarijantne analize, koeficijenta F- odnosa i njihove značajnosti P-Level u nivou ($p < 0,05$), uočava se da ne postoje statistički značajne kvantitativne razlike između (aritmetičkih sredina)

kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika **u varijablama** morfoloških karakteristika **na inicijalnom mjerenju.**

16

Također, multivarijantnom analizom testirane su značajne kvantitativne razlike u morfološkim karakteristikama između kontrolne i eksperimentalne grupe (tabela 5). Rezultati multivarijantne analize varijanse ($Q=1,82$) ukazuju da u sistemu primijenjenih morfoloških varijabli ne postoje statistički značajne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika **na** inicijalnom **mjerenju. Tabela 5. Multivarijantna analiza** razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** početnika **u** morfološkim karakteristikama **na** inicijalnom **mjerenju WILK'S LAMBDA TEST** ,023 **RAO-va F-aproksimacija Q**

1

4,926 1,82

Legenda: Wilks Lambda – vrijednost **koeficijenta** Wilkovog **testa za jednakost centrioda grupa; F** – vrijednost **koeficijenta F-testa za testiranje značajnosti**

33

Wilk's Lambda; Q-koeficijent značajnosti razlika aritmetičkih sredina. U tabeli 6 rezultati diskriminativne analize ukazuju

da je dobijena jedna diskriminativna funkcija visokog **intenziteta CR= 93%, koja pokazuje u** **kojoj je korelaciji skup podataka na osnovu koje je izvršena diskriminativna analiza dobijenih rezultata.** **Rezultati diskriminativne jačine varijabli** dati **su testom Wilks' Lambda** (,131), **što potvrđuje da** **razlike**

2

u prostoru istraživanih morfoloških karakteristika između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika na inicijalnom mjerenju nijesu značajne ($\text{sig} = ,071$),

a veličina Hi-kvadrat testa ima nisku vrijednost (Chi-Sqr

1

= 22,36). Tabela 6. Diskriminativna analiza morfoloških razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju kod početnika Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 6,636 ,932 ,131 22,36 14 ,071
Legenda: Eigenvalue–kvadrat koeficijenta diskriminacije, Canonical R – Koeficijent kanoničke korelacije, Wilks Lambda – Vrijednosti Wilkovih lambdi za svaku diskriminacijsku funkciju, Chi-Sqr.- vrijednost hi kvadrat testa za testiranje značajnosti diskriminacijske funkcije, df - stepeni slobode, Sig. (p–level) – proporcija pogreške koja se čini prihvaćanjem

hipoteze da je razlika statistički značajna. Analizirajući rezultate univarijantom, multivarijantom i diskriminativnom analizom,

može se potvrditi da ne postoje kvantitativne i kvalitativne razlike u morfološkim karakteristikama između kontrolne i

21

eksperimentalne grupe ispitanika početnika. Može se tako zaključiti da je u potpunosti potvrđena parcijalna hipoteza H11 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije početnika, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju. 6.1.1.2 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama na inicijalnom mjerenju 1

kod pionira. Rezultati deskriptivne statistike u tabeli 7, u prostoru morfoloških karakteristika na inicijalnom mjerenju kod ispitanika kategorije pionira ukazuju da prosječne vrijednosti visine i mase tijela kod kontrolne grupe 169cm - 52,3kg i kod eksperimentalne grupe 167,8cm - 53,45kg, (Sermahaj i sar., 2017b). Slični su prosječnim vrijednostima sa igračima pionirima iz Vojvodine 168,4cm – 55,3kg (Smajić i sar., 2015), iz Španije 166,5cm – 57,5kg (Gil i sar., 2007) iz Finske 168cm - 53,9kg (Vanttinen i sar., 2011), iz Njemačke 166,5cm – 54,5kg. (Sander i sar., 2013), ali nešto manje prosječne vrijednosti su nego kod pionira iz Hrvatske 176cm - 64kg (Erceg 2011). Pioniri iz ovog istraživanja, što se tiče prosječne vrijednosti mišićne mase 49,7%, i mase masnog tkiva 9,9%, slični su igračima kadetima iz Španije, sa prosječnim vrijednostima mišićne mase 46,1%, i mase masnog tkiva 11% (Gil i sar., 2007). Minimalne (Min) i maksimalne (Max) vrijednosti morfoloških karakteristika ispitanika pionira (kontrolne i

eksperimentalne grupe) na inicijalnom merenju ukazuju da se vrijednosti nalaze u očekivanom rasponu. 52

Rezultati ukazuju da nema značajnih odstupanja distribucije rezultata, odnosno distribucije vrijednosti, te da se uglavnom kreću u okviru normalne raspodjele kod skoro svih promijenjenih varijabli, međutim najveća varijabilnost uočena je kod varijabli: tjelesna visina, dužina noge, sjedeća visina, širina ramena, kožni nabor trbuha i butina, a kod eksperimentalne grupe samo u varijabli - kožni nabor butina. Razlog razlike distance između minimalnog i maksimalnog rezultata je raspon starosti ispitanika pionira od 13 do 15 godina, što je doba kada intenzivno rastu i razvijaju se morfološke karakteristike i velike su individualne razlike između ispitanika istog uzrasta (Philippaerts i sar., 2006). Mlađi fudbaleri se uglavnom grupišu po godištim jedne ili čak dvije godine. Tako u istom rangu takmičenja nastupaju nominalno igrači iste hronološke dobi, iako među njima može biti 12 ili čak 24 mjeseci razlike. U perspektivi, bolje bi bilo da se mladi fudbaleri grupišu po istoj godini rođenja.

Rezultati univarijantne analize (tabela 7) **na osnovu koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti**

1

P- Level

u nivou ($p < 0,05$) ukazuju

da ne postoji statistički značajna razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe u

44

odnosu na pojedinačne varijable morfoloških karakteristika ispitanika pionira na inicijalnom mjerenju. Tabela 7.

Deskriptivni parametri i univarijantna analiza

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe pionira **u** morfološkim karakteristikama **na** **inicijalnom mjerenju**

1

KG. Min. – Max. Varijable (Mean± SD) KG. EG. Skew. Min. – Max. (Kurt.) (Mean±SD) EG Skew. (Kurt.) F- odnos P- Level
Tjelesna masa Tjelesna visina Dužina noge Sjedeća visina Širina ramena Širina kukova Širina karlice

Obim grudnog koša Obim butine **Obim** potkoljenice **Kožni nabor trbuha Kožni nabor** butine **Kožni nabor**

8

potkoljenice Mišićna masa (kg) Masa masnog tkiva (kg) Mišićna masa (%) Masa masnog tkiva (%) 32,80-64,30
(52,36±8,93) 143,50-179,30 (169,05±9,69) 83,00-104,80 (97,51±5,42) 72,50-94,50 (88,28±5,79) 25,90-39,30 (35,65±3,83)
22,40-32,70 (29,75±3,00) 22,10-29,00 (26,65±1,90) 70,20-84,70 (79,78±4,41) 38,50-54,00 (46,62±4,45) 27,80-36,80
(32,84±2,80) 4,20-11,20 (6,38±1,82) 5,20-19,20 (9,00±3,61) 5,20-12,20 (8,60±1,78) 16,44-32,08 (26,44±4,52) 1,60-10,00
(4,58±2,59) 46,03-53,86 (50,52±2,23) 3,00-15,55 (8,46±3,96) -,902 (1,033) -1,784 (4,050) -1,846 (4,704) -1,974 (4,981)
-1,733 (3,168) -1,498 (2,394) -1,062 (2,016) -1,189 (,827) -,530 (,162) -,447 (-,512) 1,770 (4,210) 2,219 (6,259) ,122 (,983)
-1,069 (,932) 1,012 (,284) -,686 (,363) ,835 (-,094) 40,60-64,80 (53,45±8,48) 157,30-180,80 (167,87±7,6) 89,20-105,40
(96,60±4,73) 82,30-94,50 (88,64±4,23) 32,80-39,40 (35,67±2,17) 26,80-31,80 (29,86±1,55) 24,80-30,00 (26,48±1,44)
70,80-86,00 (78,60±5,15) 40,50-51,70 (47,56±3,60) 28,20-37,50 (33,44±2,63) 5,20±7,40 (6,35±6,66) 6,00-13,00
(7,98±1,85) 5,60-11,20 (7,71±1,47) 19,69-34,34 (26,64±4,78) 1,50-12,10 (5,37±3,23) 43,72-54,09 (49,77±3,10) 3,10-20,67
(9,95±5,27) -,310 (-1,397) ,471 (-,590) ,289 (-,371) -,263 (-1,327) ,091 (-1,260) -,786 (-,130) 1,326 (2,313) -,168 (-1,596)
-,707 (-,512) -,484 (-,101) -,003 (-,737) 1,954 (4,740) ,892 (2,029) ,098 (-1,103) 1,136 (,679) -,475 (-,347) ,795 (,266) ,094
,109 ,191 ,030 ,000 ,014 ,058 ,365 ,324 ,292 ,004 ,750 1,753 ,011 ,438 ,451 ,612 ,762 ,745 ,666 ,864 ,990 ,906 ,811 ,552
,575 ,594 ,953 ,396 ,199 ,917 ,515 ,509 ,442 Rezultati multivarijantne analize (tabela 8)

ukazuju da nije uočena **statistički značajna razlika** ($Q=,585$) **između kontrolne i eksperimentalne grupe** ispitanika kategorije pionira **u**

1

nivou aritmetičkih sredina svih morfoloških karakteristika na inicijalnom mjerenju (Sermahaj i sar., 2017b). Tabela 8.

Multivarijantna analiza razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** pionira **u** morfološkim karakteristikama **na** inicijalnom **mjerenju WILK'S LAMBDA TEST RAO-va F-aproksimacija Q**

1

,275 ,930 ,585 Takođe, rezultati diskriminativne analize (tabela 9) pokazuju da u prostoru istraživanih morfoloških varijabli nijesu utvrđene statističke značajne razlike ($\text{sig} =,403$)

između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira **na** inicijalnom **mjerenju. Tabela** 9. Diskriminativna **analiza** morfoloških karakteristika razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe na** inicijalnom **mjerenju**

1

kod pionira Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 1,655 ,790 ,377 14,64 14 ,403 Na osnovu rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize,

može se potvrditi **da ne postoje** kvantitativne i kvalitativne **razlike u** morfološkim **karakteristikama između** kontrolne **i**

21

eksperimentalne grupe ispitanika pionira. Može se tako zaključiti da je u potpunosti potvrđena parcijalna hipoteza H12 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju. 6.1.1.3 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama **na inicijalnom** **mjerenju**

1

kod kadeta Kadeti Kosova prosječne vrijednosti visine i mase tijela 175,7cm – 61,1kg (Sermahaj i sar., 2017a) imaju slične prosječne vrijednosti sa igračima kadetima iz Portugalije kod visine i mase tijela 174,6cm – 66,2kg (Leão i sar., 2017), iz Španije 175,6cm - 65,6kg (Gil i sar., 2007), iz Vojvodine 175,7cm, ali oni imaju nešto veću masu tijela 68,9kg (Smajić i sar., 2015). Slični su kadetima iz Njemačke koji imaju 177,4cm, ali su sa većom masom tijela od 70,1kg.

(Sander i sar., 2013). Veće vrijednosti visine i mase tijela utvrđene su kod kadeta iz Hrvatske 178cm - 69kg (Erceg 2011) i Češke 178,5cm – 68,2kg (Bujnovky i sar., 2019). Kadeti iz ovog istraživanja, što se tiče prosječne vrijednosti mišićne mase 49,5%, i mase masnog tkiva 9,1%, slični su kadetima iz Španije po prosječnoj vrijednosti mišićne mase 47,7% i mase masnog tkiva 11,6% (Gil i sar., 2007). Minimalne (Min) i maksimalne (Max) vrijednosti morfoloških karakteristika ispitanika kadeta (kontrolne i eksperimentalne grupe) na inicijalnom merenju ukazuju da se vrijednosti nalaze unutar očekivanog nivoa kod skoro svih promijenjenih varijabli (tabela 10). Analiza vrijednosti asimetričnosti i zakrivljenosti (Skew. i Kurt.) ukazuje da je raspodjela simetrična, što potvrđuje homogenost kontrolne i ekperimentalne grupe ispitanika kadeta. Bez obzira na pomenutu homogenost, rezultati vrijednosti skjunisa (tabela 10) varijabli za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta i varijabli za procjenu voluminoznosti i mase tijela, pokazuju individualne razlike u morfološkim karakteristikama kod kadeta, ali te individualne razlike su prihvatljive za fudbalsku igru kada se uzmu u obzir različite pozicije igre. Time se može potvrditi da u uzrastu 15 do 17 godina nije završen bioloških rast i razvoj, nego se nastavlja i razvijaju morfološke karakteristike.

Rezultati univarijantne analize (tabela 10) **na osnovu koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti** 1
P- Level

u nivo ($p < 0,05$) ukazuju da u morfološkim varijablama ne

postoje statistički značajne kvantitativne **razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe** 13
 ispitanika kadeta **na** inicijalnom **mjenju**

(visina i masa tijela, Sermaxhaj i sar., 2017b). kadeta u morfološkim karakteristikama na inicijalnom mjenju KG. Min. – Max. Varijable (Mean \pm SD) KG. EG. Skew. Min. – Max. (Kurt.) (Mean \pm SD) EG Skew. (Kurt.) F- odnos P- Level Tjelesna masa Tjelesna visina Dužina noge Sjedeća visina Širina ramena Širina kukova Širina karlice

Obim grudnog koša **Obim** butine **Obim** potkoljenice **Kožni nabor trbuha** **Kožni nabor** butine 8
Kožni nabor

potkoljenice Mišićna masa (kg) Masa masnog tkiva (kg) Mišićna masa (%) Masa masnog tkiva (%) 47,60-89,40
 (61,16 \pm 10,2) 167,90-189,50 (175,70 \pm 6,40) 95,50-111,70 (103,05 \pm 5,52) 86,90-98,70 (90,92 \pm 3,43) 32,10-39,50
 (37,81 \pm 2,00) 21,50-34,80 (30,74 \pm 3,26) 23,80-31,20 (27,49 \pm 2,08) 81,30-98,70 (86,56 \pm 5,01) 43,80-60,30 (50,75 \pm 3,94)
 29,30-40,40 (34,57 \pm 2,64) 4,60-14,80 (8,13 \pm 3,42) 3,80-19,40 (9,70 \pm 4,20) 4,60-18,80 (8,46 \pm 3,93) 24,25-46,50 (30,59 \pm 6,03)
 3,20-8,80 (5,60 \pm 2,01) 40,67-52,66 (49,50 \pm 3,92) 4,84-14,89 (9,13 \pm 3,03) 10,214 (1,983) 6,403 (,747) 5,522 (,357) 3,435
 (1,146) 2,002 (-2,384) 3,263 (-2,224) 2,086 (-,149) 5,015 (1,722) 3,943 (,965) 2,646 (,271) 3,423 (1,025) 4,204 (,970) 3,932
 (1,694) 6,034 (1,762) 2,012 (,634) 3,925 (-1,533) 3,038 (,804) 53,30-78,30 (62,73 \pm 7,63) 166,40-187,60 (176,70 \pm 6,72)
 92,70-107,40 (100,58 \pm 4,6) 86,30-98,50 (92,71 \pm 3,30) 34,80-42,00 (37,92 \pm 2,56) 28,30-35,80 (32,04 \pm 2,19) 25,60-30,00
 (27,70 \pm 1,30) 75,80-97,50 (85,79 \pm 5,41) 47,70-60,20 (51,90 \pm 3,47) 33,00-38,50 (35,39 \pm 1,68) 6,40 \pm 17,00 (9,56 \pm 3,11) 5,00-

13,00 (9,78±2,46) 5,60-11,60 (8,18±1,98) 25,75-38,71 (31,85±3,47) 1,70-10,10 (6,00±2,58) 47,33-54,08 (50,87±2,09) 3,00-13,49 (9,32±3,26) 7,634 (,669) 6,726 (,177) 4,654 (-,295) 3,308 (-,299) 2,561 (,294) 2,195 (,060) 1,303 (-,036) 5,418 (,390) 3,474 (1,216) 1,682 (,246) 3,112 (1,212) 2,467 (-,741) 1,984 (,332) 3,477 (,288) 2,582 (,011) 2,096 (-,040) 3,262 (-,586) ,181 ,141 1,424 1,692 ,013 1,316 ,093 ,132 ,565 ,815 1,143 ,004 ,050 ,393 ,171 1,144 ,021 ,675 ,711 ,245 ,206 ,909 ,265 ,763 ,719 ,460 ,376 ,296 ,953 ,826 ,537 ,683 ,296 ,885 Analizirajući tabelu 11, rezultati multivarijantne analize pokazuju da ne postoji statistički značajna razlika $Q=,448$ u nivou aritmetičkih sredina svih morfoloških varijabli

između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta **na** inicijalnom **mjerenju. Tabela** 1

11. **Multivarijantna analiza** razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** kadeta **u** morfološkim karakteristikama **na** inicijalnom **mjerenju WILK'S LAMBDA TEST RAO-va F-aproksimacija Q**

,230 1,184 ,448 Analizom tabele 12 koja sadrži rezultate diskriminativne analize, vidimo da u prostoru istraživanih morfoloških karakteristika ne

postoje statistički značajne razlike (sig =,282) **između kontrolne i eksperimentalne grupe** 13
ispitanika kadeta **na** inicijalnom **mjerenju.**

grupe na inicijalnom mjerenju kod kadeta Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 3,349 ,878 ,230 19,84 17 ,282 Na osnovu rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize

može se potvrditi **da ne postoje** kvantitativne i kvalitativne **razlike u** morfološkim 21
karakteristikama između kontrolne **i**

eksperimentalne grupe ispitanika kadeta. Može se tako zaključiti da je u potpunosti potvrđena parcijalna hipoteza H13 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika kod kategorije kadeta, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju. 6.1.2 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u motoričkim sposobnostima na inicijalnom mjerenju Analiza je sprovedena na motoričkim sposobnostima ispitanika kontrolne i eksperimentalne grupe i to na varijablama: duboki pretklon u sjedenju, upor ležeći za rukama – skleкови, podizanje trupa iz ležanja na leđima,

skok iz polučučnja bez pripreme - ruke na bokovima, skok iz polučučnja sa pripremom – ruke na 5
bokovima, maksimalni **skok sa pripremom**

– zamah rukama, sprint 5m, sprint 10m, sprint 30m,

Ajaksov test 5 x 10m, cik-cak trčanje bez lopte,

11

cik-cak trčanje sa loptom, jačina mišića fleksora u zglobu koljena, jačina mišića ekstenzora u zglobu koljena. 6.1.2.1
Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim **spособnostima na inicijalnom**
mjerenju kod početnika **U** tabeli 13 vidimo **da**

1

rezultati osnovnih parametara ukazuju da su normalno distribuirani i da nema rezultata koji značajno odstupaju od vrijednosti asimetričnosti i zakrivljenosti (Skew. i Kurt.). Minimalni (Min) i maksimalni (Max) rezultati varijabli motoričkih sposobnosti ukazuju da su vrijednosti generalno u očekivanom rasponu. Bez obzira na to što je uzorak kontrolne i eksperimentalne grupe prilično homogen, uočavaju se izvjesne individualne razlike između pojedinih varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti. Najveća varijabilnost ispoljena je kod varijable repetitivna snaga (upor ležeći za rukama – sklekovi, podizanje trupa iz ležanja na leđima). Ovi rezultati ukazuju na različit nivo repetitivne snage trupa, što je normalno kad se uzmu u obzir da je niska genetička determinisanost repetitivne snage i sa adekvatnim vježbama može se puno poboljšati, posebno kad je u pitanju kategorija početnika. Rezultati deskriptivne statistike (tabela 13), ukazuju da je prosječna vrijednost brzine trčanja početnika sa Kosova na 10m za 2,22sec, na 30m za 5,30sec, (Sermahaj i sar., 2017c) što je malo sporije od vršnjaka iz Španije koji su imali na 10m sprint za 2,08sec i na 30m sprint za 5,30sec (Gil i sar., 2007).

Rezultati univarijantne analize (tabele 13) **na osnovu** vrijednosti **koeficijenta F-odnosa i**
njihove značajnosti P- Level

1

u nivou ($p < 0,05$), pokazuju da ne postoje statistički značajne kvantitativne razlike između pojedinačnih motoričkih varijabli kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika na inicijalnom mjerenju. početnika u motoričkim sposobnostima na inicijalnom mjerenju KG. Min. – Max. Varijable (Mean \pm SD) KG. Skew. (Kurt.) EG. Min. – Max. (Mean \pm SD) EG. Skew. (Kurt.) F- odnos P- Level Duboki pretklon u sjedenju Upor ležeći za rukama - sklekovi Podizanje trupa iz ležanja na leđima

Skok iz polučučnja bez pripreme Skok iz polučučnja sa pripremom

5

Maksimalni skok sa pripremom Sprint 5m Sprint 10m Sprint 30m Ajaksov test 5x10m Cik-Cak trčanje bez lopte Cik-Cak trčanje sa loptom Jačina mišića fleksora u koljenu Jačina mišića ekstenzora u koljenu -13,00-8,00 (-1,00 \pm 7,37) 5,00-31,00 (19,80 \pm 10,93) 8,00-61,00 (23,40 \pm 17,06) 18,50-30,60 (24,33 \pm 3,51) 22,10-33,40 (28,26 \pm 3,98) 24,20-39,40 (31,93 \pm 4,27) 1,19-1,57 (1,31 \pm ,12) 2,03-2,44 (2,22 \pm ,13) 4,86-5,81 (5,30 \pm ,36) 13,47-15,44 (14,29 \pm ,59) 6,39-8,07 (7,21 \pm ,69)

8,41-9,57 (9,04±,39) 25,80-58,20 (44,76±9,27) 41,60-79,90 (63,07±11,88) ,765 (-,902) ,632 (,046) 1,503 (1,673) ,214 (,009) - ,342 (-1,566) - ,192 (,389) 1,143 (,742) ,433 - (,853) ,281 (-1,592) ,631 (,386) - ,008 (-2,05) - ,395 (-1,11) - ,492 (1,213) - ,474 (-,610) -6,00-9,00 (-0,40±4,32) 7,00-30,00 (17,70±8,62) 3,00-45,00 (18,00±13,27) 17,10-30,30 (24,58±4,84) 19,00-32,60 (27,08±4,80) 23,60-33,90 (29,62±4,14) 1,12-1,63 (1,35±,16) 2,01-2,35 (2,17±,09) 4,91-5,94 (5,37±,29) 13,23-16,04 (14,67±,84) 6,42-7,46 (6,93±,31) 8,22-10,70 (9,17±,66) 22,60-54,10 (39,48±10,48) 23,30-68,30 (53,02±15,05) 1,074 (1,412) ,411 (-1,49) 1,016 (,318) - ,616 (-1,383) - ,703 (-1,043) - ,501 (-1,584) ,116 (-,832) ,127 (,873) ,474 (,382) 224 (-,127) ,105 (-,425) 1,052 (2,701) - ,171 (-,881) - ,876 (-,088) ,049 ,227 ,624 ,017 ,357 1,506 ,322 ,796 ,220 1,311 1,297 ,316 1,423 2,744 ,827 ,639 ,440 ,896 ,557 ,236 ,577 ,384 ,645 ,267 ,270 ,581 ,248 ,115 Primijenjenom multivarijantnom analizom (tabela 14) i rezultata analize (Q=,332) potvrđuje

se da ne postoje statistički značajne razlike između kontrolne i **eksperimentalne grupe** početnika **u nivou**

47

aritmetičkih sredina svih motoričkih varijabli

na inicijalnom mjerenju. Tabela 14. Multivarijantna analiza razlike **između** kontrolne i **eksperimentalne grupe** početnika **u** motoričkim **spodobnostima na inicijalnom mjerenju** **WILK'S LAMBDA TEST** ,188 **RAO-va F-aproksimacija 1,** 542 **Q**

2

,332 U tabeli 15 prikazani su rezultati diskriminativne analize, što takođe potvrđuje da u prostoru istraživanih motoričkih sposobnosti ne postoje kvalitativne statistički značajne razlike (sig =,189), između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika na inicijalnom mjerenju. grupe na inicijalnom mjerenju kod početnika Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 4,328 ,901 ,188 18,40 14 ,189 Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize može se potvrditi da ne postoje kvantitativne i kvalitativne razlike u motoričkim sposobnostima između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika. Takođe, u potpunosti je potvrđena parcijalna hipoteza H21 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti kod kategorije početnika, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju.

6.1.2.2 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim **spodobnostima na inicijalnom mjerenju**

1

kod pionira

Analizom tabele 16 na kojoj su prikazani osnovni statistički parametri motoričkih

15

varijabli ukazano je da nema statistički značajnog odstupanja normalne distribucije, jer skoro svi rezultati ne odstupaju značajno od vrijednosti asimetričnosti i zakrivljenosti (Skew. i Kurt.), sem u varijabli podizanje trupa iz ležanja na leđima, kod obje grupe. Minimalni (Min) i maksimalni (Max) rezultati varijabli motoričkih sposobnosti ukazuju da su vrijednosti generalno u očekivanom rasponu. Bez obzira na to što je uzorak kontrolne i eksperimentalne grupe prilično homogen, uočavaju se izvjesne individualne razlike između pojedinih varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti. Najveća varijabilnost ispoljena je kod varijable repetitivne snage (upor ležeći za rukama, podizanje trupa iz ležanja na leđima i duboki pretklon u sjedjenju), što je razumljivo kada se uzmu u obzir da se repetitivna snaga trupa karakteriše niskim koeficijentom genetike, što omogućava individualnim vježbama da naprave značajne razlike. Analizirajući rezultate (tabela 16) proizilazi da prosječne vrijednosti ispitanika kategorije pionira sa Kosova u varijabli brzina trčanja - 10m od 2,04sec, sprint 30m od 4,90sec (Sermahaj i sar., 2017c) su malo sporije od prosječnih vrijednosti brzine igrača iz Španije - 10m od 1,93sec, 30m od 4.80sec, (Gil i sar., 2007). U varijabli agilnosti, cik-cak trčanje bez lopte sa vremenom od 6,47sec, cik-cak trčanje sa loptom od 7,99sec, (Sermahaj i sar., 2017c) nešto su brži od ispitanika pionira iz Turske sa prosječnom vrijednošću cik-cak trčanja bez lopte 7,06sec, dok je kod Turaka cik-cak trčanje bez lopte 8,62sec (Erikoglu i Arslan 2016). Na osnovu

univarijantne analize varijanse koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti P-Level

1

u nivou ($p < 0,05$) rezultati tabele 13 ukazuju da ne postoje statistički značajne kvantitativne razlike između pojedinačnih motoričkih varijabli kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira na inicijalnom mjerenju. pionira u motoričkim sposobnostima na inicijalnom mjerenju KG. Min. – Max. Varijable (Mean \pm SD) KG. Skew. (Kurt.) EG. Min. – Max. (Mean \pm SD) EG. Skew. (Kurt.) F- odnos P- Level Duboki pretklon u sjedjenju Upor ležeći za rukama - sklekovi Podizanje trupa iz ležanja na leđima

Skok iz polučučnja bez pripreme Skok iz polučučnja sa pripremom

5

Maksimalni skok sa pripremom Sprint 5m Sprint 10m Sprint 30m Ajaksov test 5x10m Cik-Cak trčanje bez lopte Cik-Cak trčanje sa loptom Jačina mišića fleksora u koljenu Jačina mišića ekstenzora u koljenu -13,00-5,00 (0,41 \pm 5,08) 6,00-30,00 (17,08 \pm 7,82) 17,00-51,00 (26,08 \pm 8,74) 19,30-37,20 (28,30 \pm 5,92) 23,00-40,80 (33,28 \pm 5,11) 31,10-45,80 (38,45 \pm 4,97) 1,03-1,41 (1,21 \pm ,12) 1,82-2,47 (2,05 \pm ,16) 4,40-5,76 (4,95 \pm ,39) 12,98-14,90 (13,79 \pm ,62) 6,64-7,49 (7,00 \pm ,28) 8,06-9,86 (9,04 \pm ,39) 37,30 \pm 99,50 (68,54 \pm 16,58) 43,60-111,00 (72,67 \pm 21,21) -1,852 (2,892) ,205 (-1,432) 2,334 (6,643) ,003 (-1,012) -,398 (-,158) ,260 (-1,39) ,452 (-1,012) 1,102 (2,407) ,668 (,417) ,227 (-,896) ,336 (-1,052) ,392 (-,484) ,228 (,582) ,829 (-,329) -12,00-11,00 (-1,41 \pm 8,28) 12,00-34,00 (19,91 \pm 7,71) 15,00-69,00 (30,50 \pm 14,59) 23,60-37,60 (30,00 \pm 4,66) 24,40-43,80 (35,18 \pm 5,62) 30,40-46,50 (39,65 \pm 4,51) 1,08-1,47 (1,22 \pm ,12) 1,89-2,34 (2,12 \pm ,15) 4,44-5,71 (4,91 \pm ,39) 12,90-14,50 (13,71 \pm ,46) 6,53-7,82 (6,89 \pm ,36) 7,65-9,32 (8,47 \pm ,55) 44,80-95,40 (72,61 \pm 16,40) 45,40-139,30 (88,37 \pm 26,02) -,007 (-1,275) ,875 (-,687) 1,967 (4,206) ,102 (-1,353) -,456 (,296) -,229 (,334) 1,334 (,440) 1,146 (,498) ,836 (,077) -,377 (-,113) 1,564 (2,626) ,026 (-1,254) -,441 (-,465) ,549 (,643) ,427 ,798 ,809 ,616 ,750 ,382 ,002 ,023 ,074 ,131 ,599 2,027 ,366 1,394 ,520 ,381 ,378 ,441 ,396 ,543 ,961 ,880 ,789 ,721 ,447 ,169 ,551 ,250 Primijenjenom multivarijantnom analizom varijanse

rezultati u tabeli 17 ukazuju da je značajnost razlika na nivou od $Q=,998$, što govori da ne postoji statistički značajna razlika u nivou aritmetičkih sredina svih motoričkih varijabli

između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira **na** inicijalnom **mjerenju. Tabela** 1
 17. **Multivarijantna analiza** razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** pionira **u**
 motoričkim **spodobnostima na** inicijalnom **mjerenju WILK'S LAMBDA TEST** ,795 **RAO-va F-**
aproksimacija ,165 **Q**

,998 U tabeli 18 rezultati diskriminativne analize ukazuju da razlika nije značajna ($\text{sig} = ,998$) što potvrđuje da u prostoru istraživanih motoričkih sposobnosti ne postoje značajne kvalitativne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira **na inicijalnom mjerenju.** 1

grupe na inicijalnom mjerenju kod pionira Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,257 ,452 ,795 3,43 14 ,998 Na osnovu univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize,

može se zaključiti **da je u potpunosti potvrđena** parcijalna **hipoteza** H22 **koja glasi:** 12

ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju. 6.1.3 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim **spodobnostima na inicijalnom** 1
mjerenju

kod kadeta Na osnovu vrijednosti rezultata u tabeli 19, deskriptivnih parametara motoričkih varijabli, ukazano je da nema statistički značajnog odstupanja normalne distribucije, skoro svi rezultati ne odstupaju značajno od vrijednosti asimetričnosti i zakrivljenosti (Skew. i Kurt.). Veće su vrijednosti kurtozisa (ukazuje da je kriva izdužena) osim u varijabli Sprint 30m, jačina mišića fleksora u koljenu (kod kontrolne grupe) i varijabla jačina mišića ekstenzora u koljenu kod eksperimentalne grupe. Minimalni (Min) i maksimalni (Max) rezultati varijabli motoričkih sposobnosti ukazuju da su vrijednosti generalno u očekivanom rasponu. Međutim, uočavaju se individualne razlike između varijabli, a najveće varijabilnosti ispoljene su kod varijabli: upor ležeći za rukama – sklekovi, podizanje trupa iz ležanja na leđima, duboki pretklon u sjedenju, jačina mišića fleksora i ekstenzora. Ove razlike mogu biti opravdane činjenicom da su uočene u motoričkim sposobnostima sa niskim genetskim koeficijentom, što omogućava da se adekvatnim vježbama utiče na pozitivne individualne promjene. Rezultati repetitivne snage trupa kadeta iz ovog istraživanja (upor ležeći za rukama 29

ponavljanja) slični su rezultatima kadeta iz Crne Gore sa 30 ponavljanja (Gardašević, i sar., 2016a). Takođe, rezultati tabele 19 ukazuju da prosječne vrijednosti varijabli jačina mišića fleksora u koljenu koja iznosi 76,6Nm, jačina mišića ekstenzora 109,3Nm (Sermahaj i sar., 2017a), nešto su manje vrijednosti od kadeta iz Češke kod kojih je jačina mišića fleksora u koljenu 84,1Nm, a jačina mišića fleksora 124,4Nm (Lehnert i sar., 2014). Primjenom univarijantne analize tabele 19,

na osnovu vrijednosti **koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti P-Level**

1

u nivou ($p < 0,05$), nije utvrđena statistički značajna razlika u pojedinačnim motoričkim varijablama

između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta **na inicijalnom mjerenju.** kadeta
u

1

motoričkim sposobnostima na inicijalnom mjerenju KG. Min. – Max. Varijable (Mean± SD) KG. EG. Skew. Min. – Max. (Kurt.) (Mean±SD) EG. Skew. (Kurt.) F- odnos P- Level Duboki pretklon u sjedjenju Upor ležeći za rukama - sklekovi Podizanje trupa iz ležanja na leđima

Skok iz polučučnja bez pripreme Skok iz polučučnja sa pripremom

5

Maksimalni skok sa pripremom Sprint 5m Sprint 10m Sprint 30m Ajaksov test 5x10m Cik-Cak trčanje bez lopte Cik-Cak trčanje sa loptom Jačina mišića fleksora u koljenu Jačina mišića ekstenzora u koljenu -10,00-7,00 (-3,25±5,47) 10,00-50,00 (29,58±10,84) 10,00-67,00 (36,50±16,11) 22,60-37,90 (31,46±4,88) 29,40-39,50 (34,90±3,60) 33,10-44,90 (38,30±3,77) 1,07-1,36 (1,21±,09) 1,75-2,05 (1,92±,09) 4,47-5,50 (4,75±,28) 12,37-14,24 (13,20±,54) 5,54-6,89 (6,47±,39) 7,12-9,46 (7,99±,62) 36,60-150,90 (76,66±28,82) 56,60-149,90 (109,30±30,18) ,302 (-,433) -,044 (,148) ,257 (-,262) -,233 (-,741) ,101 (-1,582) ,416 (-,884) -,092 (-1,207) -,456 (-,633) 1,825 (4,207) ,401 (-,347) -1,293 (1,631) 1,074 (1,754) 1,552 (3,685) -,604 (-,320) -10,00-17,00 (1,58±7,94) 17,00-48,00 (28,41±10,34) 11,00-75,00 (31,91±19,13) 25,50-40,10 (33,06±3,95) 27,20-43,60 (35,23±4,55) 30,60-48,30 (38,95±4,94) 1,08-1,42 (1,23±,12) 1,60-2,22 (1,95±,16) 4,37-4,87 (4,58±,17) 12,00-14,10 (12,84±,70) 5,82-7,26 (6,50±,40) 7,20-8,74 (7,97±,41) 59,90-95,40 (82,80±20,19) 75,90-151,50 (99,97±20,29) ,112 (-,075) -,115 (-1,20) 1,234 (1,243) -,530 (,711) -,238 (,347) -,221 (,478) ,116 (-1,503) -,547 (1,043) -,091 (-1,393) ,688 (-,855) ,250 (,023) -,001 (,108) 1,051 (,459) 1,526 (3,102) 3,020 ,618 ,403 ,777 ,038 ,134 ,934 1,504 2,528 1,962 ,028 ,013 ,364 ,281 ,097 ,440 ,532 ,387 ,848 ,718 ,344 ,233 ,126 ,174 ,868 ,912 ,552 ,601 Gledajući tabelu 20 uočavamo na osnovu multivarijantne analize da između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta na inicijalnom mjerenju ne postoje kvantitativne statistički značajne razlike ($Q=,776$). Tabela 20.

Multivarijantna analiza razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** kadeta **u**
motoričkim **sposobnostima na** inicijalnom **mjerenju WILK'S LAMBDA TEST** ,499 **RAO-va F-**

1

aproksimacija ,649 **Q**

,776 Tabela 21 potvrđuje da u prostoru motoričkih sposobnosti između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta na inicijalnom mjerenju ne postoje kvalitativne statistički značajne razlike (sig =,729). Tabela 21. Diskriminativna analiza motoričkih sposobnosti razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju kod kadeta
Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 1,006 ,708 ,499 10,43 14 ,729

Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, **multivarijantne i** diskriminativne **analize,** može **se zaključiti da je**

55

u potpunosti potvrđena parcijalna hipoteza H23 koja glasi: ne postoji statistički značajna promjena rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije kadeta, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju. Na osnovu dobijenih rezultata u prostoru motoričkih sposobnosti potvrđuje se da nema značajnih razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika, pionira i kadeta na inicijalnom mjerenju. 6.1.4 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjerenju
Analiza je sprovedena za funkcionalne sposobnosti i to na varijablama: forsirani vitalni kapacitet, forsirani ekspiratorni volumen, maksimalna potrošnja kiseonika i relativna potrošnja kiseonika, na uzorku kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika, pionira i kadeta. 6.1.4.1 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjerenju

1

kod početnika Rezultati deskriptivnih parametara funkcionalne sposobnosti (tabela 22) ukazuju da nema statistički značajnog odstupanja normalne distribucije, skoro svi rezultati ne odstupaju značajno od vrijednosti asimetričnosti i zakrivljenosti (Skew. i Kurt.). Veće vrijednosti skjunisa ukazuju samo kod eksperimentalne grupe na varijablu relativna potrošnja kiseonika. Minimalni (Min) i maksimalni (Max) rezultati varijabli funkcionalne sposobnosti pokazuju da su vrijednosti generalno u očekivanom rasponu. Na osnovu rezultata (tabela 22) prosječne vrijednosti varijabli - forsirani vitalni kapacitet od 2,67L, forsirani ekspiratorni volumen od 2,23L, (Sermahaj. S. 2019) one su slične igračima početnicima iz Bosne, a vrijednosti forsiranog vitalnog kapaciteta od 2,56L (Lolič i sar., 2012) onima iz Tunisa sa prosječnom vrijednošću od 2,35L, i forsiranim ekspiratornim volumenom od 2,11L. (Moez i sar., 2013). Tabela 22. Deskriptivni parametri i univarijantna analiza

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe početnika **u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjerenju**

1

KG. Min. – Max. Varijable (Mean± SD) KG. EG. Skew. Min. – Max. (Kurt.) (Mean±SD) EG. Skew. F- (Kurt.) odnos P- Level
 Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika
 1,63-3,90 (2,67±,73) 1,51-2,92 (2,23±,39) 2,30-3,24 (2,69±,31) 50,30-86,40 (65,91±11,93) ,294 (-1,001) ,002 (,745) ,466
 (-,914) ,344 (-,569) 1,57-2,83 (2,14±,36) 1,57-2,69 (2,08±,34) 2,40-3,24 (2,77±,28) 60,70-89,30 (72,33±9,34) ,367 (,229)
 ,348 (,133) ,283 (,161) 9,344 (,510) 4,055 ,881 1,273 2,433 ,059 ,360 ,274 ,119 Analizom tabele 22,

rezultati univarijantne analize, na osnovu koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti P-Level

1

u nivou ($p < ,05$), govore

da nije utvrđena statistički značajna razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika **u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjerenju.**

1

U tabeli 23 prikazani su rezultati multivarijantne analize ($Q = ,358$) koji potvrđuju da u sistemu primijenjenih funkcionalnih varijabli ne postoje statistički značajne kvalitativne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika **na** inicijalnom **mjerenju. Tabela 23. Multivarijantna analiza** razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** početnika **u funkcionalnim sposobnostima na** inicijalnom **mjerenju WILK'S LAMBDA TEST** ,760 **RAO-va F-aproksimacija** 1,182 **Q**

1

,358 Analizirajući tabelu 24, rezultate diskriminativne analize ($Sig = ,356$), vidimo da u varijablama funkcionalnih sposobnosti ne postoje kvalitativne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika **na** inicijalnom **mjerenju. Tabela 24. Diskriminativna analiza** funkcionalnih sposobnosti razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe na** inicijalnom **mjerenju**

1

kod početnika. Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,316 ,490 ,760 4,38 4 ,356 Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize

može se konstatovati da je u potpunosti potvrđena parcijalna **hipoteza** H31 **koja glasi:**

12

ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije početak, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju. 6.1.4.2 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjerenju

1

Na osnovu rezultata deskriptivnih parametara funkcionalne sposobnosti (tabela 25) nema statistički značajnog odstupanja normalne distribucije, pošto rezultati ne odstupaju značajno od vrijednosti asimetričnosti i zakrivljenosti (Skew. i Kurt.). Dobijeni rezultati varijable maksimalna potrošnja kiseonika (kontrolna grupa 2,99 L/min i eksperimentalna 3,07 L/min), nešto su niže vrijednosti od pionira iz Belgije 3.84 L/min (Segers i sar., 2002) i pionira iz Hrvatske 4,10 L/min (Erceg 2011). Međutim, vrijednosti varijable relativna potrošnja kiseonika (kontrolna grupa 56,66 mL/min/kg i eksperimentalna grupa 55,74 mL/min/kg) vrlo su slične vrijednostima pionira iz Belgije 57,74 mL/min/kg (Segers i sar., 2002), iz Hrvatske 58,76 mL/min/kg (Erceg 2011) i iz Španije 56,2 mL/min/kg (Gil i sar., 2007).

Rezultati univarijantne analize (tabela 25) na osnovu koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti P- Level

1

u nivou ($p < 0,05$) pokazuju da nema

statistički značajnih razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe u mjernim funkcionalnim varijablama na inicijalnom mjerenju.

1

pionira u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjerenju KG. Min. – Max. Varijable (Mean± SD) KG. EG. Skew. Min. – Max. (Kurt.) (Mean±SD) EG. Skew. F- (Kurt.) odnos P- Level Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika 3,00-5,63 (4,31±,78) 2,45-4,98 (3,82±,78) 2,40-3,40 (2,99±,26) 41,50-73,20 (56,66±9,01) -,115 (-,785) -,547 (-,749) -,922 (1,503) ,423 (,231) 3,05-6,04 (4,01±,97) 2,62-4,62 (3,60±,68) 2,70-3,50 (3,07±,22) 47,60-65,70 (55,74±6,63) ,890 (-,198) ,157 (-1,577) ,497 (,246) ,211 (-1,694) ,704 ,525 ,710 ,386 ,410 ,476 ,711 ,241 U tabeli 26 prikazani su rezultati multivarijantne analize varijanse ($Q=,826$) koji, takođe, potvrđuju da u sistemu primijenjenih funkcionalnih varijabli ne postoje statistički značajne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira na inicijalnom mjerenju.
Tabela 26. Multivarijantna analiza razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe pionira u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjerenju WILK'S LAMBDA TEST ,972 RAO-va F-aproksimacija ,372 Q

1

,826 Analizom tabele 27 vidimo da rezultati diskriminativne analize (Sig=,825) potvrđuju da ne postoje

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira **u** varijablama funkcionalnih sposobnosti **na** inicijalnom **mjerenju. Tabela 27. Diskriminativna analiza funkcionalne sposobnosti razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju**

1

kod pionira Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,078 ,269 ,927 1,50 4 ,825 Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize

može se konstatovati da je u potpunosti potvrđena parcijalna **hipoteza** H32 **koja glasi:**

12

ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju. 6.1.4.3 Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjerenju

1

kod kadeta Pregledom osnovnih statističkih parametara funkcionalne sposobnosti (tabela 28) vidimo da rezultati ne odstupaju značajno od vrijednosti asimetričnosti i zakrivljenosti (Skew. i Kurt.), pa može se zaključiti da kod svih varijabli funkcionalne sposobnosti nema statistički značajnog odstupanja normalne distribucije. Analizom srednjih vrijednosti varijabli za procjenu funkcionalne sposobnosti (tabela 28) kod kategorije kadeta iz ovog istraživanja, utvrđuje se da su forsirani vitalni kapacitet od 5,37L i forsirani ekspiratorni volumen od 4,13L, slični igračima iz Poljske sa prosječnom vrijednošću od 5,34L i forsiranim ekspiratornim volumenom od 4,67L (Malgorzata i sar., 2018). Rezultati ispitanika kadeta ovog istraživanja sa prosječnom vrijednosti maksimalne potrošnje kiseonika od 3,37 L/min, i relativnom potrošnjom kiseonika 56,1 ml/kg/min, slični su igračima kadetima iz Španije od 3,88 L/min, i 57,5 ml/kg/min (Gil i sar., 2007), ali nešto niži u odnosu na prosječne vrijednosti potrošnje kiseonika koje postižu kadeti iz Hrvatske od 4,22 l/min, i 60,4 ml/kg/min (Erceg i sar., 2011) iz Seltika iz Škotske 4.45 L/min i 63,4 ml/kg/min (McMillan i sar., 2005). Može se konstatovati da dobijeni rezultati deskriptivnih parametara primijenjenih varijabli funkcionalne sposobnosti su vrlo slični rezultatima istog uzrasta drugih regiona. Takođe, analizirajući tabelu 28, na osnovu

univarijantne analize varijanse, rezultata **koeficijenta F- odnosa i njihove značajnosti P-Level**

1

u nivou ($p < 0,05$) potvrđeno je da ne postoje statistički značajne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjerenju. 1

Tabela 28. Deskriptivni parametri i univarijantna analiza

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe kadeta u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjerenju 1

KG. Min. – Max. Varijable (Mean± SD) KG. EG. Skew. Min. – Max. (Kurt.) (Mean±SD) EG. Skew. F- (Kurt.) odnos P- Level
 Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna
 potrošnja kiseonika 4,19-6,93 (5,37±1,00) 2,84-5,16 (4,13±,63) 2,96-3,77 (3,37±,27) 41,80-64,00 (56,19±6,02) ,423 (-1,283)
 -,514 (,318) -,103 (-1,242) -1,325 (2,143) 3,87-7,65 (5,40±1,08) 3,29-6,05 (4,50±,87) 2,89-4,48 (3,54±,41) 42,20-74,60
 (57,19±8,75) ,580 (,142) -,004 (-,721) ,911 (1,186) ,560 (,501) ,005 1,396 1,263 ,106 ,945 ,250 ,272 ,748 U tabeli 29
 prikazani su rezultati multivarijantne analize, na osnovu testiranja značajnosti razlika na nivou od Q=,583, što potvrđuje
 da u sistemu primijenjenih funkcionalnih varijabli ne postoje statistički značajne kvantitativne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira na inicijalnom mjerenju. 1
Tabela 29. Multivarijantna analiza razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe kadeta u funkcionalnim sposobnostima na inicijalnom mjerenju WILK'S LAMBDA TEST ,867 RAO-va F-aproksimacija ,730 Q

,583 U tabeli 30, evidentno je da rezultati diskriminativne analize (Sig=,582) potvrđuju da ne postoje značajne kvalitativne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta u varijablama funkcionalnih sposobnosti na inicijalnom mjerenju. Tabela 30. Diskriminativna analiza funkcionalne sposobnosti razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju 1

kod kadeta Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,154 ,365 ,867 2,85 4 ,582 Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize

može se konstatovati da je u potpunosti potvrđena parcijalna hipoteza H33 koja glasi: 12

ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju. U osnovu rezultata univarijatne, multivarijantne i diskriminativne analize može se zaključiti da je u inicijalnim mjerenjima potvrđeno da ne postoje kvantitativne i kvalitativne razlike u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima između kontrolne i eksperimentalne grupe igrača kategorije početnika, pionira i kadeta. Na osnovu istraženog uzorka, svih ispitanika koji dolaze iz jednog kluba, kontrolne i eksperimentalne grupe koje pripadaju jednoj kategoriji, te kad se uzmu u obzir i selekcije

ispitanika na temelju brojnih antropoloških karakteristika **među kojima su važnu ulogu imale**
motoričke sposobnosti,

3

sasvim sigurno je sve to doprinijelo nepostojanju statistički značajne razlike na inicijalnom mjerenju (početak eksperimenta). Kod ispitanika svih kategorija uočene su razlike između minimalnog i maksimalnog rezultata u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima, što je normalno kad se uzmu u obzir razlike koje postoje između

igrača koji igraju na različitim pozicijama u timu (Bujnovky **i sar.,**

4

2019; Gjonbalaj i sar., 2018). Može se zaključiti da je najvažnije da igrač bude kompatibilan sa zahtjevima fudbalske igre u smislu pozicije igranja u skladu sa svojim morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima.

6.2. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa na finalnom mjerenju U ovom dijelu prikazani su rezultati razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima ispitanika na finalnom mjerenju. Prije početka primjene redovnog i eksperimentalnog programa, treba potencirati da u inicijalnim mjerenjima nijesu utvrđene statistički značajne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe. Nakon četiri mjeseca primijenjenog redovnog i eksperimentalnog programa, izvršeno je finalno mjerenje sa ciljem da se utvrdi finalno stanje i

razlike između ispitanika **kontrolne i eksperimentalne** grupe **u** morfološkim
karakteristikama, **motoričkim i funkcionalnim sposobnostima**

3

na finalnom mjerenju. U ovom potpoglavlju uz korišćenu univarijantnu, multivarijantnu i diskriminativnu analizu, utvrđene su razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe, odnosno postojanje pozitivnog ili negativnog uticaja eksperimentalnog programa na morfološke, motoričke i funkcionalne sposobnosti ispitanika početnika, pionira i kadeta, što je i osnovni cilj ovog istraživanja. Eksperimentalni

tretman je bio koncipiran tako da proizvodi **kvantitativne promjene, ali** istovremeno **da utvrdi** 3
da li je tretman proizveo i **kvalitativne promjene.**

6.2.1. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u morfološkim karakteristikama na finalnom mjeranju 6.2.1.1. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama **na** finalnom 1
mjeranju kod početnika **U**

tabeli 31 analizom rezultata kontrolne i eksperimentalne grupe proizilazi da prosječna visina i masa tijela (Sermahaj i sar., 2018), slični su rezultatima ranijih istraživanja (Smajić i sar., 2015). Tabela 31. Deskriptivni parametri i

univarijantna analiza razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** početnika **u** 1
 morfološkim karakteristikama **na** finalnom **mjeranju**

Varijable Tjelesna masa Tjelesna visina Dužina noge Sjedeća visina Širina ramena Širina kukova Širina karlice

Obim grudnog koša Obim butine **Obim** potkoljenice **Kožni nabor trbuha Kožni nabor** butine 8
Kožni nabor

potkoljenice Mišićna masa (kg) Masa masnog tkiva (kg) Mišićna masa (%) Masa masnog tkiva (%) KG. Min. – Max. (Mean± SD) 30,70-57,00 (43,25±7,50) 144,50-168,20 (156,15±8,06) 82,00-99,70 (90,64±5,95) 78,00-87,20 (80,53±3,11) 28,40-36,00 (33,17±2,44) 23,80-29,80 (26,90±2,02) 21,60-28,10 (24,23±2,16) 62,00-88,50 (73,99±7,69) 34,50-52,70 (44,05±4,63) 26,50-33,50 (30,30±2,19) 4,00-31,00 (9,26±7,98) 5,00-23,80 (11,66±6,15) 6,00-16,20 (9,88±3,42) 14,50-26,00 (21,10±4,11) 1,40-16,60 (4,64±4,62) 38,70-54,20 (48,80±5,00) 2,94-19,17 (9,20±5,86) KG. Skew. (Kurt.) ,101 (,261) ,314 (-,768) ,142 (-1,372) 1,326 (,885) -,906 (-,062) -,358 (-,637) ,292 (-,840) ,449 (,287) -,268 (2,346) -,200 (-,894) 2,694 (7,765) 1,222 (,466) 1,146 (,177) -,318 (-1,113) 2,303 (5,604) -,881 (,187) ,801 (-,841) EG. Min. – Max. (Mean±SD) 30,70-47,70 (39,96±5,62) 142,00-163,10 (153,67±6,28) 80,40-91,00 (87,80±3,50) 73,40-87,00 (80,28±3,33) 29,00-34,60 (33,08±1,82) 24,30-28,70 (26,54±1,48) 21,50-25,90 (23,93±1,58) 64,00-77,20 (71,57±4,01) 38,00-46,50 (42,45±3,09) 26,80-33,50 (29,87±2,09) 4,10-24,80 (9,16±6,16) 8,82-23,00 (13,08±4,54) 8,20-14,60 (10,06±1,77) 14,10-22,90 (18,95±2,48) 2,10-9,30 (4,84±2,37) 43,04-50,71 (47,51±2,41) 6,03-20,21 (11,77±4,52) EG Skew. (Kurt.) -,080 (-1,133) -,563 (,335) -1,322 (1,045) -,081 (3,273) -1,413 (1,648) -,063 (-1,075) -,501 (-1,013) -,452 (-,110) -,050 (-1,452) ,245 (-,625) 2,183 (4,983) 1,505 (1,548) 2,123 (5,445) -,375 (,592) ,892 (-,354) -,498 (-,446) ,644 (-,478) F- odnos 1,238 ,589 1,685 ,030 ,009 ,206 ,125 ,777 ,824 ,201 ,001 ,344 ,022 1,994 ,015 ,534 1,196 P- Level ,282 ,453 ,210 ,864 ,927 ,656 ,728 ,390 ,376 ,659 ,975 ,565 ,884 ,175 ,905 ,474 ,288 Minimalni i maksimalni rezultati varijabli generalno se kreću u očekivanom rasponu, takođe i vrijednosti

asimetričnosti i zakrivljenosti (Skew. i Kurt.) imaju normalnu raspodjelu. Međutim, kod varijabli - kožni nabor trbuha, masa masnog tkiva (kontrolna grupa), sjedeća visina, kožni nabor trbuha i potkoljenice (eksperimentalna grupa), rezultati ukazuju na homogenu neusklađenost u vrijednosti kurtozisa, što je normalno kada se uzmu u obzir faktor rasta i razvoja, genetike i da su ispitanici početnici u fudbalu. Na osnovu rezultata univarijantne analize (tabela 31) vrijednosti koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti P-Level u nivou ($p < ,05$), ne postoje statistički značajne kvantitativne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika **u** varijablama morfoloških karakteristika **na finalnom mjerenju.**

1

Na osnovu vrijednosti $Q = ,329$ (tabela 32) dobijenih primjenom multivarijantne analize, vidimo da u sistemu primijenjenih morfoloških varijabli ne postoje statistički značajne kvantitativne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika **na finalnom mjerenju.**

1

Tabela 32. Multivarijantna analiza razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** ispitanika kategorije početnika **u** morfološkim karakteristikama **na finalnom mjerenju WILK'S LAMBDA TEST** ,046 **RAO-va F-aproksimacija** 2,443 **Q**

,329 U tabeli 33, na osnovu rezultata diskriminativne analize $\text{sig} = .057$, takođe

se potvrđuje da **ne postoji statistički značajna** kvalitativna **razlika** u morfološkim karakteristikama **između kontrolne i eksperimentalne grupe**

45

početnika

na finalnom mjerenju. Tabela 33. Diskriminativna analiza morfoloških karakteristika razlike **između** kontrolne **i** eksperimentalne **grupe na finalnom mjerenju**

38

kod početnika Func

Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 19,

9

812 ,976 ,048 31,87 15 ,057 Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize može se utvrditi da ne postoje razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju. Tako se može zaključiti da je u potpunosti potvrđena parcijalna hipoteza H41 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod

mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije početnika, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju. Na temelju dobijenih rezultata može se konstatovati da eksperimentalni program (vježbe statičkih istezanja) nije uticao na kvantitativne i kvalitativne promjene morfoloških karakteristika (visina i masa tijela) ispitanika početnika (Sermahaj i sar., 2018). Bez značajnog uticaja su vježbe fleksibilnosti na visinu i masu tijela, što je potvrđeno i od drugih autora (Mayorga i sar., 2014). 6.2.1.2. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama **na finalnom** **mjerenju** 1

kod pionira Analizirajući rezultate tabele 34, uočavamo da su dobro grupisani oko srednjih vrijednosti rezultata, nema ekstremno velikih odstupanja od standardne devijacije i nema velikog raspona između minimalnog i maksimalnog rezultata. Međutim, vrijednosti kurtosisa (Kurt.) ukazuju na homogenu neusklađenost u longitudinalnom dimenzionalitetu skeleta i volumenu masnog tkiva, što je normalno kada se uzmu u obzir individualne razlike rasta i razvoja tokom ovog perioda. Tabela 34. Deskriptivni parametri i

univarijantna analiza razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** pionira **u** morfološkim karakteristikama **na finalnom** **mjerenju** 1

Varijable Tjelesna masa Tjelesna visina Dužina noge Sjedeća visina Širina ramena Širina kukova Širina karlice

Obim grudnog koša **Obim** butine **Obim** potkoljenice **Kožni nabor trbuha** **Kožni nabor** butine **Kožni nabor** 8

potkoljenice Mišićna masa (kg) Masa masnog tkiva (kg) Mišićna masa (%) Masa masnog tkiva (%) KG. Min. – Max. (Mean± SD) 33,90-66,00 (54,31±9,16) 144,50-179,30 (170,35±9,61) 84,20-104,80 (97,31±5,43) 74,00-94,80 (88,70±5,67) 29,70-39,40 (37,06±2,62) 24,70-32,80 (29,85±2,41) 22,70-29,80 (26,95±2,11) 71,50-87,70 (80,34±4,60) 39,30-53,80 (47,07±4,18) 28,30-37,30 (33,11±2,76) 4,20-15,00 (7,09±3,01) 5,00-18,60 (8,50±3,50) 5,20-12,80 (8,48±2,02) 16,20-33,70 (27,65±4,76) 2,20-10,90 (4,56±2,26) 46,81-52,46 (50,86±1,88) 5,36-16,51 (8,24±3,07) KG. Skew. (Kurt.) -1,109 (1,287) -1,930 (4,570) -1,634 (3,901) -1,692 (3,596) -2,199 (5,951) -1,040 (,683) -1,274 (2,816) -1,213 (2,420) -,964 (,788) -,368 (-,534) 2,663 (8,190) 2,417 (7,180) ,498 (,701) -1,479 (2,356) 2,219 (,5,940) -1,406 (,785) 1,961 (4,484) EG. Min. – Max. (Mean±SD) 41,70-66,10 (56,15±8,30) 160,30-182,40 (169,75±7,08) 90,80-106,60 (96,83±4,61) 82,70-94,70 (89,14±3,97) 33,60-40,40 (36,15±1,95) 27,00-32,00 (30,01±1,59) 25,00-30,50 (26,65±1,53) 72,50-86,30 (80,25±5,25) 42,20-52,60 (49,01±3,32) 28,20-38,60 (34,50±2,85) 5,80±10,00 (7,20±1,20) 6,20-13,20 (8,31±1,96) 5,80-10,60 (7,76±1,66) 19,70-35,40 (28,49±5,25) 2,30-7,00 (5,10±1,34) 47,24-59,01 (50,52±3,19) 3,87-12,65 (9,25±2,73) EG Skew. (Kurt.) -,470 (-1,144) ,510 (-,345) ,831 (,361) -,356 (-1,186) ,597 (,632) -,789 (-,450) 1,613 (2,830) -,315 (-1,786) -,799 (-,233) -,762 (,839) ,922 (1,440) 1,417 (2,570) ,482 (-,820) -,329 (-1,448) -,524 (,069) 1,856 (4,270) -,347 (-,392) F- odnos ,266 ,029 ,055 ,047 ,941 ,036 ,150

,002 1,582 1,456 ,013 ,025 ,898 ,169 ,493 ,099 ,725 P- Level ,611 ,865 ,816 ,830 ,343 ,851 ,703 ,967 ,221 ,241 ,909 ,876 ,354 ,685 ,490 ,756 ,404

Rezultati univarijantne analize (tabela 34), **na osnovu** vrijednosti **koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti P-Level**

1

u nivou ($p < ,05$), ukazuju da u finalnom mjerenju između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira u varijablama morfoloških karakteristika ne postoje statistički značajne kvantitativne razlike (Sermaxhaj i sar., 2017c).

Tabela 35.

Multivarijantna analiza razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** pionira **u** morfološkim karakteristikama **na finalnom mjerenju WILK'S LAMBDA TEST** ,222 **RAO-va F-aproksimacija** 1,237 **Q** ,424 Dobijeni **rezultati**

1

multivarijantne analize u tabeli 35 ukazuju da u morfološkim varijablama nema značajne razlike ($Q = ,424$),

između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira **na finalnom mjerenju. Tabela** 36. **Diskriminativna analiza** morfoloških karakteristika razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju**

1

kod pionira Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 1,953 ,813 ,339 15,70 15 ,402 U tabeli 36, vrijednosti rezultata diskriminativne analize ($\text{sig} = ,402$) jasno ukazuju da nije došlo do značajnih kvalitativnih promjena u morfološkim karakteristikama između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira na finalnom mjerenju. Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize može se potvrditi da eksperimentalni program (vježbe statičkog istezanja) nije uticao na kvantitativnu i kvalitativnu promjenu morfoloških karakteristika ispitanika pionira. Tako da se može zaključiti da je u potpunosti potvrđena parcijalna hipoteza H42 koja glasi: ne postoji statistički značajna promjena rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju. 6.2.1.3. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u morfološkim karakteristikama **na finalnom mjerenju**

1

kod kadeta Rezultati deskriptivnih parametara morfoloških karakteristika (tabela 37) ukazuju da nema statistički značajnih odstupanja distribucije rezultata od normalne distribucije kod ispitanika kontrolne i eksperimentalne grupe, a asimetričnost i zakrivljenost kreću se oko normalnih vrijednosti (Skew. i Kurt.). Međutim, neusklađenost homogenosti

grupa uočena je kod varijabli - širina ramena, kožni nabor butine i potkoljenice (kontrolna grupa) i kožni nabor trbuha (eksperimentalna grupa). U tabeli 37 prikazani su

rezultati univarijantne analize, na osnovu vrijednosti **koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti** 1
P-Level

u nivou ($p < 0,05$), a rezultati finalnog mjerenja

ukazuju da ne **postoje statistički značajne** kvantitativne **razlike između** kontrolne **i** 56
eksperimentalne **grupe** ispitanika pionira **u varijablama**

morfoloških karakteristika (Sermahaj i sar., 2017a). Tabela 37. Deskriptivni parametri i univarijantna analiza

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kategorije kadeta **u** morfološkim 1
karakteristikama **na finalnom mjerenju**

KG. Min. – Max. Varijable (Mean± SD) Tjelesna masa 48,30-84,20 (62,20±8,84) Tjelesna visina 168,70-190,60 (177,12±6,50) Dužina noge 98,30-112,40 (104,90±3,97) Sjedeća visina 88,10-100,40 (91,45±3,52) Širina ramena 33,20-40,40 (38,51±1,86) Širina kukova 29,40-35,00 (31,77±1,56) Širina karlice 25,30-31,10 (28,20±1,74) Obim grudnog koša 82,50-99,60 (87,30±4,98) Obim butine 46,30-57,90 (50,96±2,91) Obim potkoljenice 29,90-39,40 (34,76±2,41) Kožni nabor trbuha 6,80-12,60 (9,44±2,19) Kožni nabor butine 6,60-20,00 (11,37±3,33) Kožni nabor potkoljenice 6,60-18,40 (9,92±2,97) Mišićna masa (kg) 24,80-46,30 (32,80±5,51) Masa masnog tkiva (kg) 2,30-7,40 (4,23±1,55) Mišićna masa (%) 48,25-54,98 (52,58±1,96) Masa masnog tkiva (%) 3,70-12,93 (6,94±2,79) KG. Skew. (Kurt.) 1,193 (2,134) ,659 (-,160) ,332 (-,190) 1,585 (2,064) -2,282 (6,604) ,312 (,404) -,167 (-,712) 1,753 (2,742) 1,027 (2,223) -,187 (,991) ,245 (-1,574) 1,495 (3,872) 2,337 (6,605) 1,146 (2,612) 1,132 (,391) -,891 (,648) 1,026 (,297) EG. Min. – Max. (Mean±SD) 54,10-82,50 (64,05±8,04) 167,60-189,00 (177,68±6,75) 97,70-111,50 (104,98±4,24) 88,60-99,00 (93,35±3,27) 36,10-42,30 (38,84±2,26) 28,30-35,80 (31,86±2,14) 25,60-31,40 (27,93±1,76) 78,50-100,00 (86,55±5,64) 46,50-60,30 (51,43±3,70) 33,30-38,50 (35,47±1,75) 8,20±24,00 (11,88±4,26) 7,60-17,40 (11,75±2,71) 7,40-13,80 (10,05±2,08) 28,10-39,90 (32,78±3,52) 2,90-12,80 (6,00±2,77) 48,36-53,79 (51,29±1,64) 4,96-13,79 (8,82±2,63) EG Skew. (Kurt.) ,912 (1,234) ,274 (-,366) -,149 (-,415) ,247 (-,758) ,137 (-1,682) ,184 (-,375) ,764 (,342) 1,014 (2,066) 1,043 (1,765) ,342 (-1,113) 2,463 (6,485) ,352 (,479) ,187 (-,968) ,525 (,059) 1,395 (2,514) -,476 (-,271) ,278 (-,143) F- odnos ,288 ,043 ,002 1,869 ,147 ,014 ,147 ,119 ,116 ,674 3,109 ,091 ,014 ,000 3,701 3,029 2,887 P- Level ,597 ,838 ,965 ,185 ,705 ,906 ,705 ,733 ,737 ,420 ,092 ,766 ,906 ,993 ,067 ,096 ,103 Analizirajući tabelu 38, značajnost vrijednosti multivarijantne analize $Q=,268$, uočljivo je da u finalnom mjerenju ne postoje kvantitativne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta u morfološkim varijablama. Tabela 38.

Multivarijantna analiza razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** kadeta **u** morfološkim karakteristikama **na finalnom mjerenju WILK'S LAMBDA TEST** ,173 **RAO-va F-aproksimacija** 1,685 **Q** 1

,268 U tabeli 39, analizirajući rezultate diskriminativne analize ($\text{sig} = ,103$), može se ukazati da u prostoru istraživanih morfoloških karakteristika u finalnom mjerenju, ne postoje kvalitativno značajne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta. Tabela 39. Diskriminativna analiza morfoloških karakteristika razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju kod kadeta Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 3,619 ,885 ,216 22,188 15 ,103 Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize može se potvrditi da eksperimentalni program (vježbe statičkog istezanja) nije uticao na kvantitativnu i kvalitativnu promjenu morfoloških karakteristika ispitanika kadeta. Tako da se može zaključiti da je u potpunosti potvrđena parcijalna hipoteza H43 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije kadeta, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju. Na osnovu rezultata ovog istraživanja, može se zaključiti da vježbe statičkog istezanja koje se primjenjuju tokom pripremnog i takmičarskog perioda na kraju treninga (u fazi oporavka) nemaju ni pozitivan, ni negativan uticaj na morfološke karakteristike mladih fudbalera kategorije početnika, pionira i kadeta. 6.2.2. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u motoričkim sposobnostima na finalnom mjerenju 6.2.2.1. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim **sposobnostima na finalnom mjerenju** 1

kod početnika Analizom rezultata tabele 40,

na kojoj su prikazani osnovni statistički parametri motoričkih **sposobnosti** kontrolne i **eksperimentalne grupe** početnika **na finalnom mjerenju, može se konstatovati** 1

da su rezultati finalnog mjerenja prilično homogenizovani na inicijalnom mjerenju i da su ispitanici značajno popravili vrijednost rezultata. Distribucija rezultata dobro je grupisana (vrijednosti Skew. i Kurt.) i nema veliko značajno odstupanje rezultata od normalne vrijednosti. Takođe, u tabeli 40, prikazani su rezultati univarijantne analize. Vrijednosti koeficijenta

F-odnosa i njihove **značajnosti P-Level** u **nivou ($p < ,05$)**, **ukazuju da** ne postoje **statistički** 26

značajne kvantitativne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika **u** varijablama
 motoričkih sposobnosti **na** finalnom **mjerenju.** početnika **u**

1

motoričkim sposobnostima na finalnom mjerenju KG. Min. – Max. Varijable (Mean± SD) KG. EG. Skew. Min. – Max. (Kurt.) (Mean±SD) EG. Skew. (Kurt.) F- odnos P- Level Duboki pretklon u sjedjenju Upor ležeći za rukama - sklekov
 Podizanje trupa iz ležanja na leđima

Skok iz polučučnja bez pripreme Skok iz polučučnja sa pripremom

5

Maksimalni skok sa pripremom Sprint 5m Sprint 10m Sprint 30m Ajaksov test 5x10m Cik-Cak trčanje bez lopte Cik-Cak trčanje sa loptom Jačina mišića fleksora u koljenu Jačina mišića ekstenzora u koljenu -11,00-12,00 (1,40±7,67) 9,00-40,00 (22,00±10,23) 15,00-65,00 (44,80±17,55) 20,20-38,30 (26,41±6,10) 24,70-43,70 (31,13±6,44) 26,30-41,70 (34,89±6,62) 1,12-1,37 (1,19±,07) 1,89-2,26 (2,08±,10) 4,49-5,85 (5,19±,41) 13,33-15,06 (13,96±,60) 6,28-7,78 (6,91±,44) 7,70-10,55 (8,75±,89) 47,70-105,30 (71,33±19,53) 38,30-81,70 (61,54±14,64) -,408 (-,880) ,166 (-,682) -,494 (-,633) 1,264 (,532) ,941 (-,202) ,826 (,187) 1,706 (2,334) -,068 (-,127) -,028 (-,265) 1,032 (-,094) ,602 (,254) ,631 (,340) ,273 (-1,113) -,225 (-1,184) -4,00-10,00 (2,00±3,71) 10,00-30,00 (16,80±7,94) 14,00-50,00 (30,30±16,69) 18,7-31,60 (25,4±4,22) 22,07-34,30 (28,67±4,52) 25,40-36,10 (31,46±4,14) 1,11-1,39 (1,21±,08) 1,92-2,23 (2,04±,09) 4,77-5,80 (5,23±,28) 12,51-15,04 (13,43±,87) 6,12-7,39 (6,58±,44) 7,34-9,01 (8,27±,54) 43,60-87,30 (59,42±14,18) 41,40-75,10 (60,07±11,05) ,684 (2,067) ,946 (-,552) -,248 (-1,433) -335 (1,058) -,533 (-1,432) -,533 (-1,432) ,793 (,955) ,514 (-,265) ,396 (1,001) ,861 (-,457) ,772 (-,747) -,516 (-,848) ,619 (-,036) -,546 (-,828) ,050 1,615 ,345 ,696 ,971 1,924 ,678 ,556 ,081 2,478 2,694 2,051 2,437 ,064 ,826 ,220 ,564 ,415 ,337 ,182 ,421 ,466 ,779 ,133 ,118 ,169 ,136 ,803 Analizom tabele 41, rezultata multivarijantne analize (Q=,348) vidimo da u sistemu primijenjenih motoričkih varijabli ne postoje statistički kvantitativne značajne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika **na finalnom mjerenju.**

1

Tabela 41. Multivarijantna analiza razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** početnika **u** motoričkim **sposobnostima na finalnom mjerenju WILK'S LAMBDA TEST RAO-va F-aproksimacija Q**

,193 1,492 ,348 Značajnost razlike između grupa testirana je diskriminativnom analizom (tabela 42). Analizirajući rezultate diskriminativne analize (sig=,203), može se potvrditi da u finalnom mjerenju u motoričkim varijablama, ne postoje kvalitativne statistički značajne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika. Tabela 42. Diskriminativna analiza motoričkih sposobnosti razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju kod početnika Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 4,172 ,898 ,193 18,077 14 ,203 Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize može se potvrditi da

eksperimentalni program (statička istežanja) nije uticao na kvantitativnu i kvalitativnu promjenu motoričkih sposobnosti ispitanika početnika. Tako da

može se zaključiti **da je u potpunosti potvrđena** parcijalna **hipoteza** H51 **koja glasi:** 12

ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti kod kategorije početnika, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju. Na temelju rezultata iz ovog istraživanja, potvrđuje se da vježbe statičkog istežanja ne utiču na pozitivne ili negativne promjene motoričkih varijabli kod igrača početnika (na varijablu agilnosti, Ajaksov test 5 x 10 m i cik-cak trčanje bez i sa loptom (Sermaxhaj i sar., 2018). Bez značajnog uticaja statičko istežanje (u fazi zagrijavanja) na agilnost sa loptom, utvrđeno je kod mladih fudbalera i kod drugih autora (Brandey i sar., 2012). Takođe, rezultati studije potvrđuju da specifično zagrijavanje, koje bi bilo primijenjeno na drugi dio zagrijavanja, ne samo da bi eliminisalo negativne efekte izazvane statičkim istežanjima, već bi poboljšalo vrijeme sprinta na 20m (Kyranoudis i sar., 2018). 6.2.2.2. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim **sposobnostima na finalnom** **mjerenju** 1

kod pionira Rezultati deskriptivnih statistika motoričkih varijabli na finalnom mjerenju (tabeli 43)

ukazuju da nema statistički značajnog odstupanja od normalne distribucije kod 59

kontrolne i eksperimentalne grupe pionira. Na homogenost grupa, skoro na svim varijablama, ukazuju i vrijednosti asimetričnosti i zakrivljenosti (Skew. i Kurt.). U tabeli 43 prikazani su

rezultati univarijantne analize, na osnovu rezultata **koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti P-** **Level** 1

u nivou ($p < 0,05$), koji ukazuju da u prostoru motoričkih varijabli ne postoje kvantitativne statistički značajne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira **u finalnom mjerenju.** 1

pionira u motoričkim sposobnostima na finalnom mjerenju KG. Min. – Max. Varijable (Mean± SD) KG. EG. Skew. Min. – Max. (Kurt.) (Mean±SD) EG. Skew. (Kurt.) F- odnos P- Level Duboki pretklon u sjedjenju Upor ležeći za rukama - sklekovi Podizanje trupa iz ležanja na leđima

Skok iz polučučnja bez pripreme Skok iz polučučnja sa pripremom

5

Maksimalni skok sa pripremom Sprint 5m Sprint 10m Sprint 30m Ajaksov test 5x10m Cik-Cak trčanje bez lopte Cik-Cak trčanje sa loptom Jačina mišića fleksora u koljenu Jačina mišića ekstenzora u koljenu -14,00-7,00 (-0,50±6,00) 10,00-30,00 (21,91±7,31) 20,00-72,00 (41,16±15,67) 21,70-37,70 (29,95±4,87) 24,80-39,70 (32,55±5,28) 29,10-46,70 (38,78±5,23) 1,09-1,38 (1,20±,09) 1,80-2,30 (2,04±,14) 4,37-5,51 (4,89±,33) 12,49-14,62 (13,53±,61) 6,36-7,29 (6,75±,31) 7,69-9,89 (8,46±,62) 61,40±132,30 (93,98±24,82) 65,10-117,30 (94,41±18,61) -1,131 (,932) -,275 (-1,638) -,449 (-,271) ,207 (-,690) ,067 (-1,493) -,496 (-,451) ,701 (-,688) ,172 (-,755) ,092 (-,613) ,053 (-,619) ,635 (-,968) 1,229 (1,244) ,269 (-1,428) -,439 (-1,249) -12,00-12,00 1,66±7,25) 12,00-45,00 (25,16±9,36) 25,00-72,00 (53,08±16,80) 24,80-38,70 (32,64±4,71) 27,30-46,50 (36,51±5,80) 27,30-48,70 (39,93±6,44) 1,09-1,47 (1,20±,15) 1,85-2,39 (2,04±,15) 4,41-5,32 (4,90±,31) 12,07-14,26 (13,33±,61) 6,07-7,80 (6,66±,43) 7,20-9,70 (8,35±,77) 62,90-166,90 (105,38±31,65) 59,20-144,60 (105,36±26,17) -501 (-,518) ,646 (,375) -,551 (-1,260) -,400 (-,629) ,232 (-,705) -,308 (-,292) ,947 (-,806) -,183 (-,405) -,196 (-1,199) -,426 (,091) 1,653 (2,237) ,,244 (-,855) ,324 (-,140) -,031 (-,599) ,635 ,897 ,083 1,886 3,062 ,230 ,113 1,472 ,001 ,676 ,342 ,126 ,964 2,626 ,434 ,354 ,775 ,183 ,094 ,636 ,740 ,237 ,975 ,420 ,565 ,726 ,337 ,110 U tabeli 44 prikazani su rezultati multivarijantne analize (Q=,264) koji ukazuju da u finalnom mjerenju, u motoričkim varijablama, ne postoje statistički značajne razlike između kontrolne i eksperimentalne ispitanika pionira. Tabela 44.

Multivarijantna analiza varijanse između kontrolne i eksperimentalne grupe pionira u motoričkim **spodobnostima na finalnom mjerenju WILK'S LAMBDA TEST** ,146 **RAO-va F-aproksimacija** 2,391 **Q**

1

,264 U tabeli 45, na osnovu vrijednosti rezultata diskriminativne analize (sig =,745), potvrđuje se da u prostoru istraživanih motoričkih sposobnosti ne postoje značajne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira **na finalnom mjerenju.** **Tabela** 45. Diskriminativna **analiza** motoričkih sposobnosti razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju**

1

kod ispitanika kategorije pionira Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,977 ,703 ,506 10,22 14 ,745 Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize, može se potvrditi da eksperimentalni program (vježbe statičkog istezanja) nije uticao na kvantitativnu i kvalitativnu promjenu motoričkih sposobnosti ispitanika pionira.

Može se zaključiti **da je u potpunosti potvrđena** parcijalna **hipoteza** H52 **koja glasi:**

12

ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju. Prethodna istraživanja, takođe, potvrđuju da je bez značaja uticaj hroničnih vježbi statičkog istezanja kod mladih fudbalera (pioniri) u motoričkim varijablama - duboki pretklon u sjedjenju, cik-cak trčanje bez i sa loptom (Sermahaj i sar., 2017c; Rey i sar., 2012), jačina mišića fleksora i ekstenzora u koljenu (Sermahaj i sar., 2017b; Zakas i sar., 2006; LaRoche i sar., 2008) i vertikalni skok (Kinugasa i Kildinga 2009). Ovi dokazi upućuju na to da upotreba statičkog istezanja u dugom trajanju u fazi oporavka kod fudbalera, ne utiče na značajne pozitivne ili negativne promjene motoričkih sposobnosti. Može se zaključiti da primjena dugoročnih vježbi statičkog istezanja u fazi oporavka nema ni pozitivan, ni negativan uticaj na motoričke sposobnosti kategorije pionira. 6.2.2.3. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u motoričkim **sposobnostima na** finalnom 1
mjerenju kod kadeta **U**

tabeli 46 u kojoj su prikazani rezultati deskriptivnih statističkih parametara motoričkih sposobnosti kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta na finalnom mjerenju, utvrđeno je da su dobijeni rezultati normalno distribuirani. Uzorak ispitanika spada u izrazito homogeni skup i ukazuje na vrijednosti asimetričnosti i zakrivljenosti (Skew. i Kurt.). Analizirajući rezultate univarijantne analize (tabela 46),

na osnovu koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti P-Level 1

u nivou ($p < 0,05$), vidljivo je da se kontrolna i eksperimentalna grupa razlikuju u samo jednoj varijabli duboki pretklon u sjedjenju na nivou značajnosti $p = 0,012$ u korist boljih prosječnih vrijednosti eksperimentalne grupe ispitanika kadeta. Kod ostalih varijabli, nijesu utvrđene statistički značajne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe. Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne analize, može se potvrditi da eksperimentalni program (vježbe statičkog istezanja) nije uticao na kvantitativnu promjenu motoričkih sposobnosti, osim u varijabli duboki pretklon u sjedjenju. Utvrđena razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe samo u ovoj varijabli fleksibilnosti, potvrđuje da je eksperimentalni program (vježbe statičkog istezanja) uticao na pozitivne promjene, samo u varijabli koja karakteriše gipkost fudbalera. kadeta u motoričkim sposobnostima na finalnom mjerenju KG. Min. – Max. Varijable (Mean \pm SD) KG. Skew. (Kurt.) EG. Min. – Max. (Mean \pm SD) EG. Skew. (Kurt.) F- odnos P- Level Duboki pretklon u sjedjenju Upor ležeći za rukama - sklekovi Podizanje trupa iz ležanja na leđima

Skok iz polučučnja bez pripreme Skok iz polučučnja sa pripremom 5

Maksimalni skok sa pripremom Sprint 5m Sprint 10m Sprint 30m Ajaksov test 5x10m Cik-Cak trčanje bez lopte Cik-Cak trčanje sa loptom Jačina mišića fleksora u koljenu Jačina mišića ekstenzora u koljenu -8,00-5,00 (-0,41 \pm 3,55) 15,00-47,00 (29,00 \pm 10,41) 18,00-116,00 (51,33 \pm 25,23) 29,30-40,00 (35,57 \pm 3,44) 31,70-42,10 (37,74 \pm 3,57) 37,40-53,90 (43,34 \pm 5,07) 1,05-1,36 (1,18 \pm ,10) 1,78-2,08 (1,92 \pm ,08) 4,23-5,14 (4,66 \pm ,21) 12,36-13,57 (12,87 \pm ,35) 5,88-6,77 (6,23 \pm ,29)

6,93-8,65 (7,73±,52) 65,40-156,40 (115,41±29,92) 67,20-186,60 (120,27±30,33) -,478 (,583) ,509 (-,844) 1,524 (2,441) - ,716 (-,546) -,398 (-1,245) ,712 (,363) ,449 (-1,062) ,295 (,301) ,083 (2,025) ,559 (,361) ,308 (-,912) ,439 (-,637) -,222 (-1,023) ,504 (1,324) -9,00-19,00 (6,25±7,65) 10,00-45,00 (33,08±10,96) 30,00-115,00 (73,91±30,57) 32,00-41,10 (35,95±2,83) 31,30±44,70 (36,91±4,28) 35,60-49,90 (41,51±4,07) 1,05-1,32 (1,14±,09) 1,74-2,01 (1,88±,07) 4,33-4,83 (4,55±,16) 11,33-13,44 (12,57±,64) 5,62-6,72 (6,16±,33) 7,06-8,78 (7,73±,48) 62,20-171,10 (130,98±29,8) 82,30-167,40 (126,48±26,9) -,253 (,220) ,001 (-,592) ,408 (-1,467) ,686 (-,394) ,570 (-,726) ,363 (,363) 2,256 (2,567) ,009 (-,379) ,329 (-1,041) -,194 (-,321) ,138 (-,615) 1,066 (,971) -,866 (1,588) -,225 (-,727) 7,491 ,019 3,895 ,085 ,262 ,943 ,149 ,259 1,738 1,927 ,324 ,000 1,628 ,790 ,012 ,892 ,061 ,774 ,614 ,342 ,704 ,616 ,201 ,179 ,575 ,997 ,215 ,384

Analizirajući rezultate varijable - duboki pretklon u sjedjenju, vrijednosti razlike od 6,66 cm u korist eksperimentalne grupe, uočeno je da je distanca minimalno veća

na finalnom mjerenju, **u odnosu na inicijalno mjerenje**. Takvi rezultati su **i** očekivani jer je **1**
eksperimentalna grupa

tokom pripremnog i takmičarskog perioda izvodila vježbe statičkog istezanja tri puta sedmično. Uticaj primjene dugotrajne vježbe statičkog istezanja na fleksibilnost igrača kategorije kadeta potvrđena je i od strane drugih autora (Fernandez i sar., 2016; Gonçalves i sar., 2013; Akbulut i Agopyan 2015; Zakas 2005). Takođe, kod kategorije igrača kadeta utvrđeno je bez značajnog uticaja dugotrajna vježba statičkog istezanja na brzinu 30m (Fernandez i sar., 2016; Bazett i sar., 2008) i na vertikalni skok (Gonçalves i sar., 2013). Tabela 47.

Multivarijantna analiza razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** kadeta **u** **1**
motoričkim **spodobnostima na** finalnom **mjerenju WILK'S LAMBDA TEST** ,175 **RAO-va F-**
aproksimacija 3, 036 **Q**

0,50 Kvantitativne značajne razlike između kontrolne i eksperimentalne ispitanika potvrđuju i rezultati multivarijantne analize Q=0,50 (tabeli 47). Na osnovu njih

može se konstatovati **da je eksperimentalni program uticao na** kvantitativne promjene **62**
motoričkih sposobnosti

ispitanika kadeta. Tabela 48. Diskriminativna analiza motoričkih sposobnosti razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju kod ispitanika kategorije kadeta Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 4,718 ,908 ,175 26,155 14 ,025 U tabeli 48, na osnovu vrijednosti rezultata diskriminativne analize (sig =,025), uočava se da u prostoru istraživanih motoričkih sposobnosti postoje značajne kvalitativne

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta na finalnom mjerenju.

1

Tabela

49. Diskriminativne funkcije motoričkih sposobnosti između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju kod kadeta Varijable Function 1 Duboki pretklon u sjedjenju ,269 Podizanje trupa iz ležanja na leđima ,194 Ajaksov test 5 x 10m ,136 Sprint 30m ,129 Jačina mišića fleksora u koljenu -,125 Maksimalni skok sa pripremom ,095 Jačina mišića ekstenzora u koljenu ,087 Cik-Cak trčanje bez lopte ,056 Skok iz polučučnja sa pripremom ,050 Sprint 10m -,050 Sprint 5m -,038 Skok iz polučučnja bez pripreme -,029 Tabela 49 iz strukture diskriminacijske funkcije ukazuje je da je najveća razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe uočena na varijabli za procjenu fleksibilnosti (duboki pretklon u sjedjenju). Tabela 50. Diskriminativna funkcija centroida mjerenja motoričkih sposobnosti između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju kod kadeta Grupa KG. finalno mjerenje EG. finalno mjerenje Function 1 -2,080 2,080

Rezultati u tabeli 50 predstavljaju diskriminativnu funkciju centroida na osnovu svih varijabli

2

motoričkih **sposobnosti koje iznose -2,080 i 2,080. Značajnost prikazanih centroida**

(aritmetičke sredine kontrolne i eksperimentalne grupe)

mjerenja koja su testirana kroz značajnost diskriminativne funkcije, ukazuju da je njihova

37

udaljenost (diskriminacija) značajna

između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta na finalnom mjerenju u korist eksperimentalne grupe. Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize, može se potvrditi da eksperimentalni program (statička istezanja) je uticao na kvantitativnu i kvalitativnu promjenu najviše kod varijable - duboki pretklon u sjedjenju kod ispitanika kategorije kadeta. Tako da se može zaključiti da je skoro u potpunosti nepotvrđena parcijalna hipoteza H53 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti kod kategorije kadeta, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju. Može se konstatovati da primjenu vježbi statičkog istezanja na zadnjem dijelu treninga treba početi kod kategorije kadeta (u najboljem slučaju da se radi odvojeno od redovnog treninga). Dobijeni rezultati idu u prilog važnosti primjene vježbe statičkog istezanja na završnom dijelu treninga kod kategorije kadeta, sa ciljem razvoja optimalne fleksibilnosti igrača. Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se konstatovati da dugotrajne vježbe statičkog istezanja koje se primenjuju na kraju treninga (u fazi oporavka), nemaju ni pozitivan, ni negativan uticaj na motoričke sposobnosti, osim kod varijable fleksibilnosti ispitanika kategorije kadeta. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je fleksibilnost mladih igrača iz ovog istraživanja u vrijednosti varijabli duboki pretklon u sjedjenju kod početnika (2,00 cm), pionira (1,66 cm) i kadeta (6,25 cm). Ovi rezultati ukazuju da kadeti imaju najbolje rezultate u odnosu na početnike i pionire, slično ranijem istraživanju (Smajić i sar. 2009b). Ovim se potvrđuje da se fleksibilnost najviše razvije 12 mjeseci nakon (GNPV-a), godine najvećeg

prirasta u visini (Philippaerts i sar., 2006). Međutim, dobijeni rezultati ovog istraživanja pokazuju da je fleksibilnost ove uzrasne kategorije ispod juniora iz Hrvatske sa srednjom vrijednošću od 12,42 cm (Milanović i sar., 2013) i ispod dobrih rezultata profesionalnih igrača, koji se kreću u vrijednostima od 8-18 cm i više. Behm i sar., 2011 utvrdili su da kratka statička istezanja u kombinaciji sa dinamičkom rutinom istezanja u fazi zagrijavanja, imaju pozitivan uticaj na opseg kretanja (test duboki pretklon) i bez inhibicije na motoričke performanse (brzinu i agilnosti). Stoga, može se sugerisati da za razvijanje fleksibilnosti mladih igrača dovoljna je kombinacija statičkog i dinamičkog istezanja u fazi zagrijavanja, te da se samo po individualnim ili grupnim potrebama primenjuju vježbe fleksibilnosti, a u najboljem slučaju da se primenjuje odvojeno od redovnog treninga.

6.2.3. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i razlike između grupa u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju

6.2.3.1. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju

1

kod početnika Analizom tabele 51, rezultata osnovnih deskriptivnih parametra, vidljivo

je da nema statističkih **odstupanja rezultata od normalne distribucije**, što potvrđuje da **su** ispitanici kontrolne **i**

24

eksperimentalne grupe, skoro homogeni. Međutim, rezultati varijabli - forsirani vitalni kapacitet i forsirani ekspiratorni volumen, ukazuju na homogenu usklađenost kontrolne grupe u vrijednosti kurtozisa (Kurt.). početnika u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju KG. Min. – Max. Varijable (Mean± SD) KG. EG. Skew. Min. – Max. (Kurt.) (Mean±SD) EG. Skew. F- (Kurt.) odnos P- Level Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika 2,82-4,97 (3,38±,60) 2,46-4,61 (2,97±,60) 2,66-3,26 (2,97±,20) 50,60-88,40 (71,23±12,42) 2,345 (6,237) 2,572 (7,434) -,208 (-,784) -,388 (-,897) 2,33-4,36 (3,05±,71) 2,19-3,89 (2,76±,48) 2,45-3,16 (2,86±,24) 61,70-90,40 (74,42±8,98) ,729 (-,726) 1,474 (2,691) -,124 (-,982) ,599 (-,338) 1,283 ,790 ,408 1,794 ,272 ,386 ,531 ,197

Rezultati univarijantne analize (tabela 51) **na osnovu** vrijednosti **koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti P-Level**

1

u nivou ($p < ,05$), pokazuju kako ne postoje statistički značajne razlike između grupa u

funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju. Tabela 52. Multivarijantna analiza varijanse razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** početnika **u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju WILK'S LAMBDA TEST RAO-va F-aproksimacija Q**

1

,890 ,464 ,761 Analizirajući tabelu 52, prikazane rezultate multivarijantne analize (Q=,761), vidimo da ne postoji statistički značajna razlika (nivoa aritmetičkih sredina) svih funkcionalnih varijabli

između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika početnika **na finalnom mjerenju. Tabela** 1
53. Diskriminativna **analiza** funkcionalne sposobnosti razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju**

kod početnika Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,124 ,332 ,890 1,86 4 ,760 Rezultati diskriminativne analize (tabela 53) finalnog mjerenja,

jasno pokazuju kako **nema statistički značajnih razlika** (sig =,760), **između analiziranih grupa u**

prostoru istraživane funkcionalne sposobnosti. Na temelju dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize, može se utvrditi da eksperimentalni program (vježbe statičkog istezanja) nije imao značajan uticaj na funkcionalne sposobnosti kod kategorije početnika. Može se tako zaključiti da je u potpunosti potvrđena parcijalna hipoteza H61 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije početnika, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju.
6.2.3.2. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju

kod pionira Prikazani rezultati u tabeli 54 ukazuju da su vrijednosti parametara deskriptivne statistike, minimalni i maksimalni rezultati varijabli, unutar granica očekivanog nivoa i ne odstupaju od normalne distribucije. Tabela 54. Deskriptivni parametri i

univarijantna analiza razlika **između kontrolne i eksperimentalne grupe** pionira **u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju**

KG. Min. – Max. Varijable (Mean± SD) KG. Skew. (Kurt.) EG. Min. – Max. (Mean±SD) EG. Skew. (Kurt.) F- odnos P- Level
Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika 3,82-6,32 (4,68±,77) 3,26-5,39 (4,06±,61) 2,45-3,52 (3,33±,23) 44,3-72,12 (63,79±8,66) 1,153 (,226) 1,028 (,659) -,788 (1,213) ,343 (,263) 2,79-6,14 (4,76±,91) 2,67-4,51 (3,61±,65) 2,65-3,77 (3,37±,33) 48,87-68,67 (65,84±7,44) -,511 (,906) -,084 (-1,609) ,439 (,264) ,234 (-1,563) ,058 2,932 ,710 ,182 ,813 ,101 ,409 ,377

Rezultati univarijantne analize (tabele 54.) **na osnovu** vrijednosti **koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti P-Level**

1

u nivou ($p < 0,05$), pokazuju da ne postoji statistički značajna razlika

između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira **u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju. Tabela 55. Multivarijantna analiza** razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** pionira **u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju WILK'S LAMBDA TEST** ,560 **RAO-va F-aproksimacija** 3,737 **Q**

1

,121 Iz prikazane tabele 55, rezultata multivarijantne analize ($Q = ,121$) potvrđeno je da ne postoje kvantitativne značajne razlike u funkcionalnim varijablama

između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira **na finalnom mjerenju. Tabela 56.** Diskriminativna **analiza** funkcionalne sposobnosti razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju**

1

kod pionira Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,787 ,664 ,560 11,60 4 ,121 U tabeli 56, gdje su rezultati diskriminativne analize ($Sig = ,121$) ukazano je da nije došlo do statistički značajne kvalitativne promjene rezultata u skupu funkcionalnih varijabli između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika pionira na finalnom mjerenju. Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize može se utvrditi da eksperimentalni program (vježbe statičkog istezanja) nije uticao na kvantitativnu i kvalitativnu promjenu funkcionalnih sposobnosti ispitanika pionira. Tako da

može se zaključiti **da je u potpunosti potvrđena** parcijalna **hipoteza** H6 3 **koja glasi:**

12

ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije pionira, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju. 6.2.3.3. Analiza osnovnih deskriptivnih parametara i

razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju

1

kod kadeta Na osnovu vrijednosti rezultata deskriptivnih statistika (tabela 57) varijabli funkcionalnih sposobnosti, postoji razlika između minimalnog i maksimalnog rezultata, ali unutar granica očekivanog nivoa, kao i vrijednosti mjere distribucije asimetričnosti i zakrivljenosti (Skew. i Kurt.) što ukazuje da distribucija ne odstupa od normalne i grupe su homogene. Tabela 57. Deskriptivni parametri i

univarijantna analiza razlike **između kontrolne i eksperimentalne grupe** kadeta **u**
funkcionalnim sposobnostima na finalnom **mjerenju**

1

Varijable KG. Min. – Max. (Mean± SD) KG. EG. Skew. Min. – Max. (Kurt.) (Mean±SD) EG. Skew. (Kurt.) F- odnos P- Level
Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna
potrošnja kiseonika 4,53-9,15 (6,21±1,37) 4,23-8,73 (5,61±1,32) 3,14-3,92 (3,43±,26) 48,60-67,50 (58,91±5,37) ,792 (,330)
1,364 (1,508) ,666 (-,862) -,492 (-,027) 4,60-9,70 (6,38±1,50) 3,64-8,01 (5,51±1,31) 3,16-4,45 (3,65±,36) 49,50-80,40
(61,37±8,96) ,896 (,587) ,786 (-,220) ,970 (,949) 1,037 (,609) ,091 ,034 2,845 ,664 ,766 ,854 ,106 ,424 Analizirajući
rezultate univarijantne analize (tabela 57),

na osnovu vrijednosti **koeficijenta F-odnosa i njihove značajnosti P-Level**

1

u nivou ($p < ,05$), ukazuje se da ne postoji statistički značajna razlika između (aritmetičkih sredina)

kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta **u funkcionalnim sposobnostima na**
finalnom mjerenju. Tabela 58. Multivarijantna analiza razlike **između kontrolne i**
eksperimentalne grupe kadeta **u funkcionalnim sposobnostima na finalnom mjerenju WILK'S LAMBDA**
TEST ,763 **RAO-va F-aproksimacija** 1,473 **Q**

1

,250 Analizom tabele 58, rezultata multivarijantne analize ($Q = ,250$) vidljivo je da ne postoji statistička

značajna razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe kadeta **u funkcionalnim**
sposobnostima na finalnom **mjerenju.**

1

U tabeli 59 dati su rezultati diskriminativne analize ($\text{sig} = ,248$) koji ukazuju da u prostoru istraživanih funkcionalnih sposobnosti ne postoje statistički značajne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika kadeta. Tabela 59. Diskriminativna analiza funkcionalnih sposobnosti razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju kod kadeta Func Eigenvalue Canonical R

Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,310 ,487 ,763 **5,** 402 4 ,248 **Na osnovu**

2

dobijenih rezultata univarijantne, multivarijantne i diskriminativne analize, može se utvrditi da eksperimentalni program (vježbe statičkog istezanja) nije uticao na kvantitativnu i kvalitativnu promjenu funkcionalnih sposobnosti ispitanika kadeta. Tako da se može zaključiti da je u potpunosti potvrđena parcijalna hipoteza H63 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije kadeta, između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju. Takvi rezultati su očekivani jer kontrolna i eksperimentalna grupa pripadaju jednom klubu i istoj uzrasnoj kategoriji, a i trenirali su zajedno, osim u fazi oporavka kada je eksperimentalna grupa izvodila vježbe statičkog istezanja.

Na osnovu centralnih i disperzionih parametara **varijabli za procjenu** morfoloških karakteristika, **motoričkih** i funkcionalnih **sposobnosti**

57

kod mladih fudbalera (početnika, pionira i kadeta), može se zaključiti da su dobijeni rezultati u finalnom mjerenju normalno distribuirani i da su ispitanici svih kategorija prosječno homogeni, sa manjim odstupanjima rezultata. Analizom rezultata na finalnom mjerenju utvrđeno je da eksperimentalni program (vježbe statičkog istezanja) nije dao značajne razlike kod eksperimentalne grupe na morfološke karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti, osim u varijabli fleksibilnosti "duboki pretklon u sjedjenju" kod eksperimentalne grupe kategorije kadeta. Dobijeni rezultati idu u prilog važnosti vježbe statičkog istezanja u fazi oporavka kod kategorije kadeta. 6.3. Analiza razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja U trećem dijelu su prikazani rezultati

razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja, posebno **kod kontrolne i eksperimentalne grupe**

1

sa ciljem utvrđivanja uticaja redovnog programa rada na morfološke karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti ispitanika. Nakon završetka redovnog i eksperimentalnog programa i finalnog mjerenja analizom T-testa će se utvrditi kvantitativne promjene, a diskriminativnom analizom kvalitativne promjene. Analizom T-testa za male zavisne uzorke će se utvrditi značajne kvantitativne razlike u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima

između inicijalnog i finalnog mjerenja, posebno **kod eksperimentalne i kontrolne grupe** ispitanika

18

kategorije početnika, pionira i kadeta. Za svaku varijablu će biti izračunati sljedeći parametri: vrijednost T-testa (t), stepeni slobode (df) i vjerovatnoća značajnosti T-testa u nivou ($p < ,05$). 6.3.1. Analiza razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja u morfološkim karakteristikama, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe 6.3.1.1. Analiza razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja u morfološkim karakteristikama posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe početnika U tabeli 60

analizom dobijenih rezultata (T- testa), može se zaključiti da postoje statistički značajne razlike

1

kod ispitanika pionira eksperimentalne grupe između inicijalnog i finalnog mjerenja morfoloških karakteristika u varijablama: tjelesna masa i visina (Sermahaj, 2017d), obim grudnog koša, butine i potkoljenice, kožni nabor trbuha i mišićna masa. Kod ostalih varijabli nijesu utvrđene statistički značajne razlike. Dugotrajni fudbalski trening uticao je na pozitivne promjene morfoloških karakteristika kod fudbalera pionira (Vantinnen i sar., 2011; Hammami i sar., 2013; Philippaerts 2006). Može se konstatovati da je program treninga (redovni i eksperimentalni) proizveo pozitivne promjene kod eksperimentalne grupe pionira u morfološkim karakteristikama, rezultati (tabela 66) potvrđuju da ova uzrasna kategorija najviše se razvija u longitudinalnoj i cirkularnoj dimenzionalnosti skeleta, masi tijela i mišićnoj masi. Takvi rezultati su očekivani jer je u pitanju doba razvoja kada dolazi do najvećeg rasta visine i mase tijela (Philippaerts, 2006). Kod pionira is Portugalije, potvrđeno je da težina i visina tijela imaju značajan doprinos u sprint i vertikalnom skoku (Malina i sar., 2004). Tabela 67. Diskriminativna analiza morfoloških karakteristika razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja

kod eksperimentalne grupe pionira Func **Eigenvalue Canonical** R **Wilks' Lambda Chi-square.** 9
df Sig. 1

1,787 ,801 ,359 14,860 15 ,462 U tabeli 67, sa rezultatima diskriminativne analize (sig.=,462), utvrđeno je da u morfološkim varijablama ne postoje statistički značajne kvalitativne

razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe ispitanika pionira. **Na** 14
osnovu dobijenih rezultata T-testa **i**

diskriminativne analize, može se potvrditi da je program treninga (redovni i eksperimentalni) djelimično uticao na kvantitativnu promjenu morfoloških karakteristika, ali nijesu potvrđene kvalitativne promjene kod eksperimentalne grupe ispitanika kategorije pionira. Iz toga proizilazi da je djelimično potvrđena parcijalna hipoteza H72 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika kod kategorije pionira, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe. Dobijeni rezultati ukazuju na činjenicu da postizanje optimalne kvalitativne

promjene na nekim morfološkim varijablama **za procjenu** mišićne mase **i mase masnog**
tkiva,

3

nije moguće ostvariti bez individualnih dodatnih tretmana. 6.3.1.3. Analiza razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja u morfološkim karakteristikama, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe kadeta Tabelom 68,

analizom dobijenih rezultata (T- testa), može se pokazati da postoje statistički značajne razlike

1

kod ispitanika kadeta kontrolne grupe, između inicijalnog i finalnog mjerenja u morfološkim karakteristikama. Promjene su uočene u varijablama: tjelesna visina, širina ramena, kožni nabor trbuha, butine i potkoljenice, mišićna masa i masa masnog tkiva. Kod ostalih varijabli nijesu utvrđene statistički značajne razlike. Dobijenim rezultatima može se konstatovati da je redovni program treninga (tokom pripremnog i takmičarskog perioda) kao i faktor rasta i razvoja, proizveo pozitivne promjene u morfološkim karakteristikama ispitanika kadeta. Takođe, utvrđeno da je pod uticajem fudbalskog treninga u trajanju od 12 sedmica, došlo do promjena u morfološkim karakteristikama kod mladih igrača (Šamija, 2011). Može se pretpostaviti da je

do porasta u tjelesnoj masi (tabela 68) došlo usljed povećanja mišićne mase i redukcije potkožnog masnog tkiva

3

u ukupnoj vrijednosti, ali paralelno sa povećanjem mišićne mase došlo je i do porasta mjera kožnog nabora trbuha, butina i potkoljenice, što je normalno kada se uzmu u obzir da kod ove uzrasne kategorije počinje ravnoteža između longitudinalnog dimenzionaliteta i volumena mase tijela. kontrolne grupe kadeta KG. inicial KG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Tjelesna masa Tjelesna visina Dužina noge Sjedeća visina Širina ramena Širina kukova Širina karlice

Obim grudnog koša Obim butine Obim potkoljenice Kožni nabor trbuha Kožni nabor butine

8

potkoljenice Mišićna masa (kg) Masa masnog tkiva (kg) Mišićna masa (%) Masa masnog tkiva (%) 61,16±10,21
175,70±6,40 103,05±5,52 90,92±3,43 37,81±2,00 30,74±3,26 27,49±2,08 86,56±5,01 50,75±3,94 34,57±2,64 8,13±3,42
9,70±4,20 8,46±3,93 30,59±6,03 5,60±2,01 49,50±3,92 9,13±3,03 62,20±8,84 177,12±6,50 104,90±3,97 91,45±3,52
38,51±1,86 31,77±1,56 28,20±1,74 87,30±4,98 50,96±2,91 34,76±2,41 9,44±2,19 11,37±3,33 9,92±2,97 32,80±5,51
4,23±1,55 52,58±1,96 6,94±2,79 11 -1,392 -5,730 -1,545 -854 -3,448
-1,256 -1,456 -1,055 -,340 -,949 -2,245 -2,292 -3,127 -2,381 2,400 -2,726 2,569 ,191 ,000 ,151 ,411 ,005 ,235 ,173 ,314 ,740
,363 ,046 ,043 ,010 ,036 ,035 ,020 ,026 Analizirajući tabelu 69, rezultate diskriminativne analize (sig.=,385) u prostoru morfoloških varijabli kod kontrolne grupe kadeta, vidljivo je da nije došlo do

statistički značajne razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja. Dobijeni rezultati pokazuju **da** redovni **program**

15

rada nije uticao na kvalitativne promjene u morfološkim karakteristikama kod kontrolne grupe kadeta. Tabela 69. Diskriminativna analiza morfoloških karakteristika razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe kadeta Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 2,810 ,859 ,262 18,05 17 ,385 Na osnovu dobijenih rezultata T-testa i diskriminativne analize može se potvrditi da su redovni program treninga i faktor rasta i razvoja, djelimično uticali na kvantitativnu promjenu ispitanika kategorije kadeta. Tako da se može zaključiti da je djelimično potvrđena parcijalna hipoteza H73 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije kadeta, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe. Iz tabele 70,

analizom dobijenih rezultata (T- testa), može se zaključiti da postoje statistički značajne razlike 1

kod ispitanika kadeta eksperimentalne grupe između inicijalnog i finalnog mjerenja u morfološkim karakteristikama. Promjene su vidljive u varijablama: tjelesna i mišićna masa, tjelesna visina, dužina noge, širina ramena, kožni nabor trbuha, butine i potkoljenice. Kod ostalih varijabli nijesu utvrđene statistički značajne razlike. eksperimentalne grupe kadeta KG. inicial KG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Tjelesna masa Tjelesna visina Dužina noge Sjedeća visina Širina ramena Širina kukova Širina karlice

Obim grudnog koša Obim butine **Obim** potkoljenice **Kožni nabor trbuha Kožni nabor** butine 8
Kožni nabor

potkoljenice Mišićna masa (kg) Masa masnog tkiva (kg) Mišićna masa (%) Masa masnog tkiva (%) 62,73±7,63
176,70±6,72 100,58±4,65 92,71±3,30 37,92±2,56 32,04±2,19 27,70±1,30 85,79±5,41 51,90±3,47 35,39±1,68 9,56±3,11
9,78±2,46 8,18±1,98 31,85±3,47 6,00±2,58 50,87±2,09 9,32±3,26 64,05±8,04 177,68±6,75 104,98±4,24 93,35±3,27
38,84±2,26 31,86±2,14 27,93±1,76 86,55±5,64 51,43±3,70 35,47±1,75 11,88±4,26 11,75±2,71 10,05±2,08 32,78±3,52
6,00±2,77 51,29±1,64 8,82±2,63 11 -2,961 -4,959 -6,744 -1,980 -4,602
1,818 -,799 -1,293 1,907 -,706 -3,607 -4,137 -8,915 -5,098 ,000 -,829 ,870 ,013 ,000 ,000 ,073 ,001 ,096 ,441 ,223 ,083 ,495
,004 ,002 ,000 ,000 1,00 ,425 ,403

Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da su **program treninga** 28

(redovni i eksperimentalni) i faktor rasta i razvoja uticali na pozitivne promjene u morfološkim karakteristikama (longitudinalna i cirkularna dimenzionalnost skeleta i volumen mase tijela). Tabela 71. Diskriminativna analiza morfoloških karakteristika razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja

kod eksperimentalne grupe kadeta Func **Eigenvalue Canonical** R **Wilks' Lambda Chi-square.** 9
df Sig. 1

8,967 ,949 ,100 32,19 16 ,009 Rezultati diskriminativne analize iz tabele 71 (sig.=,009) jasno pokazuju da postoji statistički značajna razlika u prostoru morfoloških varijabli kod eksperimentalne grupe, između inicijalnog i finalnog mjerenja. Dobijeni rezultati potvrđuju da je program treninga (redovni i eksperimentalni) uticao na kvalitativne promjene u morfološkim karakteristikama kod eksperimentalne grupe kadeta. Tabela 72. Diskriminativne funkcije morfoloških karakteristika između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe kadeta Varijable Function 1 Dužina noge ,172 Kožni nabor potkoljenice ,160 Kožni nabor butine ,132 Kožni nabor trbuha ,108 Širina ramena -,029 Širina karlice ,000 Tjelesna visina ,025 Obim grudnog koša ,024 Širina kukova -,014 Iz strukture diskriminativne funkcije (tabela 72) uočeno da su varijable; dužina noge i kožni nabori potkoljenice, butina i trbuha, najviše doprinijele značajnim razlikama na ukupnom planu između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe kadeta. Tabela 73. Centroidi mjerenja morfoloških karakteristika između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe ispitanika kategorije kadeta EG. Function 1 Inicijalno mjerenje -2,867 Finalno mjerenje 2,867 Rezultati u tabeli 73, prikazani centroidi mjerenja, testirani kroz diskriminativne funkcije, ukazuju da je njihova udaljenost (diskriminacija) značajna između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe, u korist boljih rezultata finalnog mjerenja. Na osnovu dobijenih rezultata T-testa i diskriminativne analize, pokazano je

kako je, pored djelimičnih **kvantitativnih** promjena, **došlo i do značajnih kvalitativnih promjena**

3

morfoloških varijabli, a rezultat tih promjena predstavlja interakciju djelovanja programa treninga (redovnog i eksperimentalnog) uz faktor faze rasta i razvoja ispitanika kadeta. Ovi rezultati ukazuju na to da biološki faktori i trening fudbala imaju značajan uticaj na morfološke karakteristike kod mladih fudbalera. Može se skoro u potpunosti odbaciti i smatrati nepotvrđenom hipotezu H73 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod mjera za procjenu morfoloških karakteristika, kod kategorije kadeta,

između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe. 6.3.2. **Analiza razlika između inicijalnog i finalnog**

1

mjerenja u motoričkim sposobnostima, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe Jedan od najbitnijih i najčešće testiranih segmenata antropološkog statusa su motoričke sposobnosti sportista. Utvrđivanje promjene strukture motoričkih sposobnosti pod uticajem fudbalskih specifičnih sadržaja treninga (pripremnog i takmičarskog perioda) u odnosu na uzrast, prikazani su primjenom analize razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja (T-testa i diskriminativne analize). 6.3.2.1. Analiza razlika

između inicijalnog i finalnog mjerenja u motoričkim sposobnostima, posebno **kod** kontrolne i **eksperimentalne grupe**

16

,312 Na osnovu dobijenih rezultata T-testa i diskriminativne analize može se potvrditi da je redovni program treninga djelimično uticao na kvantitativnu promjenu u motoričkim sposobnostima, ali bez kvalitativne promjene kod kontrolne grupe početnika. Tako da se može zaključiti da je djelimično potvrđena parcijalna hipoteza H81 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod mjera za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije početnika, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe. Iz tabele 76,

analizom dobijenih rezultata (T- testa), može se zaključiti da postoje statistički značajne razlike

1

kod ispitanika početnika eksperimentalne grupe između inicijalnog i finalnog mjerenja, u motoričkim sposobnostima. Značajne razlike potvrđene su u varijablama brzine trčanja (sprint 5m, 10m i 30m), agilnosti

(Ajaksov test 5 x 10m, cik-cak trčanje bez i sa loptom

11

(Sermahaj, 2017d), fleksibilnosti (duboki pretklon u sjedjenju), repetitivnoj snazi (podizanje trupa iz ležanja na leđima), eksplozivnoj snazi (skok iz polučučnja sa pripremom i maksimalni skok sa pripremom), izokinetičkoj snazi (jačina mišića fleksora u koljenu). Uticaj fudbalskog treninga kod početnika na motoričke sposobnosti (repetitivna snaga, brzina trčanja i agilnost) dobili su i drugi autori (Molnar i sar., 2009). eksperimentalne grupe početnika KG. inicial KG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Duboki pretklon u sjedjenju Upor ležeći za rukama - sklekovi podizanje trupa iz ležanja na leđima

Skok iz polučučnja bez pripreme Skok iz polučučnja sa pripremom

5

Maksimalni skok sa pripremom Sprint 5m Sprint 10m Sprint 30m

Ajaksov test 5 x 10m Cik-Cak trčanje bez lopte

11

Cik-Cak trčanje sa loptom Jačina mišića fleksora u koljenu Jačina mišića ekstenzora u koljenu -0,40±4,32 17,70±8,62 18,00±13,27 24,58±4,84 27,08±4,80 29,62±4,14 1,35±,16 2,17±,09 5,37±,29 14,67±,84 6,93±,31 9,17±,66 39,48±10,48 53,02±15,05 2,00±3,71 16,80±7,94 40,30±16,69 25,4±4,22 28,67±4,52 31,46±4,14 1,21±,08 2,04±,09 5,23±,28 13,43±,87 6,58±,44 8,27±,54 59,42±14,18 60,07±11,05 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -2,319 ,777 -3,694 ,609 -5,150 -6,752 2,828 3,254 3,127 4,071 2,913 2,594 -5,908 -1,474 ,046 ,457 ,005 ,557 ,001 ,000 ,020 ,010 ,012 ,003 ,017 ,029 ,000 ,174 Na temelju rezultata diskriminativne analize u tabeli 77, pokazano je da nema statistički značajne razlike (sig.=,087) u motoričkim varijablama između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe početnika. Tabela 77. Diskriminativna analiza motoričkih sposobnosti - razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja

kod eksperimentalne grupe početnika Func **Eigenvalue Canonical** R **Wilks' Lambda Chi-square** **df**
Sig. 1 9

6,118 ,927 ,140 21,589 14 ,087 Na osnovu dobijenih rezultata T-testa i diskriminativne analize može se potvrditi da je program treninga (redovni i eksperimentalni) skoro u potpunosti uticao na kvantitativnu promjenu u motoričkim sposobnostima, ali bez značajne kvalitativne promjene kod eksperimentalne grupe ispitanika početnika. Tako da se može zaključiti da je skoro u potpunosti nepotvrđena parcijalna hipoteza H81 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod mjera za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije početnika, između inicijalnog i finalnog mjerenja, kod eksperimentalne grupe. Dobijene pozitivne promjene motoričkih sposobnosti, razlog su sadržaja programa treninga tokom pripremnog i takmičarskog perioda i faktora rasta i razvoja morfoloških karakteristika, koji su unapredili i razvijanje motoričke sposobnosti. 6.3.2.2.

Analiza razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja motoričkih **sposobnosti**, posebno **kod** 1
kontrolne i eksperimentalne grupe pionira Tabela 78, **analizom**

dobijenih rezultata (T-testa), ukazuje da postoje statistički značajne razlike kod ispitanika pionira kontrolne grupe između inicijalnog i finalnog mjerenja motoričkih sposobnosti. Razlike su uočene u varijablama: upor ležeći za rukama – sklekovi, podizanje trupa iz ležanja na leđima, cik-cak trčanje bez lopte, jačina mišića fleksora i ekstenzora u koljenu. Analizom rezultata može se utvrditi da je primijenjeni redovni program rada kod pionira, proizveo pozitivne promjene repetitivne snage trupa i ramenog pojasa, agilnosti bez lopte i mišićne snage, fleksora i ekstenzora. Slična istraživanja utvrdila su uticaj na poboljšanje motoričke sposobnosti kod igrača pionira nakon osam mjeseca treninga (Hammami i sar., 2013). Statističke razlike nijesu ispoljene u gipkosti zadnje lože, eksplozivnoj snazi nogu, brzini kretanja i agilnosti sa loptom. Da je bez značajnog uticaja program treninga na performansu skokova kod kategorije pionira, utvrdili su i rezultati ranijih istraživanja (Sperlich i sar., 2011). Tabela 78. Rezultati

T-testa motoričkih sposobnosti razlike **između inicijalnog i finalnog mjerenja** kod **kontrolne** 2
grupe

pionira KG. inicial KG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Duboki pretklon u sjedjenju Upor ležeći za rukama - sklekovi podizanje trupa iz ležanja na leđima

Skok iz polučučnja bez pripreme Skok iz polučučnja sa pripremom 5

Maksimalni skok sa pripremom Sprint 5m Sprint 10m Sprint 30m

rezultate T-testa motoričkih sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerenja ispitanika 2
eksperimentalne grupe

pionira. eksperimentalne grupe pionira KG. inicial KG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Duboki pretklon u sjedjenju Upor ležeći za rukama - sklekovi podizanje trupa iz ležanja na leđima

Skok iz polučučnja bez pripreme Skok iz polučučnja sa pripremom 5

Maksimalni skok sa pripremom Sprint 5m Sprint 10m Sprint 30m

Ajaksov test 5 x 10m Cik-Cak trčanje bez lopte 11

Cik-Cak trčanje sa loptom Jačina mišića fleksora u koljenu Jačina mišića ekstenzora u koljenu $-1,41 \pm 8,28$ $19,91 \pm 7,71$ $30,50 \pm 14,59$ $30,00 \pm 4,66$ $35,18 \pm 5,62$ $39,65 \pm 4,51$ $1,22 \pm 1,12$ $2,12 \pm 1,15$ $4,91 \pm 3,39$ $13,71 \pm 4,46$ $6,89 \pm 3,36$ $8,47 \pm 5,55$ $72,61 \pm 16,40$ $53,02 \pm 15,05$ $1,66 \pm 7,25$ $25,16 \pm 9,36$ $53,08 \pm 16,80$ $32,64 \pm 4,71$ $36,51 \pm 5,80$ $39,93 \pm 6,44$ $1,20 \pm 1,15$ $2,04 \pm 1,15$ $4,90 \pm 3,31$ $13,33 \pm 6,16$ $6,66 \pm 4,38$ $8,35 \pm 7,77$ $105,38 \pm 31,65$ $60,07 \pm 11,05$ 11 9 -0,911 -1,377 -3,306 -1,613 -0,728 -0,126 -0,233 -1,159 0,059 2,159 1,498 0,669 -4,637 -1,474 0,382 0,196 0,007 0,135 0,482 0,902 0,820 0,271 0,954 0,054 0,162 0,517 0,001 0,174
 Nakon analize, dobijeni rezultati potvrđuju da ne postoje statistički značajne razlike u varijablama motoričkih sposobnosti, osim kod varijable koja karakteriše repetitivnu snagu (podizanje trupa iz ležanja na leđima) i izokinetičku snagu (jačina mišića fleksora u koljenu). Kod varijabli - brzine kretanja, agilnosti i eksplozivne snage, nijesu utvrđene statistički značajne razlike kod eksperimentalne grupe između inicijalnog i finalnog mjerenja (Sermahaj, 2017d). Iz ovoga proističe da je za poboljšanje brzine kod mladih igrača potrebna primjena dodatnih vježbi snage u dugom trajanju, a eksperimentalna istraživanja došli su do saznanja da je period od 14-16 godina pogodan za razvoj snage (Sander i sar., 2013; Sperlich i sar., 2011). Dodatni trening snage u trajanju od dvije godine kod igrača pionira iz profesionalnih klubova iz Njemačke, uticao je na poboljšanje sprinta na 5m, 10m i 30m (Sander i sar., 2013).

Trening snage igračima donosi mnogo **prednosti**, ali **može se negativno** reflektovati **na** 3
zdravlje i sposobnost **igrača ako je loše osmišljen, npr. igrači koji treningom mišićne snage dobiju**
preveliku mišićnu masu, mogu izgubiti specifične fudbalske **kvalitete - tehničke vještine.**

(Bompa, 1999). U tabeli 83, gdje su rezultati diskriminativne analize, pokazuje se

da ne postoje statistički značajne razlike (sig.=,063) **u** motoričkim **varijablama između** 10
inicijalnog i finalnog mjerenja **kod** eksperimentalne **grupe**

pionira. Dobijeni rezultati potvrđuju da program treninga (redovni i eksperimentalni) nije uticao na kvalitativne promjene u motoričkim sposobnostima kod eksperimentalne grupe pionira. Tabela 83. Diskriminativna analiza motoričkih sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja

kod eksperimentalne grupe pionira Func **Eigenvalue Canonical** R **Wilks' Lambda Chi-square.** 9
df Sig. 1

4,015 ,895 ,199 24,187 14 ,063 Na osnovu dobijenih rezultata T-testa i diskriminativne analize može se potvrditi da je program treninga djelimično uticao na kvantitativne promjene, ali bez kvalitativnih promjena na motoričke sposobnosti kod eksperimentalne grupe pionira. Tako da može se odbaciti i smatrati da je delimično nepotvrđenom hipotezu H82 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije pionira,

između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe. Može se reći **da je program** 53

treninga dao nedovoljno dobre rezultate u poboljšanju nivoa motoričkih sposobnosti kod ispitanika kategorije pionira. Nedovoljna poboljšanja motoričkih sposobnosti mogu biti posljedica nesrazmjernih promjena između longitudinalne dimenzije i tjelesne mase u ovom uzrastu. Takođe, ova minimalna nadogradnja motoričkih sposobnosti za pionirsku starosnu grupu je posljedica naprednog i kontinuiranog razvoja tokom prethodne 2-3 godine obuke. Poboljšanje motoričkih sposobnosti zahtijeva napredne ili dopunske programe koji se primjenjuju 4-8 godina, u smislu da se na kontinuiran način postižu male pozitivne promjene, ali ta mala promjena ima veliki značaj u efikasnosti igre. 6.3.2.3. Analiza razlika

između inicijalnog i finalnog mjerenja u motoričkim sposobnostima, posebno **kod** kontrolne i 16
eksperimentalne grupe

kadeta Iz tabele 84, analizom dobijenih rezultata (T-testa), proizilazi da postoje statistički značajne razlike kod ispitanika kadeta kontrolne grupe između inicijalnog i finalnog mjerenja u motoričkim sposobnostima. Pozitivne promjene pojavile su se kod varijabli: duboki pretklon u sjedjenju, podizanje trupa iz ležanja na leđima,

skok iz polučučnja bez pripreme, skok iz polučučnja sa pripremom, 5

maksimalni skok sa pripremom i jačina mišića fleksora u koljenu. Kod ostalih varijabli nijesu utvrđene statistički značajne razlike. Uticaj pripremnog perioda na pozitivne promjene u repetitivnoj snazi i gipkosti igrača kadeta, potvrđen

je i u prethodnim istraživanjima (Gardašević i Bjelica 2013; Gardašević i sar., 2016b) i u sposobnosti skokova (Hammami i sar., 2013). Tabela 84. Rezultati

T-testa motoričkih sposobnosti razlike **između inicijalnog i finalnog mjerenja** kod **kontrolne grupe** 2

kadeta KG. inicial KG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Duboki pretklon u sjedjenju Upor ležeći za rukama - sklekovi podizanje trupa iz ležanja na leđima

Skok iz polučučnja bez pripreme Skok iz polučučnja sa pripremom 5

Maksimalni skok sa pripremom Sprint 5m Sprint 10m Sprint 30m

Ajaksov test 5 x 10m Cik-Cak trčanje bez lopte 11

Cik-Cak trčanje sa loptom Jačina mišića fleksora u koljenu Jačina mišića ekstenzora u koljenu -3,25±5,47 29,58±10,84 36,50±16,11 31,46±4,88 34,90±3,60 38,30±3,77 1,21±,09 1,92±,09 4,75±,28 13,20±,54 6,47±,39 7,99±,62 76,66±28,82 109,30±30,18 -0,41±3,55 29,00±10,41 51,33±25,23 35,57±3,44 37,74±3,57 43,34±5,07 1,18±,10 1,92±,08 4,66±,21 12,87±,35 6,23±,29 7,73±,52 115,41±29,92 120,27±30,33 11 -2,529 ,222 -2,932 -3,087 -3,498 -2,637 -,730 -,288 -,887 2,002 2,150 1,720 -4,617 1,195 ,028 ,829 ,014 ,010 ,005 ,023 ,481 ,779 ,394 ,071 ,055 ,113 ,001 ,257 U tabeli 85 vidimo da rezultati diskriminativne analize (sig.=,198) pokazuju

da ne postoje statistički značajne razlike u motoričkim **varijablama između inicijalnog i finalnog** 10 mjerenja, **kod kontrolne grupe**

kadeta. Dobijeni rezultati potvrđuju da redovni program rada nije uticao na kvalitativne promjene u motoričkim sposobnostima, kod kontrolne grupe kadeta. Tabela 85. Diskriminativna analiza motoričkih sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe kadeta Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 2,362 ,838 ,297 18,18 14 ,198

Nakon analize dobijenih rezultata (T-testa i diskriminativne analize) **može se konstatovati da** 1

je sadržaj redovnog programa djelimično proizveo kvantitativne promjene u motoričkim sposobnostima kontrolne grupe kadeta, ali bez kvalitativnih promjena. Tako da može se zaključiti da se djelimično odbacuje i smatra nepotvrđenom

hipotezu H83 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije kadeta, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe. Tabela 86. Rezultati

T-testa motoričkih sposobnosti razlike **između inicijalnog i finalnog mjerenja** kod 2
eksperimentalne grupe

kadeta KG. inicial KG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Duboki pretklon u sjedjenju Upor ležeći za rukama - sklekovi podizanje trupa iz ležanja na leđima

Skok iz polučučnja bez pripreme Skok iz polučučnja sa pripremom 5

Maksimalni skok sa pripremom Sprint 5m Sprint 10m Sprint 30m

Ajaksov test 5 x 10m Cik-Cak trčanje bez lopte 11

Cik-Cak trčanje sa loptom Jačina mišića fleksora u koljenu Jačina mišića ekstenzora u koljenu 1,58±7,94 28,41±10,34 31,91±19,13 33,06±3,95 35,23±4,55 38,95±4,94 1,23±,12 1,95±,16 4,58±,17 12,84±,70 6,50±,40 7,97±,41 82,80±20,19 99,97±20,29 6,25±7,65 33,08±10,96 73,91±30,57 35,95±2,83 36,91±4,28 41,51±4,07 1,14±,09 1,88±,07 4,55±,16 12,57±,64 6,16±,33 7,73±,48 130,98±29,84 126,48±26,91 11 -4,841 2,345 -5,392 -3,284 -1,766 -1,790 -2,358 -2,212 -1,551 1,645 2,893 1,396 -6,901 5,218 ,001 ,039 ,000 ,007 ,105 ,101 ,038 ,049 ,149 ,128 ,015 ,190 ,000 ,000 U tabeli 86,

analizom dobijenih rezultata (T- testa), ukazuje se da postoje statistički značajne razlike 1

kod ispitanika kadeta eksperimentalne grupe između inicijalnog i finalnog mjerenja motoričkih varijabli. Razlike su uočene u dubokom pretklonu u sjedjenju, upor ležećem za rukama - sklekovi podizanje trupa iz ležanja na leđima, skoku iz polučučnja bez pripreme, sprintu 5m i 10m, cik-cak trčanju bez lopte, jačini mišića fleksora i ekstenzora u koljenu. Kod ostalih varijabli nijesu utvrđene statistički značajne razlike. Uticaj programa treninga na pozitivne promjene izokinetičke snage fleksora i ekstenzora u koljenu, primijenjenog tokom sezone, utvrđen je i kod prethodnih istraživanja (Gioftsidou i sar., 2008; Brito i sar., 2010; Lehnert i sar., 2014). Dodatni trening snage u trajanju od dvije godine kod igrača kadeta iz profesionalnih klubova iz Njemačke, uticao je na poboljšanje sprinta na 5m,10m i 30m (Sander i sar., 2013), takođe potvrđeno je

da je trenažni program rada u pripremnom periodu doveo do pozitivnih 14

promjena na brzini kretanja (Gardašević i sar., 2016b) i na agilnost (Milanović i sar., 2013). Za dobijene pozitivne promjene kod motoričke sposobnosti u vidu repetitivne, izokinetičke snage i eksplozivnih kretanja, razlozi su sadržaj programa treninga, kao i povećanje mišićne mase u tom uzrastu. Tabela 87. Diskriminativna analiza motoričkih sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja

kod eksperimentalne grupe kadeta Func **Eigenvalue Canonical** R **Wilks' Lambda Chi-square.** 9
df Sig. 1

8,040 ,943 ,111 33,02 14 ,003 U tabeli 87 vidimo da rezultati diskriminativne analize (sig.=,003) pokazuju

da postoje statistički značajne razlike u motoričkim varijablama **između inicijalnog i finalnog** 1
mjerenja kod eksperimentalne grupe

kadeta. Dobijeni rezultati potvrđuju da je program treninga (redovni i eksperimentalni) uticao na kvalitativne promjene u motoričkim sposobnostima kod kontrolne grupe kadeta. Tabela 88. Diskriminativne funkcije motoričkih sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe kadeta. Varijable Function 1 Jačina mišića fleksora u koljenu ,348 Podizanje trupa iz ležanja na leđima ,303 Jačina mišića ekstenzora u koljenu ,205 Cik-Cak trčanje bez lopte -,172 Skok iz polučučnja bez pripreme ,154 Sprint 5m -,139 Duboki pretklon u sjedjenju ,110 Sprint 10m -,108 Maksimalni skok sa pripremom ,104 Cik-Cak trčanje sa loptom -,099 Upor ležeći za rukama - sklekovi -,081 Sprint 30m -,074 Ajaksov test 5 x 10m -,073 Skok iz polučučnja sa pripremom ,070 Rezultati diskriminativne funkcije (tabela 88) kod eksperimentalne grupe kadeta ukazuju da se između inicijalnog i finalnog mjerenja najviše razlikuju u varijablama repetitivne snage (podizanje trupa iz ležanja na leđima) i izokinetičke snage (jačina mišića flesora i ekstenzora). Tabela 89. Centroidi mjerenja motoričkih sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe ispitanika kategorije kadeta EG. Function 1 Inicijalno mjerenje -2.715 Finalno mjerenje 2.715

Rezultati u tabeli 89, **predstavljaju diskriminativnu funkciju centroida na osnovu svih varijabli** 2
motoričkih **sposobnosti koje iznose** -2,715 i 2,715. **Značajnost prikazanih centroida**

ukazuje da njihova udaljenost (diskriminacija) značajna između inicijalnog i finalnog mjerenja u korist

finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe kadeta. **Na osnovu dobijenih rezultata** (T-testa) 14
i

diskriminativne analize) može se konstatovati da je sadržaj programa treninga (redovni i eksperimentalni) proizveo kvantitativne i kvalitativne promjene u motoričkim sposobnostima eksperimentalne grupe kadeta. Djelimično se

odbacuje i smatra nepotvrđenom hipotezu H83 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu motoričkih sposobnosti, kod kategorije kadeta,

između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne **grupe. Nakon analize dobijenih rezultata može se** konstatovati **da**

2

je tokom pripremnog i takmičarskog perioda, sadržaj programa treninga (redovni i eksperimentalni) proizveo pozitivne promjene u motoričkim sposobnostima kod kategorije kadeta. Posebno su ispoljene razlike u gipkosti zadnje lože, repetitivnoj snazi trupa i ramenog pojasa, eksplozivnoj snazi nogu, startnoj brzini, agilnosti bez lopte i mišićnoj snazi ekstenzora i fleksora. Razlog ovog poboljšanja je i brzi razvoj mišićne mase kod ove uzrasne kategorije. Razlike nijesu statistički značajno ispoljene u eksplozivnoj snazi sa zamahom, brzini 30m, agilnosti 5x10m i agilnosti sa loptom. Ovim rezultatima može se utvrditi da je senzitivna faza bitna za razvoj specifičnih motoričkih sposobnosti igrača fudbalera u ovoj uzrasnoj kategoriji. 6.3.3. Analiza razlike između inicijalne i finalne mjerenje u funkcionalnim sposobnostima, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe Informacije o funkcionalnim sposobnostima kao što su vrijednosti - forsirani vitalni kapacitet, forsirani ekspiratorni volumen, maksimalna potrošnja kiseonika i relativna potrošnja kiseonika su relevantni indikatori za procjenu funkcionalnih sposobnosti mladih fudbalera. 6.3.3.1. Analiza razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja u funkcionalnim sposobnostima, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe početnika Iz tabele 90,

analizom dobijenih rezultata (T- testa), može se zaključiti da postoje statistički značajne razlike

1

kod ispitanika početnika kontrolne grupe između inicijalnog i finalnog mjerenja funkcionalnih sposobnosti u varijablama: forsirani vitalni kapacitet (FVC), forsirani ekspiratorni volumen (FVE1), maksimalna i relativna potrošnja kiseonika (VO2maxap/re) (Sermahaj, 2019). Tabela 90. Rezultati

T-testa funkcionalne **sposobnosti** - razlike **između inicijalnog i finalnog mjerenja** kod **kontrolne grupe**

2

početnika EG. inicial EG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvooj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika 2,67±,73 2,23±,39 2,69±,31 65,91±11,93 3,38±,60 9 2,97±,60 9 2,97±,20 9 71,23±12,42 9 -2,436 -3,535 2,463 2,187 ,038 ,006 ,036 ,047 Dobijeni rezultati tabele 90 potvrđuju da je sadržaj program treninga proizveo pozitivne promjene kod svih varijabli funkcionalnih sposobnosti. Povećana aerobna izdržljivost kod fudbalera poboljšava kvalitet fudbalske igre povećavajući pretrčanu udaljenost, te broj sprinteva i broj dodira s loptom za vrijeme utakmice (McMillan i sar., 2005). Može se reći da je sadržaj programa treninga tokom pripremnog i takmičarskog perioda (od četiri mjeseca) dao dobre rezultate u poboljšanju nivoa funkcionalnih sposobnosti kod ispitanika kontrolne grupe početnika. Tabela 91. Diskriminativna analiza funkcionalne sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe početnika Func Eigenvalue

Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,883 ,685 ,531 10,12 4 ,038 U tabeli 91 uočeno je da rezultati diskriminativne analize (sig.=,038) pokazuju da

postoje statistički značajne razlike u funkcionalnim **varijablama između inicijalnog i finalnog** mjerjenja **kod kontrolne grupe**

10

početnika. Analizom tabele 92 vidimo da prikazani rezultati pokazuju da je najveća statistički značajna promjena u prostoru istraživanih funkcionalnih sposobnosti uočena u varijablama; forsirani vitalni kapacitet i forsirani ekspiracijski volumen u prvoj sekundi. Tabela 92. Diskriminativne funkcije funkcionalnih sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerjenja kod kontrolne grupe početnika Varijable Function 1 Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika ,902 ,899 -,172 -,128

Rezultati u tabeli 93 predstavljaju diskriminativnu funkciju centroida na osnovu svih varijabli funkcionalnih **sposobnosti koje iznose** -,891 i,

2

891. Rezultati funkcije diskriminacija ukazuju da je njihova udaljenost značajna kod kontrolne grupe ispitanika početnika, između inicijalnog i finalnog mjerjenja, u korist finalnog mjerjenja. Tabela 93. Centroidi mjerjenja funkcionalne sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerjenja kod kontrolne grupe početnika EG. Inicijalno mjerjenje Finalno mjerjenje Function 1 -,891 ,891

Nakon analize dobijenih rezultata (T-testa i diskriminativne analize) **može se konstatovati da**

1

je sadržaj redovnog program proizveo kvantitativne i kvalitativne promjene u funkcionalnim sposobnostima, kontrolne grupe početnika. Tako da se može zaključiti da nije potvrđena hipoteza H91 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije početnika, između inicijalnog i finalnog mjerjenja kod kontrolne grupe. Tabela 94. Rezultati T-testa funkcionalne sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerjenja kod eksperimentalne grupe početnika EG. inicial EG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika 2,14±,36 2,08±,34 2,77±,28 72,33±9,34 3,05±,71 9 2,76±,48 9 2,86±,24 9 74,42±8,98 9 -3,834 -3,517 1,457 1,640 ,004 ,007 ,179 ,135 Nakon analize dobijenih rezultata T-testa (tabela 94) može se utvrditi da je program treninga (redovni i eksperimentalni) proizveo pozitivne promjene u funkcionalnim sposobnostima (forsirani vitalni kapacitet pluća i forsirani ekspiracijski volumen u prvoj sekundi) kod eksperimentalne grupe početnika. Uticaj dugotrajnog fudbalskog programa treninga na funkcionalne sposobnosti (forsirani vitalni kapacitet pluća) kod ispitanika početnika je potvrđen i u prethodnim istraživanjima (Lolić i sar., 2012). U tabeli 95 uočeno je da rezultati diskriminativne analize (sig.=,059) pokazuju

da ne postoje statistički značajne razlike u funkcionalnim varijablama između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe

10

početnika. Dobijeni rezultati potvrđuju da redovni program rada nije uticao na kvalitativne promjene u funkcionalnim sposobnostima kod eksperimentalne grupe početnika. Tabela 95. Diskriminativna analiza funkcionalne sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja

kod eksperimentalne grupe početnika Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1

9

,766 ,659 ,566 9,09 4 ,059 Na osnovu dobijenih rezultata (T-testa i diskriminativne analize) može se konstatovati da je sadržaj programa treninga (redovni i eksperimentalni) proizveo kvantitativne promjene u funkcionalnim sposobnostima eksperimentalne grupe početnika, ali bez značajne kvalitativne promjene. Nepotvrđena je hipoteza H91 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije početnika, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe. 6.3.3.2. Analiza razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja u funkcionalnim sposobnostima, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe pionira Nakon analize rezultata T-testa (tabela 96) ukazuje se da postoje statistički značajne razlike kod ispitanika pionira kontrolne grupe, između inicijalnog i finalnog mjerenja funkcionalnih sposobnosti, u varijablama - maksimalna potrošnja kiseonika (VO_{2maxap}) i relativna potrošnja kiseonika (VO_{2maxre}), a kod ostale dvije varijable nijesu utvrđene statistički značajne razlike. Dobijeni rezultati pokazuju da su redovni program treninga i faktor rasta i razvoja proizveli pozitivne promjene u funkcionalnim sposobnostima, maksimalnoj i relativnoj potrošnji kiseonika. Status biološke zrelosti i fudbalski trening imaju značajan doprinos za funkcionalne sposobnosti (aerobni kapacitet) fudbalera adolescenata, od 13 do 15 godina, potvrđeno je i kod prethodnih istraživanja (Malina, i sar., 2004). Tabela 96. Rezultati

T-testa funkcionalne sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe

2

pionira EG. inicial EG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika 4,31±78 3,82±,74 2,99±,26 56,66±9,01 4,68±,77 4,06±,61 3,33±,23 63,79±8,66 11 11 11 11 -1,689 -1,304 3,097 2,969 ,120 ,218 ,010 ,013 Takođe je potvrđeno da su u vrijeme puberteta (kod kategorije pionira) maksimalna i relativna potrošnja kiseonika među važnim parametrima za određivanje uspjeha fudbalera, jednostavno, potvrđeno je da su selektovani igrači, u odnosu na neselektovane igrače starosti od 14 godina, imali višu apsolutnu i relativnu maksimalnu potrošnju kiseonika (Gil i sar., 2007). Rezultati diskriminativne analize (tabela 97), u prostoru funkcionalnih varijabli kod kontrolne grupe pionira pokazuju da je došlo do

statistički značajne razlike (sig.=,017) **između inicijalnog i finalnog mjerenja.** Dobijeni rezultati potvrđuju **da je** redovni **program**

15

rada uticao na kvalitativne promjene u funkcionalnim sposobnostima kod kontrolne grupe pionira. Tabela 97.

Diskriminativna analiza funkcionalne sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe pionira Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,829 ,673 ,547 12,075 4 ,017 U tabeli 98 prikazani rezultati diskriminativne funkcije potvrđuju da je najveća statistički značajna promjena u prostoru istraživanih funkcionalnih sposobnosti uočena u varijabli maksimalna i relativna potrošnja kiseonika (VO2max). Tabela 98.

Diskriminativne funkcije funkcionalnih sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe pionira Varijable Function 1 Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika ,788 ,462 -,267 -,189

Rezultati u tabeli 99 predstavljaju diskriminativnu funkciju centroida na osnovu svih varijabli funkcionalnih sposobnosti koje iznose -,872 **i,**

2

872. Dobijeni rezultati ukazuju da njihova udaljenost je značajna kod kontrolne grupe ispitanika početnika između inicijalnog i finalnog mjerenja u korist finalnog mjerenja. Tabela 99. Centroidi mjerenja funkcionalne sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe pionira KG. Function 1 Inicijalno mjerenje -,872 Finalno mjerenje ,872

Nakon analize dobijenih rezultata (T-testa i diskriminativne analize) može se konstatovati da

1

je sadržaj redovnog program proizveo kvantitativne i kvalitativne promjene u funkcionalnim sposobnostima kontrolne grupe pionira. Zaljučuje se da smatramo nepotvrđenom hipotezu H92 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije pionira, između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe. Iz tabele 100,

analizom dobijenih rezultata (T- testa), može se zaključiti da postoje statistički značajne razlike

1

kod ispitanika pionira eksperimentalne grupe, između inicijalnog i finalnog mjerenja funkcionalnih sposobnosti u varijablama - maksimalne **i**

1

relativne potrošnja kiseonika. Kod ostale dvije varijable nijesu utvrđene statistički značajne razlike. Dobijeni rezultati pokazuju da je pripremni i takmičarski program treninga proizveo pozitivne promjene funkcionalnih sposobnostima kod

kategorije pionira u varijablama - maksimalna i relativna potrošnja kiseonika. Tabela 100. Rezultati T-testa funkcionalne sposobnosti

razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod ispitanika eksperimentalne grupe

1

pionira EG. inicial EG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika 4,01±,97 3,60±,68 3,07±,22 55,74±6,63 4,76±,91 3,61±,65 3,37±,33 65,84±7,44 11 11 11 11 -2,174 -,015 3,897 6,169 ,052 ,987 ,002 ,000 Statističke značajne razlike nijesu ispoljene kod varijabli - forsirani vitalni kapacitet i forsirani ekspiracijski volumen u prvoj sekundi. Prethodna istraživanja (Sperlich i sar., 2011) utvrdila su, takođe, da je maksimalna potrošnja kiseonika značajno povećana (7%) nakon 5 sedmica intenzivnog treninga sa fudbalerima starosti od 13 - 15 godina. Slična prethodna istraživanja (Raičković, 2007) potvrdila su

uticaj trenažnog rada u pretdakmičarskom periodu na razvoj funkcionalnih sposobnosti kod mladih fudbalera. U

54

tabeli 101, rezultati diskriminativne analize (sig.=,000) jasno pokazuju

da postoje statistički značajne razlike u funkcionalnim varijablama između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe

1

pionira. Tabela 101. Diskriminativna analiza funkcionalne sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja

kod eksperimentalne grupe pionira Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1

9

1,994 ,816 ,334 21,935 4 ,000 U tabeli 102, rezultati diskriminativne funkcije ukazuju da je najveća statistički značajna promjena u prostoru istraživanih funkcionalnih sposobnosti uočena u varijablama - relativna i maksimalna potrošnja kiseonika (VO2max). Tabela 102. Diskriminativne funkcije funkcionalne sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe pionira Varijable Function 1 Forsirani vitalni kapacitet ,530 Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika ,391 -,293 -,002

Rezultati u tabeli 103 predstavljaju diskriminativnu funkciju centroida na osnovu svih varijabli funkcionalnih sposobnosti koje iznose -1,352 i

2

1,352. Dobijeni rezultati ukazuju da njihova udaljenost je značajna kod eksperimentalne grupe ispitanika pionira, između inicijalnog i finalnog mjerenja, u korist finalnog mjerenja. Tabela 103. Centroidi mjerenja funkcionalne sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe pionira EG. Function 1 Inicijalno mjerenje -1,352 Finalno mjerenje 1,352

Nakon analize dobijenih rezultata (T-testa i diskriminativne analize) može se konstatovati da

1

je sadržaj programa treninga (redovni i eksperimentalni) proizveo kvalitativne i djelimično kvantitavne promjene funkcionalnih sposobnosti eksperimentalne grupe pionira. Skoro u potpunosti se odbacuje i smatra nepotvrđenom hipotezu H92 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije pionira, između inicijalnog i finalnog mjerenja, kod eksperimentalne grupe. 6.3.3.3.

Analiza razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja funkcionalnih sposobnosti, posebno kod kontrolne i eksperimentalne grupe kadeta U

1

tabeli 104,

analizom dobijenih rezultata (T-testa), ukazuje se da postoje statistički značajne razlike

1

kod ispitanika kadeta kontrolne grupe između inicijalnog i finalnog mjerenja funkcionalnih sposobnosti u varijablama - forsirani ekspiratorni volumen i relativna potrošnja kiseonika. Kod ostale dvije varijable; forsirani vitalni kapacitet i maksimalna potrošnja kiseonika, nijesu utvrđene statistički značajne razlike. Tabela 104. Rezultati

T-testa funkcionalne sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe

2

kadeta EG. inicial EG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika 5,37±1,00 4,13±,63 3,37±,27 56,19±6,02 6,21±1,37 5,61±1,32 3,43±,26 58,91±5,37 11 11 11 11 -2,119 -4,137 -1,508 -4,428 ,058 ,002 ,160 ,001 Dobijeni rezultati (tabela 104), potvrđuju da je redovni program treninga pozitivno uticao na promjene u funkcionalnim sposobnostima kod kategorije kadeta, posebno u varijablama; forsirani ekspiracijski volumen u prvoj sekundi i relativna potrošnja kiseonika. Prethodna istraživanja, takođe, potvrđuju da specifični trening (Šamija, 2011) i situacijski kompleksni trening (Sporiš, 2007) dovode do značajnih promjena u funkcionalnim sposobnostima kod mladih fudbalera. Tabela 105. Diskriminativna analiza funkcionalne sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe kadeta Func

Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,988 ,705 ,503 13,

61

74 4 ,008 Rezultati diskriminativne analize (tabela 105) u prostoru funkcionalne sposobnosti kod kontrolne grupe kadeta,

pokazuju da postoje statistički značajne razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja

49

(sig.=,008). Dobijeni rezultati potvrđuju da je redovni program treninga uticao na kvalitativne promjene funkcionalnih sposobnosti kod kontrolne grupe kadeta, između inicijalnog i finalnog mjerenja. Tabela 106. Diskriminativne funkcije funkcionalne sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe kadeta Varijable Function 1 Forsirani vitalni kapacitet ,745 Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika ,364 ,251 ,115 U tabeli 106 rezultati diskriminativne funkcije ukazuju da je najveća statistički značajna promjena u prostoru istraživanih funkcionalnih sposobnosti uočena u varijablama; forsirani ekspiratorni volumen i forsirani vitalni kapacitet. Tabela 107. Centroidi mjerenja funkcionalne sposobnosti između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe kadeta KG. Inicijalno mjerenje Finalno mjerenje Function 1 -,952 ,952 U tabeli 107 rezultati

predstavljaju diskriminativnu funkciju centroida na osnovu svih varijabli funkcionalnih sposobnosti koje iznose - ,952 i,

2

952. Dobijeni rezultati ukazuju da njihova udaljenost je značajna kod kontrolne grupe ispitanika kadeta,

između inicijalnog i finalnog mjerenja, **u** korist finalnog mjerenja. **Na osnovu** dobijenih **rezultata (T-testa i**

27

diskriminativne analize) može se konstatovati da je sadržaj redovnog programa treninga proizveo kvalitativne promjene i djelimično kvantitativne promjene u funkcionalnim sposobnostima kontrolne grupe kadeta. Tako da može se zaključiti da skoro u potpunosti se odbacuje i smatra nepotvrđenom hipotezu H93 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije kadeta, između inicijalnog i finalnog mjerenja, kod kontrolne grupe. Tabela 108. Rezultati T-testa funkcionalne sposobnosti razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe kadeta EG. inicial EG. final Varijable (Mean± SD) (Mean± SD) df t p Forsirani vitalni kapacitet Forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi Maksimalna potrošnja kiseonika Relativna potrošnja kiseonika 5,40±1,08 4,50±,87 3,54±,41 57,19±8,75 6,38±1,50 5,51±1,31 3,65±,36 61,37±8,96 11 11 11 11 -2,234 -2,497 -2,162 -2,721 ,047 ,030 ,054 ,020 U tabeli 108, u kojoj su prikazani rezultati (T-testa), ukazuje se

da postoje statistički značajne razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe

1

kadeta u varijablama funkcionalnih sposobnosti - forsirani vitalni kapacitet, forsirani ekspiratorni volumen i relativna potrošnja kiseonika. Statističke značajne razlike nijesu uočene samo kod varijable, maksimalna potrošnja kiseonika.

Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da je program treninga

28

(redovni i eksperimentalni) proizveo pozitivne promjene u varijablama - forsirani vitalni kapacitet, forsirani ekspiracijski volumen u prvoj sekundi i relativna potrošnja kiseonika. Slični rezultati dobijeni su i kod prethodnih istraživanja (McMillan i sar., 2005; Malgorzata i sar., 2018). Tabela 109. Diskriminativna analiza funkcionalne sposobnosti -

razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe ispitanika

9

kategorije kadeta Func Eigenvalue Canonical R Wilks' Lambda Chi-square. df Sig. 1 ,305 ,483 ,766 5,323 4 ,256 U tabeli 109, rezultati diskriminativne analize (sig.=,256) pokazuju

da ne postoje statistički značajne razlike u funkcionalnim varijablama između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe

10

kadeta.

Nakon analize dobijenih rezultata (T-testa i diskriminativne analize) može se konstatovati da

1

je sadržaj programa treninga (redovni i eksperimentalni) proizveo kvantitativne promjene u funkcionalnim sposobnostima eksperimentalne grupe kadeta, ali bez značajnih kvalitativnih promjena. Tako da se može zaključiti da skoro u potpunosti smatramo nepotvrđenom hipotezu H63 koja glasi: ne postoje statistički značajne promjene rezultata kod testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti, kod kategorije kadeta,

između inicijalnog i finalnog mjerenja, kod eksperimentalne grupe. Nakon analize dobijenih rezultata može se konstatovati da

2

je dugotrajni program treninga fudbala sa mlađim kategorijama, imao pozitivan uticaj na funkcionalne sposobnosti. Dobijeni rezultati potvrdili su tezu o važnosti pozitivnog uticaja programa treninga na morfološke, motoričke i funkcionalne sposobnosti mladih igrača. Program treninga tokom pripremnog i takmičarskog perioda, pozitivno je uticao na promjene morfoloških karakteristika, motoričke i funkcionalne sposobnosti i uspjeh odabranih fudbalskih igrača kategorije početnika, pionira i kadeta. U tom starosnom dobu, utvrđeno je da se najviše može postići pozitivnih promjena, a rezultat tih promjena predstavlja interakciju djelovanja programa treninga uz faktor faze rasta i razvoja mladih fudbalera. Dopunski trening prema zahtjevima modernog fudbala (posebno za sposobnosti brzine i eksplozivnosti) preporuka je da se sprovedi, ako je moguće, u homogenim grupama ili kroz individualni trening. Takav pristup kondicijskog treninga iziskuje daleko veći trud nego tradicionalni trening, jer zahtijeva postavljanje parcijalnih (individualnih) ciljeva za poboljšanje (morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih) sposobnosti igrača, s obzirom na individualne specifičnosti igre, uzorka, starosti i drugo.

7. ZAKLJUČAK

Kako u svakoj doktorskoj disertaciji zaključak privlači posebnu pažnju iz razloga što u njoj potencijalni čitaoci disertacije imaju priliku da ukratko saznaju šta je to dobijeno u sprovedenom istraživanju, odnosno koji je originalni doprinos disertacije i njegova primjena u praksi, ali i ograničenja studije i preporuke za dalja istraživanja, jako je važno biti precizan i odmjeren u donošenju zaključaka, budući da u značajnoj mjeri par narednih pasusa mogu uticati na predmetnu praksu. Prije svega, vrijedno je istaći, da je u ovoj disertaciji utvrđeno da eksperimentalni program (vježbi statičkog istezanja) primijenjen na kraju treninga tokom pripremnog i takmičarskog perioda, nije uticao na morfološke karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti ispitanika kategorije početnika, pionira i kadeta, u onoj mjeri u kojoj su to neka prethodna istraživanja predviđala, posebno na istraživanjima koja su sprovedena kod seniorskih kategorija, a koja se iscrpno opisana u prethodnim djelovima disertacije, no, rezultati su, ipak potvrdili značajan uticaj varijable gipkosti "duboki pretklon u sjedjenju" u korist eksperimentalne grupe kategorije kadeta.

Na osnovu dobijenih rezultata, može se konstatovati da je do pozitivne promjene gipkosti u 26

eksperimentalnoj grupi kod kategorije kadeta došlo zbog uticaja eksperimentalnog programa (vježbi statičkog istezanja), ali je potvrđeno i da su se te vježbe pokazale beznačajne za uzrasne kategorije početnika i pionira, što nas navodi da postoje značajne razlike kada su uzrasne kategorije u pitanju. Stoga, može se zaključiti da vježbe statičkog istezanja koje se izvode nakon treninga (u fazi oporavka) imaju značajan uticaj na poboljšanje gipkosti ispitanika starijih od 15 godina, i bez pozitivnog ili negativnog uticaja na druge varijable morfoloških karakteristika, motoričke i funkcionalne sposobnosti početnika, pionira i kadeta, što predstavlja odlično praktično saznanje koje nam ukazuje na činjenicu da se naučni dokazi koji se dobijaju kod seniora ne smiju primjenjivati na mlađe kategorije, posebno one mlađe od 15 godina, već istraživanja moraju biti posebno sprovedena za te kategorija, kako se ne bi uzaludno sprovodili određeni trenažni tretmani, ili u nekim slučajevima i napravila šteta. Na osnovu zaključaka iz prethodnog pasusa, odnosno na osnovu podataka dobijenih u ovom istraživanju, preporuka je da se sa primjenom vježbi statičkog istezanja nakon treninga (u fazi oporavka) počne nakon 15 godina starosti (nakon puberteta) i to 2-3 puta sedmično radi daljeg optimalnog razvoja gipkosti igrača. Sa druge strane, za uzrasne kategorije mlađe od 15 godina, dovoljno je primijeniti kombinovane vježbe istezanja (dinamičke i statičke) na početku treninga i samo prema potrebama pojedinaca programirati posebne - dopunske sesije (prije ili poslije redovnog treninga) sa ciljem razvoja optimalne gipkosti za mlade igrača. U ovoj disertaciji, takođe, utvrđeno je da je redovni program rada tokom pripremnog i takmičarskog perioda,

uticao na pozitivne promjene u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima igrača kategorije početnika, pionira i kadeta, što je očekivano, budući da je program načinjen u skladu sa najvišim svjetskim standardima iz oblasti sportskih nauka. Kod ispitanika iz kategorije početnika, nakon primjene redovnog programa treninga, potvrđene su pozitivne promjene u morfološkim karakteristikama (smanjenje mase masnog tkiva i povećanje mišićne mase), u motoričkim sposobnostima (gipkost, brzina i agilnost) i u funkcionalnim sposobnostima (vitalni kapacitet pluća i aerobni kapacitet). Iz navedenih pozitivnih promjena se može zaključiti da je doba od 11 do 13 godina senzitivnije za brži razvoj motoričkih sposobnosti (posebno brzine i agilnosti) i funkcionalnih sposobnosti mladih fudbalera. Značajne pozitivne promjene potvrđene su i kod kategorije pionira, ali mnogo manje od onih koje su utvrđene kod početnika. U morfološkim karakteristikama uočene su male pozitivne promjene na masi tijela i masi masnog tkiva. Najviše promjene uočeno je u longitudinalnoj dimenzionalnosti skeleta, ali to je posljedica senzitivne faze rasta. Jednostavno, potvrđeno je da je program treninga dao nedovoljno dobre rezultate u nivou motoričkih sposobnosti. Pozitivne promjene utvrđene su u repetitivnoj i izokinetičkoj snazi, ali bez značajnih pozitivnih promjena na sposobnosti brzine, vertikalnog skoka, agilnosti i gipkosti. A što se tiče funkcionalnih sposobnosti, pozitivne promjene potvrđene su samo u aerobnom kapacitetu (VO₂), ali bez značajnih promjena na vitalni kapacitet pluća kod pionira. Nedovoljna poboljšanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti mogu, takođe, biti posljedica ulaska u pubertet i nesrazmjerne promjene između longitudinalne dimenzije i tjelesne mase u ovom uzrastu. Takođe, ova minimalna nadogradnja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti za pionirsku starosnu grupu je posljedica naprednog i kontinuiranog razvoja tokom prethodne 2-3 godine treninga. Uz to, rezultati ovog istraživanja potvrđuju da je redovni program rada pozitivno uticao na morfološke karakteristike kod kategorije kadeta. Utvrđeno je da je

do porasta u tjelesnoj masi došlo usljed povećanja procenta **mišićne mase**

3

i smanjenja procenta potkožnog masnog tkiva u ukupnoj vrijednosti, što je normalno kada uzmemo u obzir da kod uzrasne kategorije kadeta počinje ravnoteža između longitudinalnog dimenzionaliteta i volumena mase tijela. Sadržaj programa treninga i povećanja procenta mišićne mase je razlog dobijene pozitivne promjene i u motoričkim sposobnostima: gipkosti, brzini, agilnosti i snazi (repetitivnoj, eksplozivnoj i izokinetičkoj) kod kategorije kadeta. Ovim rezultatima možemo utvrditi da je senzitivna faza za razvoj specifičnih motoričkih sposobnosti igrača fudbalera, baš u ovoj uzrasnoj kategoriji. Potvrđeno je i da je redovni program treninga pozitivno uticao na promjene u funkcionalnim sposobnostima kod kategorije kadeta, posebno u varijablama - forsirani ekspiracijski volumen u prvoj sekundi i relativna potrošnja kiseonika. Dobijeni rezultati ovog istraživanja potvrđuju da se sa ovim uzrasnim kategorijama (početnika, pionira i kadeta) može postići najviše pozitivnih promjena, a rezultati tih promjena predstavljaju interakciju djelovanja programa treninga i faktora faze rasta i razvoja ovih uzrasnih kategorija. Rezultati ovog istraživanja bi trebalo da imaju praktičnu vrijednost za institucije koje se bave obrazovanjem fudbalskih trenera za mlađe kategorije, za racionalizaciju plana i programa rada sa jedinom svrhom - optimalni razvoj performansi igrača tokom njihovih različitih faza rasta i razvoja i periodizacija sportske forme mladih fudbalera. Ovo istraživanje pruža i teorijsku vrijednost stručnim kadrovima u oblasti sportskog treninga, a posebno fudbalskim trenerima omogućava pristup većoj količini informacija, vezano za to kada i u kojoj mjeri treba primjenjivati vježbe za razvoj gipkosti. Takođe se može reći da praktični značaj redovnog programa rada ovog istraživanja je mogućnost njegove upotrebe u trenažnoj praksi, kao i za ostvarivanje napretka u performansama svakog pojedinačnog uzrasta fudbalera. Takođe je važno da pored odbrane doktorske disertacije,

najzanimljiviji rezultati budu objavljeni u vodećim međunarodnim časopisima, kako bi bili dostupni najširim interesnim grupama, na čemu je autor ove disertacije već radio, odnosno radi. Kako svaka naučna studija ima svoja ograničenja, u ovoj studiji ono se ogleda u činjenici da je eksperimentalni tretman bio organizovan, isključivo u vidu dodatnog tretmana na kraju treninga, te nije izolovao vježbe za razvoj gipkosti u redovnom dijelu treninga koji je, možda ispoljio maksimalne kapacitete ispitanika, tako da bi dodatni dio programa mogao biti smatran, isključivo kao tretman koji se odnosio na odmor i relaksaciju tijela mladih fudbalera na kraju treninga. Stoga, bi preporuka za dalja istraživanja bila usmjerena na to da budući istraživači pokušaju da izoluju rad po programu za razvoj gipkosti kod mladih fudbalera iz redovnog trenažnog procesa, i na taj način dobijeni rezultate koji bi, isključivo oslikavali razvoj ove latentne motoričke sposobnosti, bez bilo kakvih dodataka koje bi stizale i redovnog trenažnog procesa. Međutim, jasno je da je to veoma teško sprovesti, budući da bi u tom slučaju bilo neophodno isključiti cijelu kontrolnu grupu iz redovnog trenažnog procesa. Ipak, bilo bi vrlo interesantno uporediti rezultate takvog istraživanja sa rezultatima ovog istraživanja, i tada bi bilo u potpunosti jasno u kojoj mjeri rad po programu za razvoj gipkosti utiče na predmetne sposobnosti i karakteristike mladih fudbalera, po svakoj od kategorija. Na kraju, važno je naglasiti da originalni doprinos ove disertacije koji je detaljno opisan u zaključku, a koji se ogleda u saznanjima koja do sada nisu bila dostupna, pomjera granice u nauci i izaziva pokretanje novih istraživanja, ali i daje jasne smjernice praksi na koji način da unaprijede svoj rad i svoje rezultate.

LITERATURA Akbulut, T. & Agopyan, A. (2015). Effects of an eight-week proprioceptive neuromuscular facilitation stretching program on kicking speed and range of motion in young male soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(12), 3412–23. Albrecht, K., Meier, S. & Zahner, L. (2001). *Stretching - Das Expertenhandbuch*. Heidelberg: 3. Auflage. Haug. Amiri-Khorasani, M. & Sotoodeh, V. (2013). The acute effects of combined static and dynamic stretch protocols on fitness performances in soccer players. *Journal of Sports and Medicine Physics Fitness*, 53(5), 559-565. Andersen, J.C. (2005). Stretching before and after exercise: Effect on muscle soreness und injury risk. *Journal of Athletes Training*, 40(3), 218-220. Anderson, B. (2006). *Stretching*. Zagreb: Gopal. Andrasic, S., Cvetkovic, M., Milic, Z., Ujsasi, D. & Orlic, D. (2016). Assessment and Differences in Anaerobic Capacity of Football Players Playing on Different Positions in the Team Using Rast Test. *Sport Mont*, 14(3), 21-24. Astrand, P.O. (1980). Aerobic and Anaerobic Energy Sources in Exercise. *Physiology, Chemi of Exercise and Training, Medicine and Sport*, 13, 28-29. Bale, P. & James, H. (1991). Massage, warm-down and rest as recuperative measures after short term intense exercise. *Physiotherapy In Sport*, 13:44. Bangsbo, J. (1994). The physiology of soccer. A special reference to intense intermittent exercise. *Acta Physiologica Scandavica*, 619, 1-155. Bazett-Jones, D., Gibson, M.H. & McBride, J.M. (2008). Sprint and vertical jump performances are not affected by six weeks of static hamstring stretching. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(1), 25-31. Behm, D.G. & Kibele, A. (2007). Effects of differing intensities of static stretching on jump performance. *European Journal of Applied Physiology*, 101(5), 587-594. Behm, D.G., Chaouachi, A., Lau, P.W.C. & Wong, D.P. (2011). Short durations of static stretching when combined with dynamic stretching do not impair repeated sprints and agility. *Journal of Sports Science and Medicine*, 10(2), 408-416. Bisanz, G. & Gerisch, G. (2008). *Fussball, Kondition Technik Taktik und Coachin*. Aachen: Meyer & Meyer Verlag. Bjelica, D. i Fratic, F. (2011). *Sportski trening, teorija, metodika i dijagnostika*. Podgorica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića. Bjelica, D. i Popovic, S. (2012). *Fudbal, teorija-tehnika-taktika*. Podgorica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića. Bjelica, D., Popovic, S. & Petkovic, J. (2013). Comparison of Instep Kicking Between Preferred and Non- Preferred Leg in Young Football Players. *Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine*, 2(1), 5-10. Bompa, T. (1999). *Periodozation: Theory and methodology of training*. Champaing IL: Human Kinetics. Brandey, J., Ajit, D.K., Richard, S.F. & Jennifer, L.C. (2012). Acute effects of statik and proprioceptive neuromusscular Facilitation Stretching on Agility performance in Elite

Youth Soccer Players. *International Journal Exercises Sciences*, 5(2), 97-105. Brito, J., Figueiredo, P., Fernandes, L., Seabra, A., Soares, J., Krustup, P. & Rebelo, A. (2010). Isokinetic strength effects of FIFA's "The 11+" injury prevention training programme. *Isokinetic and Exercise Science*, 18(4), 211–215. Bugarski, S., Đurić, S. i Marković, S. (2013). Promene motoričkih sposobnosti mladih fudbalera različitog uzrasta i različite pozicije u timu. *Sportkon* 4, 104-112. Bujnovky, D., Maly, T., Ford, K.R., Sugimoto, D., Kunzmann, E., Hank, M. & Zahalka, F. (2019). Physical Fitness Characteristics of High-level Youth Football Players: Influence of Playing Position. *Sports*, 7(2), 46. Chan, K., M. Mahomoodally, F. & Veeren, R (2012). Stretching in the prevention of hamstring strains: Attitudes, beliefs and current practices among football coaches in Mauritius. *Open Journal of Preventive Medicine*, 2(2), 141-148. Chamari, Y.H., Ahmed, Y.B., Galy, O., Sghaier, F., Chatard, J.C., Hue, O. & Wisloff, U. (2004). Field and laboratory testing in young elite soccer players. *British journal of sports medicine*, 38(2), 191-196. Chaouachi, A., Chamari, K., Wong, P., Castagna, C., Chaouachi, M., Moussa-Chamari, I. & Behm, D. (2008). Stretch And Sprint Training Reduces Stretch-Induced Sprint Performance Deficits In 13- To 15- Year-Old Youth. *European Journal Applied Physiology*, 104(3), 515-522. Dabedo, B., White, J. & George, K. (2004). A survey of flexibility training protocols and hamstring strains in the professional football clubs in England. *British Journal of Sports Medicine*, 38(4), 388-394. Doder, D. i Perić, D. (2007). Mišićni disbalansi fudbalera ustanovljeni izokinetičkom dijagnostikom. *Sport Mont*, 5(12-13-14), 115-120. Erceg M., (2011). Funkcionalne osobitosti fudbaleri različitih dobnih skupina, Doktorska disertacija. Split: Kineziološki fakultet Split, Sveučilište u Splitu. Erikoglu, O. & Arslan, G. (2016). The Relationships among Acceleration, Agility, Sprinting Ability, Speed Dribbling Ability and Vertical Jump Ability in 14 Year Old Soccer Players. *Journal of Sports and Physical Education*, 3(2), 29-34. Fernandez, R.A., Sanchez, J., Rodriguez Marroyo, J.A. & Villa, J.G. (2016). Effects of seven weeks of static hamstring stretching on flexibility and sprint performance in young soccer players according to their playing position. *Journal of Sport Medicine and Physical Fitness*, 56(4), 345-51. Figueiredo, A.J., Goncalves, C.E., Coelho, E., Silva, M.J. & Malina, R.M. (2009). Youth soccer players, 11- 14 years: Maturity, size, function, skill and goal orientation. *Annals of Human Biology*, 36(1), 60-73. Frederick, A.G. & Szymanski, D.J. (2001). Dynamic flexibility. *Strength and Conditioning Journal*, 23(1), 21-30. Garcia-Pinillos, F., Ruiz-Ariza, A., Moreno del Castillo, R. & Latorre-Roman, P.A. (2015). Impact of limited hamstring flexibility on vertical jump, kicking speed, sprint, and agility in young football players. *Journal of sports sciences*, 33(12), 1293-1297. Gardasevic, J. & Bjelica, D. (2013). Efekti programiranog trenažnog rada u trajanju od šest nedjelja na transformaciju gipkosti kod fudbalera kadetskog uzrasta. *Sport Mont*, 11(37,38,39), 212-217. Gardasevic, J., Bjelica, D., Vasiljevic, I. & Milasinovic, R. (2016a). The Effects of the training in the Preparation Period on the Repetitive Strength Transformation with Cadet Level Football Players. *Sport Mont*, 14(1), 31-33. Gardasevic, J., Bjelica, D. & Vasiljevic, I. (2016b). Six-Week Preparation Period and its Effects on Transformation Movement Speed with Football Players Under 16. *Sport Mont*, 14(1), 13-16. Gelen, E. (2010). Acute effects of different warm-up methods on sprint, slalom dribbling, and penalty kick performance in soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(4), 950-956. Gioftsidou, A., Ispirlidis, I., Pafis, G., Malliou, P., Bikos, C. & Godolias, G. (2008). Isokinetic strength training program for muscular imbalances in professional soccer players. *Sport Sciences for Health*, 2(3), 101–105. Glinder, K. (1984). *Konditionstraining*. Stuttgart: Fussballverband. Gil, S., Ruiz, F., Irazusta, A., Gil, J. & Irazusta, J. (2007). Selection of young soccer players in terms of anthropometric and physiological factors. *Journal of sports medicine and physical fitness*, 47(1), 25-32. Gjonbalaj, M., Georgiev, G. & Bjelica, D. (2018). Differences in Anthropometric Characteristics, Somatotype Components, and Functional Abilities Among Young Elite Kosovo Soccer Players Based on Team Position. *International Journal of Morphology*, 36(1), 41-47. Gonçalves, D.L., Pavao, T.S. & Dohnert, M.B. (2013). Acute and chronic effects of a static and dynamic stretching program in the performance of young soccer athletes. *Revista Brasileira de*

Medicina do Esporte, 19(4), 241-246 Gravina, L., Gil, S.M., Ruiz, F., Zubero, J., Gil, J. & Irazusta, J. (2008). Anthropometric and physiological differences between first team and reserve soccer players aged 10–14 years at the beginning and end of the season. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(4), 1308–1314. Grbovic, M. (2013). Merjenje agilnosti u različito definisanim uslovima, Doktorska disertacija, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beograd. Haddad, M., Dridi, A., Chtara, M., Chaouachi, A., Wong, P., Behm, D. & Chamari K. (2014). Static stretching can impair explosive performance for at least 24 hours. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(1), 140-146. Hammami, Ma., Ben Abderrahmane, A., Nebigh, A., Le Moal, E., Ben Ounis, O., Tabka, Z. & Zouhal, H. (2013). Effects of a soccer season on anthropometric characteristics and physical fitness in elite young soccer players. *Journal of Sports Sciences*, 31(6), 589-96. Helgerud, J., Engen, L.C., Wisløff, U. & Hoff, J. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. *Medicine and Science in Sport and Exercise*, 33(11), 1925-1931. Hughes, M.D. & Bartlett, R.M. (2002). The use of performance indicators in performance analysis. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 20(10), 739-754. Idrizovic, K. (2014). Physical and anthropometric profiles of elite female soccer players. *Medicina dello sport*; 67(2), 273-287. Jaksic, D. (2009). Kinantropološka analiza fudbala u cilju pravilne postavke trenažnih procesa. *Sport Experts*, 2(1), 5-11. Jamtvedt, G., Herbert, R.D., Flottorp, S., Odgaard-Jensen, J., Håvelsrud, K., Barratt, A., Mathieu, E., Burls, A. & Oxman, A.D. (2010). A pragmatic randomized trial of stretching before and after physical activity to prevent injury and soreness. *British Journal of Sports Medicine*, 44(14), 1002-9. Jankovski, T. (2015). Taktische Periodisierung im Fußball. Aachen: Meyer & Meyer Verlag, Kay, D.A. & Blazevich, A.J. (2011). Effect of Acute Static Stretch on Maximal Muscle Performance: A Systematic Review. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 44(1), 154-64. Keiner, M., Sander, A., Wirth, K. & Harmann, H. (2015). Differences in the performance tests of the fast and slow stretch and shortening cycle among professional, amateur and elite youth soccer players. *Journal of Human Sport and Exercise*, 10(2), 563-570. Kinugasa, T. & Kilding, A.E. (2009). A comparison of post-match recovery strategies in youth soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(5), 1402-07. Kyranoudis, A., Nikolaidis, V., Ispirlidis, I., Galazoulas, Ch., Alipasali, F. & Famisis, K. (2018). Acute effect of specific warm-up exercises on sprint performance after static and dynamic stretching in amateur soccer players. *Journal of Physical Education and Sport*, 18(2), 825-830. La Torre, A., Castagna, C., Gervasoni, E., Cè, E., Rampichini, S., Ferrarin, M. & Merati, G. (2010). Acute effects of static stretching on squat jump performance at different knee starting angles. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(3), 687-694. La Roche, D.P., Lussier, M. & Roy, S.J. (2008). Chronic stretching and voluntary muscle force. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(2), 589-596. Leão, C., Simões, S.B., Clemente, F.M., Bezerra, P. & Camões M. (2017). Body Composition Evaluation Issue among Young Elite Football Players. DXA Assessment. *Sports*, 5(1), 17. Lehnert M., Psotta R., Chvojka P. & Croix M. (2014). Seasonal variation in isokinetic peak torque in youth soccer players. *Kinesiology*, 46(1), 79-87. Little, T. & Williams, A.G. (2006). Effects of differential stretching protocols during warm-ups on high-speed motor capacities in professional soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 20 (1), 203-207. Lohman, T.G., Roche, A.F., & Martorell, R. (1988). Anthropometric standardization reference manual. Chicago: Human Kinetics Books. Lolic, V., Goranovic, S., Bajric, O. i Lolic, D. (2012), Uticaj eksperimentalnog programa za razvoj funkcionalnih sposobnosti kod mladih fudbalera. *Sportske nauke i zdravlje* 2(1), 29-34 Lucas, RC. & Koslow, R. (1984). Comparative study of static, dynamic, and proprioceptive neuromuscular facilitation stretching techniques on flexibility. *Perceptual and Motor Skills*, 58(2), 615-618. Malgorzata, F., Jacek, S., Tomasz, Z., Dagmara, P. & Iwona, D. (2018). Estimation of evaluation some spirometric's parameters of football players during preparation period. *Journal of Education, Health and Sport*, 8(6), 69-79. Magnusson, S.P., Aagard, P., Simonsen, E. & Bojsen-Moller, F. (1998). A biomechanical evaluation of cyclic and static stretch in human skeletal muscle. *International Journal of Sports Medicines*, 19(5), 310 -316. Malina, R.M., Eisenmann,

C.J., Cumming, S., Ribeiro, B. & Aroso, J. (2004). Maturity-associated variation in the growth and functional capacities of youth football (soccer) players 13–15 years. *European Journal of Applied Physiology*, 91(5-6), 555-562.

Marfell-Jones, M., Olds, T., Stewart, A. D., & Carter, J. E. L. (2006). International standards for anthropometric assessment. Potchesfroom, International Society for the Advancement of Kinanthropometry.

Mayorga, V.D., Merino, M.R., Garrido, F.J., & Viciano, J. (2014). Comparison between warm-up and cool-down stretching programs on hamstring extensibility gains in primary schoolchildren. *Physical Activity Review*, 2, 16-24.

McMillan, K., Helgerud, J., Macdonald, R. & Hoff, J. (2005). Physiological adaptations to soccer specific endurance training in professional youth soccer players. *British Journal of Sports Medicine*, 39(5), 273-7.

McHugh, M.P. (2006). Strength loss following static stretching. The role of muscle strength. *Medicine i Science in Sports i Exercise*, 38(5), 373-374.

Meyer T., Coen B., Urhausen A., Wilking P., Honorio, S. & Kindermann, W. (2005). Konditionelles Profil jugendlicher Fussballspieler. *Deutsche Zeitschrift fur Sportmedizin*, 56(1), 20–25.

Miller, J., Hankinson, V., Brusasco, F., Burgos, R., Casaburi, A., Coates, R., Crapo, P., Enright, C.P.M., Grinten, P., Gustafsson, R., Jensen, D.C., Johnson, N., MacIntyre, R., McKay, D., Navajas, O.F., Pedersen, R., Pellegrino, G., Viegi, J. & Wanger, J. (2005). Standardisation of spirometry. *European Respiratory Journal*, 26(2), 319-338.

Milanovic, Z., Sporis, G., Trajkovic, N., James, N. & Samija, K. (2013). Effect of a 12 Week SAQ Training Programme on Agility with and without the Ball among Young Soccer Players. *Journal of Sports Sciences and Medicine*, 12(1), 97-103.

Moez, T., Rebai, H., Shamssain, M., Masmoudi, K., Fellman, N., Zouari, N. & Tabka, Z. (2013). Comparative Study of Aerobic Performance Between Football and Judo Groups in Prepubertal Boys. *Asian Journal Sport Medicine*, 4(3), 165-174.

Molnar, S., Popović, S. & Smajić, M. (2009). The effects of physical exercise on growth and development of some motor abilities in football players. In *Proceedings book of the International Scientific Conference „Exercise and quality of life“* (61-65). Faculty of Sport and Physical Education, Novi Sad.

Mujika, I., Santisteban, J.M., Impellizzeri, M.F. & Castanga, C. (2009). Fitness determinants of success in men's and women's football. *Journal of Sports Sciences*, 27(2), 107-114.

Nedelec, M., McCall, A., Carling, C., Legall, F., Berthoin, S. & Dupont, G. (2013). Recovery in soccer. *Sports Medicine*, 43(1), 9-22.

Nelson, A., Driscoll, N., Landin, D., Young, M. & Schexnayder, I. (2004). Acute effects of passive muscle stretching on sprint performance. *Journal of Sports Sciences*, 23(5), 449-454.

Panajotis, T., Panajotis, P., Dulgeridis, P. i Debelnogić, M (2005). Razvoj morfoloških karakteristika, bazično-motoričkih i specijalno-motoričkih sposobnosti fudbalera u pripremnom periodu. *Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije*, 40, 283-290.

Philippaerts, R.M., Vaeyens, R., Janssens, M., Van Renterghem, B., Matthys, D., Crean, R., Bourgois, J., Vrijens, J., Beunen, G. & Malina, R.M. (2006). The relationship between peak height velocity and physical performance in youth soccer players. *Journal of Sports Sciences*, 24(3), 221-230.

Popovic, S., Radosav, R. & Molnar, S. (2009). The effects of physical exercise on growth and development of strength in young football players. In *Proceedings book of the International Scientific Conference „EXERCISE AND QUALITY OF LIFE“* (129-133). Faculty of Sport and Physical Education, Novi Sad.

Popovic, S., Bjelica, D., Jaksic, D. & Hadzic, R. (2014). Comparative Study of Anthropometric Measurement and Body Composition between Elite Soccer and Volleyball Players. *International Journal of Morphology*, 32(1), 267-274.

Radosav, R. (1990). Odabiranje dečaka za fudbal na osnovu longitudinalnog praćenja i usmeravanja razvoja bazičnih i specifičnih karakteristika i sposobnosti. *Doktorska disertacija*, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture iz Novi Sada.

Radosav, R., Molnar, S. i Smajić, M. (2003). *Teorija i metodika fudbala*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture u Novi Sad.

Raičković, N. (2007). Efekti primene modela kondicione pripreme u predtakmičarskom periodu kod fudbalera. *Doktorska disertacija*, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu.

Rasic, S. (1998). *Relacije između bazično-motoričkih i specifično-tehničkih sposobnosti fudbalera uzrasta 11-18 godina*. Magistarska teza, Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu u Novi Sad.

Reilly, T. & Rigby, T. (2002). Effect on active warm-down following competitive soccer. In: Sprink W, Reilly T, Murphy A, editors. *Science and*

Football IV, 226-229. Reilly, T. & Williams, A.M. (2003). Science and soccer (Second edition). Routledge, Taylor i Francis Group.

Rey, E., Carlos, L.P., Luis, C. & Joaquin. L.B. (2012). The Effect of Immediate Post-Training Active and Passive Recovery Interventions on Anaerobic Performance and Lower Limb Flexibility in Professional Soccer Players. *Journal of Human Kinetics*, 31, 121-129.

Samija, K. (2011). Učinci specifičnoga treninga brzine i agilnosti (SAQ) na morfološka, motorička i funkcionalna obilježja nogometaša. Doktorska disertacija, Zagreb: Kineziološki fakultet u Zagreb.

Sands, W.A., McNeal, J.R., Murray, S.R., Ramsey, M.W., Sato, K., Mizuguchi, S. & Stone, M.H. (2013). Stretching and its effects on recovery. *Strength and Conditioning Journal*, 35(5), 30-36.

Sander, A., Keiner, M., Wirth, K. & Shmidbleicher, D. (2013). Influence of a 2-year strength training programme on power performance in elite youth soccer players. *European Journal of Sport Science*, 13(5), 445-51

Sayers, A.L., Farley, R.S., Fuller, D.K., Jubenville, C.B. & Caputo, J.L. (2008). The effect of static stretching on phases of sprint performance in elite soccer players. *Journal of strength and conditioning research*, 22(5), 1416-21.

Segeres, V., De Clercq, D., Philippaerts, R.M. & Janssens, M. (2002). Running Economy in Early and Late Mature Youth Soccer Players. *Topics in Functional and Ecological Vertebrate Morphology*, pp. 125-138.

Sermaxhaj, S. (2019). The Effect of a Four-month Training Program on Body Fat and Pulmonary Parameters of Young Soccer Players. *Iran Journal Public Health*, 48(2), 353-354.

Sermaxhaj, S. (2017d) The impact of regular training programme on the speed and agility performance of the young football players. *Sport Science*, 10(1), 117-121

Sermaxhaj, S. & Telai, B. (2014). Influence of some anthropometric variables and the specific motoric on the success of the Football players of First Junior League of Kosovo. *Research in Physical Education, Sport and Health*, 3(3), 111-115.

Sermaxhaj, S., Arifi, F. & Bahtiri, A. (2017a) The Effect of Static Stretching in Agility and Isokinetic Force at Football Players. *Sport Mont*, 15(3), 29-33

Sermaxhaj, S., Popovic, S., Bjelica, D., Gardasevic. J. & Arifi, F. (2017b). Effect of recuperation with static stretching in isokinetic force of young football players. *Journal of Physical Education and Sport*, 17(3), 1948-53

Sermaxhaj, S., Arifi, F., Bahtiri, A. & Alaj, I. (2017c). The Impact of Recuperation with Static Stretching in Flexibility And Agility with and without ball of Young Soccer Players. *Acta Kinesiologica*, 11(1),33-38

Sermaxhaj, S., Arifi, F., Alaj, I., Bahtiri, A., Havolli, J. & Sermaxhaj, S.S. (2018) The Effect of Static Stretching in Agility and Isokinetic Force at Football Players. *Sport Mont*, 16(2), 45-49

Silveira G., Sayers M. & Waddington G., (2010). Effect of static and dynamic stretching on hamstring flexibility in the warm-up. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 12(2), 10- 11.

Smajic, M., Molnar, S. i Popovic, S. (2009a). Longitudinalna dimenzijalnost skeleta mladih fudbalera. U Zborniku sažetaka sa XLVIII Kongresa Antropološkog društva Srbije (129). Prolom banja: Antrpološko društvo Srbije. Smajic, M., Molnar, S. & Popovic, S.

(2009b) Effects of traning process on flexibility of young footballers. In Proceedings book of the International Scientific Conference „Exercise and quality of life“ (135- 141). Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education u Novi Sad.

Smajic, M., Madic, D., Cokorilo, N., Milosevic, Z., Obradovic, B. i Tomic, B. (2015). Differences in Morphological Characteristics Football Players of older Pioneers and Cadets. *Journal of the Anthropological Society of Serbia*, 50, 11-16.

Solverborn, S.A. (1997). Radial epicondylalgia (“tennis elbow”): treatment with stretching or forearm band. A prospective study with long-term follow-up including range-of-motion measurements. *Sacndinavian journal of medicine and science in sports*, 7(4), 229-37.

Sperlich, B., De Marees, M., Koehler, K., Linville, J., Holmberg, HC. & Mester, J. (2011). Effects of 5 weeks of high-intensity interval training vs. volume training in the 14-year-old soccer players. *Journal of strength Condition Research*, 25(5), 1271-8.

Sporis, G. (2007) Efekti situacijskog polistrukturalnog kompleksnog treninga na morfološka, motorička, situacijsko-motorička i funkcionalna obilježja. Doktorska disertacija, Zagreb: Kineziološki fakultet u Zagreb.

Stolen, T., Chamari, K., Castanga, C. & Wilsloff, U. (2005). Physiology of soccer. *Sports Medicine*, 35(6), 501-536.

Taylor, D.C., Dalton, J.D., Seaber, A.V. & Garrett, W.E. (1990). Viscoelastic properties of muscle-tendon units: the biomechanical effects of stretching. *The American Journal of sports medicine*, 18(3), 300-309.

Tessitore, A., Meeusen,

R., Cortis, C. & Caprinica, L. (2007). Effects of different recovery interventions on anaerobic performances following preseason soccer training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 21(3), 745–750. Vanttinen, T., Blomqvist, M., Nyman, K. & Hakkinen, K. (2011). Changes in body composition, hormonal status, and physical fitness in 11-, 13-, and 15-year-old Finnish regional youth soccer players during a two-year follow-up. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(12), 3342-51. Weineck, J. (2000). *Optimales Training*. Nürnberg: (11. Auflage), Balingen, Spitta-Verlag, GmbH. Verheijen, R. (1997). *Handbuch für Fussballkondition*. Amsterdam: Leer, BPF Versand. Vucetic, V., Sos, K. i Rocak, A. (2003). Gipkost nogometaša. *Kondicijska priprema sportaša* (404-412). Kineziološki fakultet u Zagrebu. Walker, B. (2006). The anatomy of stretching. Chichester: Lotus. Witvrouw, E., Danneels, L., Asselman, P., D'Have, T. & Cambier, D. (2003). Muscle flexibility as a risk factor for developing muscle injuries in male professional soccer players a prospective study. *The American Journal of Sports Medicine*, 31(1), 41–46. Wrigley, T.V. (2000). Correlations with athletic performance. In: *Isokinetics in human performance* Ed, Brown, L.E. The United States of America. *Human Kinetics*, 42-75. Zakas, A. (2005). The effect of stretching duration on the lower-extremity flexibility of adolescent soccer players. *The Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 9(3), 220-225. Zakas, A., Galazoulas, C., Doganis, G. & Zakas, N. (2006). Effect of two acute static stretching durations of the rectus femoris muscle on quadriceps isokinetic peak torque in professional soccer players. *Isokinetics and exercise science*, 14(4), 357-362.

PRILOG Sadržaj redovnog programa treninga za kategorije početnika, pionira i kadeta Tabela 110. Sadržaj makrociklusa za početnici (glavni cilj: bazični i specifični trening)

Pripremni period TE (tehnika) Testiranje, manipulacija sa loptom – žongliranje, vođenje, dodavanje, primanje (kontrolisanje lopte) i udarac lopte TA (taktika), forme igre: 1:1 do 4:4 i varijante 3:1/3:2/4:2/4:3

Napad: Adekvatno postavljanje i otkrivanje, posjed lopte, završni napad sa udarcem

Odbrana: Adekvatno postavljanje u fazi odbrane, aktivna odbrana KO (kondiciona- fizička priprema)

Testiranje, aerobna bazična izdržljivost, brzina reagovanja - pokretljivost i bazična snaga

ME (mental) Druženje pored igre, Komunikacija

Takmičarski period TE – (tehnika) manipulacija sa loptom – žongliranje, vođenje, driblanje i dodavanja u pokretu sa poluaktivnim protivnikom - kontrolisanje lopte, driblanje sa loptom i udarac po lopti udarac po lopti na gol (nakon primanja ili duplog pasa)

TA (taktika) Forme igre: 2:2/4:4 do 6:6 i varijante: 5:3/ 5:4/6:4 i 6:5

Napad: forme igre, 1:1, 2:2 do 6:6 sa golmanom, Igra na optimalnom prostoru i posjed lopte (igra sa više i manje igrača sa ograničenjem dodira lopte).

Građenje igre od pozadi: igre 2:1/ 3:2 do 4:2 sa završetkom akcije na gol, transformacija nakon oduzete lopte

Odbrana: Bazična adekvatna postavljanja u igri 1:1/2:2/4:4 do 6:6; odbrana igrač na igrača i zonska odbrana - orijentacija na loptu

Odbrana sa više igrača forme igre 2:1/3:2/4:3 do 8:6; Transformacija nakon izgubljene lopte

KO (kondiciona- fizička priprema) koordinacija, brzina reagovanja, aerobna izdržljivost, snaga i stabilnost, vježbe sa svojom tjelesnom težinom, pokretljivost i fleksibilnost

ME (mental) želja za treningom, igrom i takmičenjem, respekt i fair play.

Komponente treninga (TE- tehnika, TA- taktika, KO- kondiciona, ME-mentalna Tabela 111. Pripremni period (avgust), sadržaj programa treninga za kategoriju početnici

Prva sedmica (mikrociklus 1)

Trening 1. TE- vođenje lopte; KO- Aerobna bazična izdržljivost; TA- Bazična grupna; ME- druženje (Z.1/2)

Trening 2. KO- bazična izdržljivost; TE- vođenje i dodavanje lopte unutrašnjom stranom stopala; TA- grupna taktika (male igre 3:3 sa malim golovima preko dodavanja i driblanja); ME- druženje i komunikacija (Z.1/2)

Trening 3. TE- vođenje, dodavanje i kontrolisanje lopte unutrašnjom stranom stopala; TA- Bazična grupna (male igre 3:3 i 4:4 sa golmanima driblanje golova); KO- bazična izdržljivost; ME- edukacija (Z.2/3)

Druga sedmica (mikrociklus 2)

Trening 4. TE – Vođenje, dodavanje i kontrolisanje lopte spoljašnjom stranom stopala (kognitivne igre); KO- bazična snaga; TA- bazična grupna taktika u odbrani uz male igre; ME- povjerenje (Z.2)

Trening 5. KO- Brzina reagovanja bez i sa loptom (kognitivne igre); TE- frontalno driblanje 1:1; TA- individualna taktika u napadu – aktivno otkrivanje igrača; ME- motivacija; (Z.2/3)

Trening 6. TA- individualna i grupna taktika u odbrani (male igre 1:1/4:4

sa dribljanjem golova); TE- oduzimanje lopte; KO- agilnost sa loptom; ME- želja za takmičenjem; (Z.3) Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 7. TE- koordinacija sa loptom (žongliranje); KO- aerobna – anaerobna izdržljivost (uz male igre); TA- bazična grupna taktika u fazi napada i odbrane; ME- koncentracija; (Z.2/3). Trening 8. KO- brze akcije (kognitivne igre); TE – frontalno driblanje i udarac na gol u igri (1:1 i 2:2); TA- individualna taktika u napadu i odbrani uz igru sa dribljanjem golova i golmana; ME- samopouzdanje; (Z.3) Trening 9. TA- individualna i grupna taktika u napadu (igra 2:1/3:2 i 4:3); TE – dodavanje, kontrolisanje i udarac lopte unutrašnjom stranom stopala; KO- snaga i stabilnost, vježbe sa svojom tjelesnom težinom; ME: saradnja; (Z.2/3). Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 10. TE- udarac lopte unutrašnjom stranom stopala; KO- specifična aerobna izdržljivost; TA- bazična individualna i grupna taktika u napadu i odbrani uz male igre sa džokerima (4+2:4+2) i golmani; ME- koncentracija; (Z.3). Trening 11. KO- brzina i agilnost (kognitivne igre); TE – kontrolisanje i udarac lopte; TA- bazična grupna taktika u igri 4:4 sa golovima; ME- saradnja; (Z.3/4). Trening 12. TA- grupna taktika u napadu i odbrani u igri 5:5/6:6); TE – kontrolisanje, driblanje i udarac lopte; KO- specifične aerobne i anaerobne izdržljivosti; ME-timski rad; (Z.2/3). Takmičarski period za kategorije ispitanika početnika (U13) Zona 5 – anaerob, Zona 4 – anaerobni prag, Zona 3 – intenzivna aerobna, Zona 2 – ekstenzivna aerobna, Zona 1 – aerobna Tabela 112. Takmičarski period (septembar), sadržaj programa treninga za kategorije početnici Prva sedmica (mikrociklus 1) Trening 13. TE- vođenje lopte spoljašnjom stranom stopala; KO- aerobna izdržljivost; TA- male igre 2:2/ 3:3 sa džokerima i driblanje golova (kognitivne igre); ME- socijalizacija; (Z.1/2). Trening 14. KO- startna brzina (igre kognitive); TE- tehnika trčanja, sprintevi u obliku igre; TA- individualna taktika u napadu i odbrani u igri 1:1 sa golovima; ME- nesebična motivacija; (Z.3/4). Trening 15. TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani uz male igre 5:3 i 6:4; TE-situaciona tehnika; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- komunikacija (Z.2/3). Druga sedmica (mikrociklus 2) Trening 16. TE- vođenje i dodavanje lopte spoljašnjom stranom stopala; KO- aerobna izdržljivost; TA- igra 4:4 sa dodatnim igračima i sa malim golovima; ME- socijalizacija; (Z.3/4). Trening 17. KO- startna brzina; TE- tehnika trčanja, sprintevi u obliku igre; TA- individualna i grupna taktika u napadu i odbrani uz male igre 1:1 i 2:2 sa golmanima; ME- motivacija; (Z.3/4). Trening 18. TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 5:4; TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- saradnja; (Z.3). Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 19. TE- kontrolisanje i udarac lopte spoljašnjom stranom stopala; KO- aerobne izdržljivosti - fleksibilnost; TA- male igre 4:4 sa dodatnim igračima (džokeri) i golmani (kognitivne igre); ME- socijalizacija; (Z.3). Trening 20. KO- koordinacija i agilnost; TE- kontrolisanje lopte po zemlji; TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 3:3 do 5:5 i sa džokerima; ME- motivacija za igru; (Z.3/4). Trening 21. TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 6:5; TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- saradnja između igrača; (Z.3). Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 22. TE- dodavanje i primanje lopte (kontrolisanje lopte); KO- aerobna izdržljivost; TA- igra 6:6 sa golovima uz dodavanje-udarac; ME- socijalizacija; (Z.1/2). Trening 23. KO- bazična snaga trupa; TE- frontalno driblanje; TA- individualna taktika u napadu i odbrani u igri 1:1 sa golmanima i džokerima; ME- nesebična motivacija; (Z.3/4). Trening 24. TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 6:6; TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- timske akcije; (Z.2/3). Prva sedmica (mikrociklus 1) Trening 25. TE- vođenje lopte punim stopalom; KO- aerobne izdržljivosti; TA- grupna taktika u napadu i odbrani uz male igre 4:4 sa dodavanjem i dribljanjem golova; ME- saradnja; (Z.3). Trening 26. KO- startna brzina; TE- primanje lopte donom, driblanje i udarac punim stopalom; TA- bazična individualna taktika u napadu i odbrani u igri 1:1; ME- motivacija; (Z.2/3). Trening 27. TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 3:3 + 6 džokeri sa golovima; TE- kontrolisanje lopte po zemlji sa ograničenjem dodira lopte; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- timski rad; (Z.3). Druga sedmica (mikrociklus 2) Trening 28. TE- kontrolisanje lopte (kognitivne igre); KO- bazična snaga trupa; TA- grupna taktika u igri 5:5 sa dodavanjem i

driblanjem golova; ME- koncentracija; (Z.2/3). Trening 29. KO- agilnost; TE- bočno driblanje; TA- bazična individualna taktika u napadu i odbrani u igri 1:1 sa driblanjem golova i golmana (kognitivne igre); ME- motivacija; (Z.3/4). Trening 30. TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 4:4 + 4 pomoćni igrači-džokeri i golmani; TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- komunikacija i timski rad; (Z.3). Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 31. TE- kontrolisanje lopte koja padne na tlo unutrašnjom stranom stopala i udarac; KO- pokretljivost i koordinacija sa loptom; TA- igra 4:4 plus 4 sa golmanima; ME- koncentracija; (Z.2). Trening 32. KO- koordinacija i tehnika skoka; TE- dodavanje i udarac lopte punim stopalom na gol; TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 2:2+4 sa golovima uz dodavanje i udarac na gol; ME- takmičarski motiv (Z.3/4). Trening 33. TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 6+2:6+2 i golmani; TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- timski rad; (Z.2/3). Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 34. TE- kontrolisanje lopte koja padne na tlo spoljašnjom stranom stopala, driblanje i udarac na gol. KO- aerobne izdržljivosti i koordinacija sa loptom; TA- grupna taktika uz male igre 4+2:4+2 sa golovima); ME- koncentracija; (Z.2). Trening 35. KO- brzina sa promjenom pravca kretanja; TE- primanje lopte koja padne na tlo; TA- grupna taktika u napadu i odbrani u igri 3:3 +2 sa golmanima; ME- takmičarski motiv; (Z.3/4). Trening 36. TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 6+4:6+4 i golmani; TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- komunikacija; (Z.2/3) Prva sedmica (mikrociklus 1) Trening 37. TE-vođenje, driblanje i udarac lopte (kognitivne igre); KO- aerobna izdržljivost; TA- grupna taktika u igri 6:6 sa dodavanjem i driblanjem golova; ME- samopouzdanje; (Z.1/2). Trening 38. KO- brzinska frekvencija; TE- primanje lopte sa okretom, driblanje i udarac na gol; TA- individualna i grupna taktika u napadu i odbrani u igri 1:1 i 2:2 sa protivnikom iza leđa; ME- takmičarski duh; (Z.3/4) Trening 39. TA- grupna taktika u napadu sa većim brojem igrača u igri 4:3/6:4 (dupli pas); TE- kontrolisanje lopte po zemlji sa ograničenjem broja dodira lopte; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- timski rad; (Z.3) Druga sedmica (mikrociklus 2) Trening 40. TE- koordinacija sa loptom; KO- vježbe snage i stabiliteta trupa; TA- grupna taktika u igri 4:4 sa driblanjem i dodavanjem golova (kognitivne igre); ME- koncentracija; (Z.2/3). Trening 41. KO- brzina zaustavljanja i startnog ubrzanja (metod "stop and go"); TE- finte- preskakanje lopte; TA- bazična taktika u napadu driblanje - finte, u igri 1:1, 1:2, 2:3 sa driblanjem golova i golmana; ME- samouvjerenost; (Z.3/4). Trening 42. TA- bazična grupna taktika u napadu sa dodatnim igračima (džokerima) u igri 6:6 +4 (dodavanje na trećeg igrača); TE- situaciono dodavanje i primanje lopte; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- saradnja između igrača; (Z.2/3) Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 43. TE- udarac lopte punom stranom stopala; KO- pokretljivost i relaksacija; TA- grupna taktika u napadu 4:4+4 sa golmanima na голу (kognitivne igre); ME- koncentracija; (Z.2) Trening 44. KO- koordinacija i agilnost; TE- finte sa preskakanjem lopte; TA- bazična grupna taktika u napadu (driblanje, dupli pas) uz igre 1:1+2, 2:2+4, sa golmanima; ME- želja za takmičenjem; (Z.3/4). Trening 45. TA- bazična grupna taktika u odbrani sa više igrača u igri 4:3/6:4 (pokriivanje igrača i pokriivanje prostora); TE- situaciona tehnika; KO- Specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- timski rad; (Z.3). Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 46. TE- žongliranje i primanje lopte koja padne na tlo; KO- aerobna izdržljivost; TA- grupna taktika u igri 6:6 +4 sa golmanima (kognitivne igre); ME- zabava; (Z.1/2) Trening 47. TE- dodavanje i primanje lopte po zemlji; TA- napadna grupna taktika u igri sa zonama; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- komunikacija; (Z.3). Trening 48. TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 8:8 sa golmanima; TE- situaciona tehnika; KO- specifične izdržljivosti; ME- timski rad; (Z.2/3). Tabela 115. Sadržaj makrociklusa za pionire (glavni cilj: trening izgradnje igre) Pripremni period TE (tehnika), Testiranje, manipulacija sa loptom - žongliranje u pokretu, vođenje i driblanje, primanje i dodavanje u pokretu, udarac nakon primanja. TA (taktika), Forme igre: 1:1 do 4:4; i varijante: 4:2/5:3/6:4/8:8 sa kognitivnim igrama Napad: Adekvatna individualna i grupna postavljanja i otkrivanje, brza cirkulacija tokom posjeda lopte, napadačke akcije i finalizacija udarcem na gol uz igru (5:3/7:6) Odbrana: Individualna i

grupna postavljanja u odbrani, organizovana i aktivna odbrana, pokrivanje igrača i prostora. KO (kondiciona- fizička priprema) Testiranje, aerobna bazična izdržljivost, brzina reagovanja, pokretljivost i koordinacija integrisana bazična snaga ME (mental) Druženje, respekt i komunikacija Takmičarski period TE – (tehnika) Manipulacija sa loptom - žongliranje u pokretu pod pritiskom vremena i prostora; vođenje, driblanje i dodavanje u pokretu pod pritiskom, sa poluaktivnim i aktivnim protivnikom; kontrolisanje lopte pod pritiskom protivnika i prostora; driblanje sa loptom, finta i udarac u pokretu (nakon primanja ili duplog pasa). TA (taktika) Forme igre: 3:3/4:4 do 8:8 (kognitivne igre) Napad: forme igre 1:1, 2:2 do 8:8 sa golmanima; igra na optimalnom prostoru i posjed lopte (igra sa više i manje igrača) sa ograničenjem dodira lopte; građenje i organizacija igre sa podrškom od pozadi u igri 4:3/6:4 i finalizacija akcije udarcem na gol; brza transformacija. Odbrana: Bazična individualna i grupna postavljanja u odbrani u igri 1:1 4:4 do 8:8; kombinovana odbrana "orijentacija na loptu" odbrana sa više i manje igrača, transformacija nakon izgubljene lopte KO (kondiciona- fizička priprema) koordinacija i pokretljivost, brzina reagovanja i agilnost, aerobna-anaerobna bazična izdržljivost, brzinska snaga i snaga i stabilnost (vježbe sa svojom tjelesnom težinom) ME (mental) želja za treningom i takmičenjem, učenje za učvršćivanjem povjerenja Tabela 116. Pripremni period (avgust), sadržaj programa treninga za kategoriju pioniri Prva sedmica (mikrociklus 1) Trening 1. TE- povratak osetljivosti za loptu –kognitivne igre; KO- aerobna bazična izdržljivost; TA- bazična grupna (u igri sa malim golovima); ME- druženje (Z.1/2) Trening 2. KO- bazična i specifična izdržljivost; TE- vođenje, driblanje i dodavanje lopte; TA- bazična grupna taktika (igra na male golove sa dodavanjem i driblanjem); ME- komunikacija (Z.2) Trening 3. TE- vođenje, finta i udarac lopte; TA- bazična grupna taktika (igre 4:4/6:6, sa malim golovima); KO- bazična i specifična izdržljivost snage trupa; ME- druženje i komunikacija (Z.2/3) Druga sedmica (mikrociklus 2) Trening 4. TE – dodavanje i primanje lopte u pokretu; KO-koordinacija i snaga - stabilnost; TA- bazična grupna taktika sa džokerom, golovi preko dodavanja –udarca lopte; ME- komunikacija; (Z.2) Trening 5. KO- koordinacija i brzina izvođenja tehničkih elementa; TE- frontalno driblanje u igri 1:1/3:3; TA- individualna i grupna taktika u odbrani i napadu; ME- samopouzdanje; (Z.3/4) Trening 6. TA- specifična individualna i grupna taktika u odbrani u igri 1:1 i 4:4 sa driblanjem golova i golmana; TE- oduzimanje lopte; KO- agilnost sa loptom; ME- odgovornost; (Z.3) Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 7. TE- koordinacija (lopta – igrač) žongliranje; KO- snaga trupa i aerobne -anaerobne izdržljivosti; TA- specifična grupna taktika u igri 6:6 +4; ME- koncentracije (Z.2/3) Trening 8. KO- tehnika skakanja i brzog trčanja; TE – frontalno driblanje u igri; TA- grupna taktika u odbrani i napadu u igri 2:2/4:4 sa driblanjem golova i golmana; ME- samopouzdanje (Z.3/4) Trening 9. TA - individualna i grupna taktika u napadu "brzi napad" u igri 2:1/ 3:2 i 4:3; TE –driblanje, dupli pas i udarac na gol; KO- brzina i agilnost; ME: saradnja i koncentracija (Z.3) Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 10. TE- dodavanje, primanje i udarac na gol; KO- bazična izdržljivost; TA- specifična grupna taktika u napadu (vertikalna igra sa trećim igračem); ME- koncentracije (Z.2) Trening 11. KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; TE- dodavanje i primanje lopte; TA- specifična grupna taktika u igri 6:6 sa pomoćnim igračem i golmanima; ME- saradnja (Z.3/4) Trening 12. TA- specifična grupna taktika u igri 8:7, - individualno i grupno adekvatno pozicioniranje igrača u fazi odbrane i napada; TE –situaciono kontrolisanje lopte; KO- specifične aerobne-anaerobne izdržljivosti; ME: komunikacija i timski rad (Z.2/3) Prva sedmica (mikrociklus 1) Trening 13. TE- koordinacija (lopta – igrač); KO- aerobne izdržljivosti - regeneracija i pokretljivost; TA- grupna taktika u igri u vazduhu; igra "tenis fudbal"; ME- socijalizacija (Z.1/2) Trening 14. KO - brzina reakcije; TE- brzo zaustavljanje i pokretanje - sa i bez lopte (stop und go); TA- grupna taktika u fazi odbrane i napada u igri 1:1 i 4:4 sa golmanima; ME- motivacija; (Z.3/4) Trening 15. TA- bazična grupna taktika, poziciona igra u fazi odbrane i napada; TE- situaciona tehnika (brza cirkulacija lopte); KO- specifična izdržljivosti; ME- komunikacija. (Z.2/3) Druga sedmica (mikrociklus 2) Trening 16. TE- vođenje i udarac lopte; KO- koordinacija i fleksibilnost; TA- grupna taktika u fazi odbrane i napada, igra 4:4 sa pomoćnim igračem i golmanima; ME-

socijalizacija; (Z.2) Trening 17. KO- brzina i eksplozivna snaga; TE- kontrolisanje lopte uz pritisak; TA- individualna i grupna taktika u napadu u igri 1:1 do 4:4 sa golmanima; ME- motivacija sa takmičenjem; (Z.4) Trening 18. TA- specifična grupna taktika u fazi napada i odbrane, "brzi napad" u igri 7:5 sa golmanom i driblanjem golova. TE- situaciona tehnika uz pritisak prostora i protivnika; KO- specifične aerobne- anaerobne izdržljivosti; ME- koncentracija (Z.3) Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 19. TE- kontrolisanje dugačkih lopti i udarac na gol; KO- aerobna izdržljivost; TA- grupna taktika u napadu u igri 6:6 u 2 zone, sa pomoćnim igračima i golmanima; ME- socijalizacija, (Z.2) Trening 20. KO- brzina i agilnost sa loptom; TE- driblanje sa protivnikom iza leđa; TA- taktika u napadu i odbrani u igri 1:1 do 6:6 sa 2 zone i golmanima; ME- motivacija i saradnja (Z.3) Trening 21. TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 6+2:6+2 i golmani, napad preko bočne strane; TE- centar-šut i udarac glavom; KO- specifične izdržljivosti; ME-saradnja (Z.3) Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 22. TE- tehnika volej udaraca; KO-koordinacija i pokretljivost; TA-igra 6:6 sa golmanima rukomet-fudbal (dodavanje lopte rukom i udarac nogom -volej); ME- socijalizacija (Z.2) Trening 23. KO- vježbe snage i stabilnosti; TE- finta sa loptom sa aktivnim protivnikom; TA- individualna i grupna taktika u igri 1:1 do 4:4 sa golmanima; ME- takmičarski duh (Z.3/4) Trening 24. TA- specifična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 8:7, kombinacija igre sa golmanima i driblanjem golova; TE situaciona tehnika sa ograničenjem dodira lopte; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- timska saradnja (Z.2/3) Prva sedmica (mikrociklus 1) Trening 25. TE- žongliranje lopte u pokretu i primanje lopte grudima; KO-pokretljivosti; TA- grupna taktika (napad preko bočne strane i finalizacija akcije; ME- saradnja i motivacija (Z.1/2) Trening 26. KO- koordinacija i brzina izvođenja tehničkih elemenata sa loptom; TE- primanje lopte koja padne na tlo i udarac na gol; TA- bazična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 1:1 i 2:2 sa golmanima; ME- motivacija i samopouzdanje (Z.3/4) Trening 27. TA- grupna taktika u napadu, igra po dubini sa dodavanjem lopte drugom redu (igra 4+2:4+2); TE- kontrolisanje lopte uz pritisak; KO- specifične izdržljivosti; ME- timski rad (Z.3) Druga sedmica (mikrociklus 2) Trening 28. TE- vođenje lopte sa promjenom ritma (kognitivne igre); KO- snaga trupa; TA- grupna taktika u napadu (aktivno otkrivanje) igra 6+2:6+2; ME- koncentracija (Z.2) Trening 29. KO- specifične aerobne- anaerobne izdržljivosti; TE- dodavanje i primanje lopte uz pritisak; TA- specifična grupna taktika u odbrani "grupni presing" u igri 5:3/ 6:4 sa golmanima i driblanjem golova; ME- pozitivna aktivna agresivnost- mut (Z.4). Trening 30. TA- grupna taktika u napadu i odbrani u igri 6:5/7:6, sa golmanima i driblanjem golova; TE- situaciona tehnika; KO- specifične izdržljivosti; ME- timski rad, (Z.2/3) Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 31. TE- kontrolisanje lopte u vazduhu "tenis fudbal"; KO- koordinacija sa loptom i pokretljivost; ME- koncentracija i zabava; (Z.1/2) Trening 32. KO- startna brzina i ubrzanje; TE- dodavanje- primanje i udarac na gol; TA- specifična i grupna taktika u odbrani (orijentacija na loptu- pokrivanje protivnika i zaštita leđa saigrača u igri 6:5/7:6 sa golovima uz driblanje i dodavanje; ME- grupna saradnja (Z.3/4) Trening 33. TA- specifična grupna taktika u napadu (dupli pas) u igri 7:6/ 8:7 sa zonama i golmanima; TE- situaciona tehnika uz pritisak vremena, prostora i protivnika; KO- specifične aerobne-anaerobne izdržljivosti; ME- timski rad, (Z.3) Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 34. TE- centriranje lopte i udarac glavom na gol; KO- aerobne izdržljivosti; TA- grupna taktika u napadu uz akcije sa bočne strane (centaršut i finalizacija); ME – koncentracija; (Z.1/2) Trening 35. KO- eksplozivna snaga i brzina; TE- bočno driblanje, centaršut i finalizacija akcije; TA- specifična grupna taktika u napadu i odbrani, dizanje saigrača iza leđa u igri 6:6 +4 pomoćna igrača sa strane i golmani; ME- motivacija za takmičenje (Z.3/4) Trening 36. TA- specifična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 8:8 sa driblanjem golova i golmana (organizacija napada uz kombinovanje igre između saigrača); TE- situaciona tehnika uz pritisak; KO- specifične izdržljivosti; ME- timski rad, (Z.2/3) Prva sedmica (mikrociklus 1) Trening 37. TE- vazдушna igra, odbijanje lopte; KO- pokretljivost; TA- taktička odbrana, igra 4:4 rukomet- fudbal; ME- relaksacija i pozitivna emocionalnost (Z.2/3) Trening 38. KO- brzina zaustavljanja i startna brzina (stop und go); TE- driblanje sa promenom ritma i udarac na gol; TA-

specifična grupna taktika u napadu i odbrani u igri 3:3 sa 3 zone, driblanje golova i golmana; ME- koncentracija motivacija za takmičenje (Z.3/4) Trening 39. TA- bazična ekipna taktika u napadu – građenje igre od pozadi u igri 8:6 sa golmanima; TE- brzo kontrolisanje lopte uz pritisak i ograničenje dodira lopte; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- timski rad (Z.3) Druga sedmica (mikrociklus 2) Trening 40. TE- poboljšanje tehnike uz kognitivne igre; KO- snaga i stabilnost trupa; TA- specifična grupna taktika (standardne situacije); ME- koncentracija (Z.2) Trening 41. KO- aerobne - anaerobne izdržljivosti; TE- dodavanje i primanje lopte uz pritisak; TA- grupna taktika, presing i brza transformacija u igri 4+2:4+2; ME- motivacija (Z.3/4) Trening 42. TA- grupna taktika u napadu (otkrivanje u slobodan prostor) igra 6+2:6+2 sa zonama i golmanima; TE- situaciona tehnika uz pritisak; KO- specifične izdržljivosti; ME- saradnja (Z.2/3) Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 43. TE- žongliranje u pokretu; KO- fleksibilnost i relaksacija; TA- kompleksne napadačke akcije); ME- motivacija (Z.2) Trening 44. KO- agilnost i brzina; TE- oduzimanje lopte i dodavanje udarac na gol; TA- specifična individualna i grupna taktika u igri 1:1/2:2 sa zonama, driblanje golova i golmana; ME- agresivnost i samopouzdanje (Z.3/4) Trening 45. TA- grupna taktika, organizacija brze napadačke akcije u igri 6:4 sa golmanima; TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- timski rad (Z.3) Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 46. TE- kontrolisanje lopte uz kognitivne igre; KO- aerobne izdržljivosti i pokretljivost; TA- grupna taktika u igri 6:6 +6 sa golmanima; ME-zabava (Z.1/2) Trening 47. KO- koordinacija i tehnika sa loptom; TE- dodavanje i primanje lopte; TA- grupna taktika u igri 4+2:4+2 sa tri zone i golmanima; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- komunikacija (Z.3) Trening 48. TA bazična ekipna taktika u napadu i odbrani u igri 10:8 sa golmanima, poziciona igra u fazi odbrane i napada; TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME- timski rad (Z.2/3) Tabela 120. Sadržaj makrociklusa za kadete (glavni cilj: treniraj da osvojiš rezultate) Pripremni period TE (tehnika), Testiranje, koordinacija (igrač-lopta), driblanje – finte, čuvanje lopte i igra glavom (kontrolisanje lopte uz pritisak), precizni udarci TA (taktika), Forme igre: 1:1/4:4/6:6/8:8 i varijante sa pomoćnim igračima (džokerima) sa više i manje igrača Napad: specifično pozicioniranje, otkrivanje u praznom prostoru, brza cirkulacija lopte – poziciona igra, organizacija grupnih napada i finalizacija Odbrana: kombinovana odbrana (orijentacija na loptu), grupna odbrana "blok" – saradnja između dvije linije, aktivna i agresivna odbrana KO (kondiciona- fizička priprema) Testiranje, aerobna bazična izdržljivost, brzina reagovanja, pokretljivost i koordinacija integrisana bazična snaga ME (mental) Druženje, respekt i komunikacija Takmičarski period TE – (tehnika) specifična tehnika pod pritiskom (sa mnogo duela), žongliranje u dviženje, vođenje, driblanje, dupli pas i udarac na gol ; oduzimanje lopte (klizeći start), kontrolisanje dugačkih lopti, igra glavom TA (taktika) Forme igre: 2:2/4:4/6:6/8:8 do 10:10 i varijante sa više ili manje igrača Napad: Napadačke akcije sa završnicom udarca na gol, poziciona igra u napadu sa promjenom ritma (tempo) igre, brz napad i kontranapad, vertikalna igra pred igru u širinu, grupna brza transformacija, igra sa kontrolisanjem lopte uz pritisak vremena, prostora i protivnika. Odbrana: Kombinovana odbrana –orijentacija na loptu ekipna brza transformacija nakon izgubljene lopte, organizacija "blok", standardne situacije specifična pozicija u odbrani sa sistemom 4:3:3. KO (kondiciona- fizička priprema) Koordinacija i brzina, maksimalna i eksplozivna snaga, snaga i koordinacija, brzina reakcije-brze akcije, specifične anaerobne-aerobne izdržljivosti, pokretljivost – agilnost bez i sa loptom. ME (mental) Motivacija za trening i takmičenje, poznavanje problema i kritička mišljenja, odgovornost, respekt i fair play Tabela 121. Pripremni period (avgust), sadržaj programa treninga za kategoriju kadeti Prva sedmica (mikrociklus 1) Trening 1. TE- vođenje i dodavanje u pokretu; KO- aerobna idržljivost; TA- bazična grupna taktika u igri 6:6/8:8 sa driblanjem golova; ME- socijalizacija (Z.1/2) Trening 2. KO- aerobna izdržljivost i bazična snaga; TE- vođenje, dodavanje i primanje; TA- grupna odbrana; pokrivanje protivnika i prostora uz igru 6:6 u zonama; ME- komunikacija (Z.2) Trening 3. TA- grupna taktika napada "otkrivanje u slobodnom prostoru" u igri 4:4/6:6 i golmani; KO- specifična aerobna

izdržljivost; TE- kontrola lopte i udarac na gol; ME-timski rad (Z.2/3) Druga sedmica (mikrociklus 2) Trening 4. KO- bazična snaga; TE – poboljšanje dodavanja i primanja lopte; TA- grupna specifična taktika u odbrani – pokrivanje prostora- zone u igri 5:3/6:4; ME- saradnja (Z.2) Trening 5. KO- specifične izdržljivosti; TE- dodavanje i primanje uz pritisak; TA- grupni napad, u igri 3:3/4:4 sa pomoćnim igračima i golmanima); ME- saradnja između saigrača (Z.3) Trening 6. TA- grupna taktika u odbrani i napadu “brza transformacija” odbrana–presing, napad- vertikalna igra uz dodavanje po dubini (igra 4+2:4+2 sa dvije zone i golmanima); TE- oduzimanje lopte i dodavanje; KO- specifične aerobne-anaerobne izdržljivosti; ME- timski rad (Z.3/4) Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 7. TE- žongliranje lopte u pokretu i udarac; KO- koordinacija i pokretljivost; TA- grupna taktika u napadu sa bočne strane i finalizacija akcije; ME- želja sa treningom (Z.2/3) Trening 8. KO- eksplozivna snaga i brzina; TE – driblanje-finte i udarac na gol; TA- individualna i grupna taktika u odbrani i napadu u igri 1:1/2:2/4:4 sa golmanima; ME- samouvjerenost (Z.4/5) Trening 9. TA- grupni napad, promjena mjesta između napadača (saigrača) u igri sa više igrača 8:6; TE – situaciona tehnika i udarac na gol; KO- specifične izdržljivosti; ME-timski rad (Z.2/3) Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 10. KO- snaga i stabilnost trupa; TE- kontrolisanje dugačkih lopti; TA- grupna napadačka taktika sa dolaženjem saigrača iza leđa i finalizacija; ME- koncentracija (Z.2) Trening 11. KO- brzina i agilnost; TE– kontrolisanje lopte uz pritisak i sa ograničenjem dodira lopte; TA- grupna odbrana pokrivanje – čuvanje leđa saigrača; ME- koncentracija (Z.3/4) Trening 12. TA- ekipna taktika poziciona napadačka igra 10:6 sa driblanjem golova i golmana; TE – situaciona tehnika sa brzim kontrolisanjem lopte uz ograničenje dodira lopte; KO- specifične aerobne- anaerobne izdržljivosti; ME: timski rad i odgovornost (Z.2/3) Prva sedmica (mikrociklus 1) Trening 13. TE-kontrolisanje lopte glavom “tenis fudbal”; KO- koordinacija; TA- napadačke akcije sa strana, (centaršut i udarac glavom); ME- koncentracija i socijalizacija (Z.1/2) Trening 14. KO- koordinacija i brzina; TE- driblanje, finta i udarac sa visokim tempom i uz pritisak; TA- grupna taktika u igri 1:1/3:3 do 6:6, sa driblanjem golova i golmana; ME- samouvjerenost (Z.4/5) Trening 15. TA- ekipna napadačka taktika u igri 10:7 sa golmanima (promjena mjesta između saigrača); TE- situaciona tehnika; KO- specifična izdržljivost); ME- komunikacija (Z.2/3) Druga sedmica (mikrociklus 2) Trening 16. TE- primanje lopte grudima i udarac volej na gol; KO- koordinacija i pokretljivost; TA- igra rukomet- fudbal; ME- socijalizacija (Z.2). Trening 17. KO-specifična izdržljivost; TE- dodavanje i primanje uz pritisak; TA- grupna taktika, brza transformacija u igri 4+1:4+1 sa golmanima; ME- odgovornost i takmičarski duh (Z.3/4) Trening 18. TA- specifična ekipna taktika u napadu (građenje igre od pozadi) u igri 10:6/10:8 sa golmanima i driblanjem golova; TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne-anaerobne izdržljivosti; ME- saradnja i komunikacija (Z.2/3) Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 19. TE- tehnika centaršuta lopte; KO- pokretljivost i aerobna izdržljivost; TA- igra 4:4 sa pomoćnim igračima sa bočne strane (gol samo nakon centaršuta lopte); ME- koncentracija (Z.2) Trening 20. KO- brzina i agilnost; TE- finta sa i bez lopte sa protivnikom iza leđa; TA- specifična taktika u fazi odbrane i napada u igri 1:1+2 do 2:2 +4; ME-motivacija za takmičenje (Z.4/5) Trening 21. TA- odbrana “orijentacija na loptu” (kretanje u odnosu na loptu, gol i protivnika); TE- oduzimanje lopte; KO- specifične aerobne -anaerobne izdržljivosti); ME- timski rad (Z.2/3). Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 22. TE- tehnika udarca bez zaustavljanja lopte; KO-fleksibilnost; TA- igra 6:6 sa pomoćnim saigračima i golmanima; ME- interakcija između igrača (Z.2) Trening 23. KO- brzinska snaga; TE- precizno dugačko dodavanje lopte; TA- napadačka grupna taktika uz vertikalnu igru (dodavanje lopte po dubini) u igri 4+2:4+2 i golmanima; ME- koncentracija (Z.3/4) Trening 24. TA- specifična ekipna taktika u odbrani (uz organizaciju “blok”) i napadu (dodavanje po dubini” u igri 9:7 sa zonama, driblanjem golova i golmanima; TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne -anaerobne izdržljivosti; ME- ekipna odgovornost (Z.3) Prva sedmica (mikrociklus 1) Trening 25. TE- udarac lopte glavom; KO- pokretljivost; TA- napad sa bočne strane (dolazak saigrača iza leđa, centaršut i finalizacija akcije udarcem lopte glavom na gol; ME- interakcija između igrača (Z.2) Trening 26. KO- aerobne-anaerobne izdržljivost;

TE- kontrolisanje lopte uz pritisak; TA- specifična grupna taktika, brza transformacija u igri 4+2:4+2 i golmani; ME- želja za igrom (Z.4/5) Trening 27. TA- grupna taktika u napadu u igri 8:7, napad sa pozicionim kombinovanjem između saigrača; TE- situaciono brzo kontrolisanje lopte (dodavanje i udarac na gol); KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivost); ME- timski rad (Z.3) Druga sedmica (mikrociklus 2) Trening 28. TE- koordinacija i tehnika udarca lopte; KO- pokretljivost i aerobna izdržljivost; TA- emocionalne i kognitivne igre (4+4:4+4) sa golmanima (priznanje gola samo iz prve); ME- koncentracija i zadovoljstvo (Z.1/2) Trening 29. KO- eksplozivna snaga; TE- driblanje-finte udarac na gol; TA- individualna i grupna taktika u igri 1:1/2:2 do 4:4 sa golmanima; ME- samopouzdanje (Z.4) Trening 30. TA- bazična ekipna taktika (10:10 sa golmanima), "igra-korekcija-igra" TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne -anaerobne izdržljivosti; ME- odgovornost (Z.2/3) Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 31. TE- tehnika kontrolisanja vazdušne lopte; KO- koordinacija sa loptom; TA- grupna taktika u napadu (centaršut i finalizacija udarcem u gol); ME- koncentracija (Z.2) Trening 32. KO- brza koordinacija; TE- dodavanje i primanje lopte uz pritisak; TA- specifična grupna taktika u odbrani i napadu u igri 6+2:6+2 sa i golmanima; ME- timski rad (Z.3/4) Trening 33. TA- ekipna taktika, pozicioni napad (igra 10:7); TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne -anaerobne izdržljivosti; ME- fizička i psihička transformacija (Z.3) Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 34. TE- koordinacija lopta - igrač; KO- vježbe snage i stabilnosti; TA- specifična grupna taktika – kognitivne igre sa pomoćnim igračima i golmanima; ME- koncentracija (Z.2) Trening 35. KO- brzina i agilnost; TE- dodavanje – primanje i driblanje uz pritisak; TA- individualna i grupna taktika u igri 1:1/2:2 sa protivnikom iza leđa; ME- koncentracija (Z.4) Trening 36. TA- ekipna taktika u odbrani (blok) i napadu (brza cirkulacija lopte) sa vertikalnim dolaženjem suigrača u igru 10:7+3 i golmanima; TE- situaciona tehnika; KO- specifične aerobne - anaerobne izdržljivosti; ME-timski rad i želja za pobjedom (Z.2/3) Prva sedmica (mikrociklus 1) Trening 37. TE- primanje lopte koja padne na tlo sa promjenom pravca i udarac na gol; KO- pokretljivost, snaga i stabilnost; TA- specifična individualna taktika; ME- koncentracija (Z.2) Trening 38. KO- specifične anaerobne-aerobne izdržljivosti; TE- kontrolisanje lopte uz pritisak; TA- grupna taktika u odbrani i napadu (vertikalna igra i brza transformacija) u igri 4+2:4+2 u dvije zone i golmani; ME- timska pozitivna agresivnost (Z.4/5) Trening 39. TA- bazična ekipna taktika napada, poziciona kombinacija igre, 10:8 sa golmanima i driblanjem golova; TE- situaciono brže kontrolisanje lopte; KO- specifične aerobne -anaerobne izdržljivosti; ME- timski rad (Z.2/3) Druga sedmica (mikrociklus 2) Trening 40. TE- dodavanje i primanje lopte u pokretu; KO- aerobna izdržljivost; TA- kognitivne i emocionalne igre; ME- relaksacija i zadovoljstvo (Z.2/3) Trening 41. KO- brzina, koordinacija i tehnika; TE- situaciono dodavanje i primanje lopte uz pritisak; TA- grupna napadačka taktika, igra sa drugim redom-linije; ME- mobilizacija i saradnja (Z.3/4) Trening 42. TA- grupna specifična taktika u odbrani i napadu u igri 7:6 sa driblanjem golova i golmanima; TE- kontrolisanje lopte uz pritisak; KO- specifična aerobna -anaerobna izdržljivost; ME- komunikacija i timski rad (Z.3) Treća sedmica (mikrociklus 3) Trening 43. TE- kontrolisanje lopte u vazduhu u igri "tenis fudbal"; KO- pokretljivost i aerobna izdržljivost; TA- taktičke vježbe, odbijanje od gola i udarac na gol; ME- koncentracija (Z.1/2) Trening 44. KO- koordinacija i eksplozivna snaga; TE- driblanje i udarac lopte uz pritisak; TA- individualna i grupna taktika napada u igri 1:1 do 4:4 sa pomoćnim igračima, driblanjem golova i golmanima; ME- želja za takmičenjem (Z.4) Trening 45. TA- ekipna taktika (igra 10:10) vježbanje pozicione igre u sistemu 4:3:3; TE- situaciona tehnika; KO- specifična aerobna -anaerobna izdržljivost; ME- timske akcije (Z.2/3) Četvrta sedmica (mikrociklus 4) Trening 46. TE- kontrolisanje vazdušne lopte u pokretu (dodavanje - primanje i udarac lopte u gol); KO- koordinacija i pokretljivost; TA- taktičke napadačke kompleksne vježbe (dijagonalno dodavanje, primanje i udarac lopte na gol); ME- koncentracija (Z.2) Trening 47. KO- brzina-agilnost i tehnika; TE- brzo kontrolisanje lopte uz pritisak; TA- taktička grupna taktika u odbrani i napadu "brza transformacija" u igri 7:7 sa 2 zone i golmanima; ME- koncentracija, odgovornost i fer-plej (Z.3/4). Trening 48. TA- bazična ekipna taktika u napadu i odbrani uz pozicione igre 10:10 i

gipkosti na antropološki status mladih fudbalera Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera Tabela 117. Takmičarski period (septembar), sadržaj programa treninga za kategoriju pioniri Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera Tabela 118. Takmičarski period (oktobar) sadržaj programa treninga za kategoriju pioniri Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera Tabela 119. Takmičarski period (novembar), sadržaj programa treninga za kategoriju pioniri Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera Tabela 122. Takmičarski period (septembar), sadržaj programa treninga za kategoriju kadeti Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera Tabela 123. Takmičarski period (oktobar), sadržaj programa treninga za kategoriju kadeti Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera Tabela 124. Takmičarski period (novembar), sadržaj programa treninga za kategorija kadeti Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

sources:

- 1 1,807 words / 4% - Internet from 24-May-2019 12:00AM
www.siz-au.com
- 2 305 words / 1% - Internet from 24-May-2019 12:00AM
www.siz-au.com
- 3 295 words / 1% - Internet from 24-Sep-2015 12:00AM
Pebookers.fi
- 4 251 words / 1% - Internet from 08-Feb-2019 12:00AM
fedora.ucg.ac.me
- 5 212 words / 1% - Internet from 23-Aug-2011 12:00AM
www.pzsport.rs
- 6 199 words / < 1% match - Internet from 02-Nov-2017 12:00AM
fedorabg.bg.ac.rs
- 7 173 words / < 1% match - Internet from 07-Jun-2016 12:00AM
sportstudiobl.org
- 8 132 words / < 1% match - Internet from 21-May-2015 12:00AM
magister.uns.ac.rs

-
- 9 116 words / < 1% match - Internet from 31-Jan-2019 12:00AM
fsfvconference.rs
-
- 10 98 words / < 1% match - Crossref
[Atanaskovic, Andrija, and Martin Georgiev. "10.5937/timsact8-5942 = Effect of programmed strength training on explosive strength of lower extremities in children aged 11 to 14 years", TMS Acta, 2014.](#)
-
- 11 92 words / < 1% match - Internet from 12-Nov-2015 12:00AM
senta-zentasport.rs
-
- 12 85 words / < 1% match - Internet from 31-Dec-2014 12:00AM
www.siz-au.com
-
- 13 83 words / < 1% match - Internet from 12-Sep-2014 12:00AM
ffvis.rs.ba
-
- 14 80 words / < 1% match - Internet from 10-Jun-2019 12:00AM
www.sportmont.ucg.ac.me
-
- 15 73 words / < 1% match - Internet from 28-Sep-2016 12:00AM
www.scribd.com
-
- 16 71 words / < 1% match - Internet from 24-May-2019 12:00AM
www.siz-au.com
-
- 17 55 words / < 1% match - Internet from 04-Jul-2018 12:00AM
www.fsfvconference.rs
-
- 18 54 words / < 1% match - Internet from 03-Jun-2015 12:00AM
sportizdravlje.rs.ba
-
- 19 48 words / < 1% match - Internet from 11-Nov-2015 12:00AM
www.readbag.com
-
- 20 43 words / < 1% match - Internet from 16-Aug-2018 12:00AM
nf.unmo.ba
-
- 21 30 words / < 1% match - Crossref
[Javorac, Dejan, Miroslav Smajic, Slavko Molnar, Aleksandar Barasic-Huba, Bogdan Tomic, Mihajlo Stracenski, and Sasa Markovic. "Differences in morphological characteristics between of football pioneer and elementary school pupils", Glasnik Antropoloskog drustva Srbije, 2015.](#)
-
- 22 28 words / < 1% match - Internet from 07-Mar-2016 12:00AM
www.ucg.ac.me
-

- 23 27 words / < 1% match - Internet from 13-Feb-2017 12:00AM
www.fsnk.ucg.ac.me
-
- 24 25 words / < 1% match - Internet from 24-May-2019 12:00AM
www.siz-au.com
-
- 25 24 words / < 1% match - Internet from 13-Oct-2013 12:00AM
www.pzsport.rs
-
- 26 21 words / < 1% match - Internet from 27-Feb-2014 12:00AM
siz-au.com
-
- 27 21 words / < 1% match - Internet from 16-Nov-2016 12:00AM
uvidok.rcub.bg.ac.rs
-
- 28 20 words / < 1% match - Internet from 11-Jan-2019 12:00AM
inssed.com
-
- 29 18 words / < 1% match - Internet from 24-May-2019 12:00AM
www.siz-au.com
-
- 30 17 words / < 1% match - Internet from 21-Mar-2014 12:00AM
cbcg.me
-
- 31 17 words / < 1% match - Internet from 22-Oct-2014 12:00AM
www.streetvolleyball.subotica.net
-
- 32 16 words / < 1% match - Internet from 22-Jun-2017 12:00AM
old.fsnk.ucg.ac.me
-
- 33 16 words / < 1% match - Crossref
[Stojanovic, Darko, Milos Nikolic, Milorad Jerkan, Dragan Peric, and Proko Dragosavljevic. "The increase of morphological measures of girls measured in 2012 and 2014", Glasnik Antropoloskog drustva Srbije, 2014.](#)
-
- 34 15 words / < 1% match - Internet from 18-Dec-2018 12:00AM
educons.edu.rs
-
- 35 15 words / < 1% match - Crossref
[Ante Kamenjaš, Donata Vidaković Samaržija. "Prevalencija i povezanost razine tjelesne aktivnosti i kardiorespiratornog fitnesa kod djece rane školske dobi", Magistra ladertina, 2017](#)
-
- 36 14 words / < 1% match - Internet from 17-Aug-2017 12:00AM
documents.mx
-
- 37 13 words / < 1% match - Internet from 16-Jul-2015 12:00AM

sportizdravlje.rs.ba

38 13 words / < 1% match - Internet from 24-May-2019 12:00AM
www.siz-au.com

39 13 words / < 1% match - Internet from 06-Aug-2018 12:00AM
www.ucg.ac.me

40 13 words / < 1% match - Internet from 04-Oct-2018 12:00AM
conference.vss.edu.rs

41 13 words / < 1% match - Internet from 08-Jan-2016 12:00AM
sportizdravlje.rs.ba

42 12 words / < 1% match - Internet from 08-Jan-2016 12:00AM
sportizdravlje.rs.ba

43 12 words / < 1% match - Internet from 16-Aug-2018 12:00AM
nf.unmo.ba

44 12 words / < 1% match - Internet from 25-May-2016 12:00AM
fes.ba

45 12 words / < 1% match - Internet from 20-Mar-2015 12:00AM
www.infoteh.rs.ba

46 12 words / < 1% match - Internet from 25-Apr-2016 12:00AM
unimediterran.net

47 12 words / < 1% match - Internet from 06-May-2016 12:00AM
cris.uns.ac.rs

48 12 words / < 1% match - Crossref
[Tijana Stojanović, Katarina Herodek, Darko Stojanović. "Differences in body composition and motor abilities between synchronized swimmers and non-athlete girls", Glasnik Antropološkog društva Srbije, 2018](#)

49 11 words / < 1% match - Internet from 15-Jul-2016 12:00AM
readgur.com

50 11 words / < 1% match - Internet from 22-Sep-2017 12:00AM
www.fsfv.ni.ac.rs

51 11 words / < 1% match - Internet from 08-Mar-2011 12:00AM
www.hrks.hr

-
- 52 11 words / < 1% match - Internet from 03-Nov-2017 12:00AM
nardus.mpn.gov.rs
-
- 53 11 words / < 1% match - Internet from 10-May-2019 12:00AM
www.sportlogia.com
-
- 54 11 words / < 1% match - Internet from 31-Mar-2016 12:00AM
www.fsvconference.rs
-
- 55 11 words / < 1% match - Crossref
[Nevenka Zrnzevic, Jovana Zrnzevic. "Effects of teaching physical education on the morphological characteristics of male students of younger school", Glasnik Antropoloskog drustva Srbije, 2016](#)
-
- 56 11 words / < 1% match - Publications
0350-3828, 2004
-
- 57 10 words / < 1% match - Internet from 04-Jul-2018 12:00AM
www.fsvconference.rs
-
- 58 10 words / < 1% match - Internet from 26-Dec-2016 12:00AM
www.fsnk.ucg.ac.me
-
- 59 10 words / < 1% match - Internet from 09-Oct-2018 12:00AM
www.ucg.ac.me
-
- 60 10 words / < 1% match - Internet from 07-Mar-2016 12:00AM
www.ucg.ac.me
-
- 61 10 words / < 1% match - Internet from 18-Mar-2019 12:00AM
www.psihologjanis.rs
-
- 62 10 words / < 1% match - Internet from 10-Feb-2014 12:00AM
www.rckanjiza.edu.rs
-
- 63 10 words / < 1% match - Internet from 18-Feb-2019 12:00AM
www.jaspe.ac.me
-
- 64 10 words / < 1% match - Internet from 05-Mar-2012 12:00AM
jih.diva-portal.org
-
- 65 10 words / < 1% match - Internet from 21-Jun-2019 12:00AM
orbi.uliege.be
-
- 66 10 words / < 1% match - Internet from 06-Aug-2017 12:00AM
scindeks.ceon.rs

67

10 words / < 1% match - Internet from 08-Jul-2015 12:00AM
www.theses.fr
