

MAGNOLIOPHYTA

ANGIOSPERMAE

(skrivenosjemenjače)

PODJELA NA KLASE

Dikotiledone biljke (Cl. Magnoliopsida)

1. Dva kotiledona
2. Trajan primarni korijen
3. Stablo ima sposobnost sekundarnog debljanja
4. Listovi potpuni ili prosti, nervatura mrežasta
5. Cvjetovi pentamerni ili tetramerni


Monokotiledone biljke (Cl. Liliopsida)

1. Jedan kotiledona
2. Primarni korijen brzo odumire
3. Stablo nema sposobnost sekundarnog debljanja
4. Listovi prosti, nervatura paralelna
5. Cvjetovi trimerni

RAZLIKE IZMEĐU KLASA


Classis: *Magnoliopsida*

- Embrion sa **2 kotiledona**;
- Primarni korijen klice se razvija u **glavni korijen**;
- **Provodni snopići u stablu kružno raspoređeni** – moguće je razlikovati koru i srž;
- Drvenaste i zeljaste forme;
- Listovi uglavnom sa drškom, najčešće sa mrežastom, rjeđe lučnom ili paralelnom nervaturom;
- Cvjetovi 5-člani, rjeđe 4-člani.



Classis: *Liliopsida*

- Embrion sa **1 kotiledonom**;
- Prim. kor. klice brzo odumire i zamjenjuju ga adventivni;
- **Prov. snop. u stablu nepravilno raspoređeni** – nije moguće razlikovati koru i srž;
- Trajnice ili sekundarno drveće;
- Listovi uglavnom nerazdijeljeni na dršku i lisku, sa paralelnom nervaturom, rijetko lučnom;
- Cvjetovi 3-člani, nekad 5-člani.



Fam. *Magnoliaceae*

Magnolia grandiflora



plod

krupni cvjetovi sa jednostavnim perijantom

Fam. Magnoliaceae



8 mješaka sa po 1 sjemenom



***Illicium verum* – zvjezdasti anis**

Jugozapadna Kina; začin na Dalekom istoku



Laurus nobilis – lovor

idioblasti sa etarskim uljima i alkaloidima



P₆ A_∞ G₁, plod je bobica

Fam. *Lauraceae*

Cinnamomum camphora – kamforovo drvo



Fam. Lauraceae

Cinnamomum zeylanicum, C. loureirii – cimet



Jugoistočna Azija




Fam. *Lauraceae*

Persea americana – avokado

1-sjemena
bobica



Fam. Lauraceae



Fam. Piperaceae

Plod koštunica, kao začin još od antičkih vremena



Piper nigrum – biber

Cvjetovi u resama (oko 50), listovi kožasti sa brojnim žljezdama.

Fam. *Aristolochiaceae*



Plod čaura; 12 prašnika, tučak sa 6-režnjavitim žigom.



***Asarum europaeum* – kopitnjak**

Fam. *Aristolochiaceae*

Plod čaura; 6 sraslih prašnika, tučak sa 6 žigova.



***Aristolochia clematitis* – vučja jabuka**

Berberis vulgaris – šimširika


K₆ C₆ A₆ – u grozdovima; bobica

Fam. *Berberidaceae*

Fam. *Nymphaeaceae*



Nymphaea alba
bijeli lokvanj



Nuphar luteum
žuti lokvanj

- Višegodišnje zeljaste biljke sa snažno razvijenim rizomom i plivajućim listovima (floatantne) na dugim drškama i srcoliko urezani;
- Cvjetovi ♀, aktinomorfni; latice su staminodije (sterilni prašnici);
- K i C (uglavnom) 4-5, plodnica nadrasla, plod nalik na bobicu.

Fam. *Ranunculaceae*

Habitus: zeljaste biljke, znatan broj vrsta ima alkaloid; rijetko puzavice;

Listovi: naizmjenično postavljeni, na različite načine dijeljeni, rijetko cjeloviti; obično bez zalistaka;

Perijant: obično homohlamidan, listići pršljenasto raspoređeni na cvjetnoj loži, najčešće aktinomorfan;

Andreceum: veliki broj prašnika koji su slobodni i spiralno raspoređeni;

Gineceum: apokarpan, od većeg broja tučkova;

Plod: miješak ili orašica;

Neke vrste otrovne: *Aconitum* sp., *Helleborus* sp.

$*K_5 C_{10-20} A_\infty$ – pojedinačni; plod – dlakava orašica



Adonis vernalis – gorocvjet



* $K_3 C_{\geq 8}$ – pojedinačni; orašica

***Ranunculus ficaria* – ledinjak**



Ranunculus acer – ljutić



Helleborus odorus – kukurijek

5 listića cvijetnog omotača, oblika široko jajastog, preklapaju se, prijatnog mirisa; listići C (oko 10) preobraženi u nektarije, A_{∞} , G_{3-6} ; koriste se rizom i korijen; otrovna!



zigomorfni cvjetovi




miješak



ostruga

Consolida regalis – kokotac

Aconitum pentheri – jedić



listovi naspramni, cvjetovi 4-člani, penjačica

***Clematis vitalba* – pavit**

Fam. *Papaveraceae*

Habitus: zeljaste sa mlijekočnim sokom koji je bogat alkaloidima,

Listovi: naizmjenični, urezeni; na drškama različite dužine ili sjedeći,

Cvjetovi: pojedinačni ili u štitovima,

Perijant: 2 čašična listića (lako otpadaju), 2+2 krunična,

Krunica: listići slobodni, aktinomorfna, rijeđe zigomorfna,

Andreceum: veliki broj prašnika,

Gineceum: 2 ili više karpela, sinkarpan,

Plod: čaura (otvara se porama – kod makova),

Korištenje: ekstrakcija alkaloida morfin, papaverin.

Papaver rhoeas
bulka



Papaver somniferum
opijumski mak



Svi djelovi biljke sadrže žuti otrovni sok.



***Chelidonium majus* – rusa**

čaura oblika mahune