

Izračunate srednje vrijednosti

GEOMETRIJSKA I HARMONIJSKA SREDINA

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Geometrijska sredina je srednja vrijednost koja ne izravnava apsolutne razlike već proporcionalne promjene između podataka date serije.

Ona se dobija iz proizvoda a ne iz zbira tih podataka.

Izračunava se tako što se vrijednosti obilježja pomnože, a zatim se izvadi korjen iz dobijenog proizvoda čiji je izložilac (eksponent) jednak broju posmatranih jedinica obilježja.

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina
za negrupisane podatke

$$G = \sqrt[n]{X_1 \times X_2 \times X_3 \dots \times X_n}$$

$$G = \sqrt[n]{\prod X_i}$$

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Zbog činjenice da se geometrijska sredina dobija iz proizvoda vrijednosti obilježja njeno izračunavanje **nije moguće** ako je neka vrijednost serije **jednaka 0, ili je manja od 0**; njeno izračunavanje ima smisla samo kada su **vrijednosti obilježja veće od 0**.

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina
za grupisane podatke

$$\log G = \frac{\log X_1 + \log X_2 + \dots + \log X_n}{N}$$

$$G = \sqrt[N]{\log G}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ponderisana} \\ \text{geometrijska} \\ \text{sredina} \end{array} \right\} G = \sqrt[\sum f]{x_1^{f_1} * x_2^{f_2} * \dots * x_n^{f_n}}$$

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

$$\log G = \frac{f_1 \log x_1 + f_2 \log x_2 + \dots + f_n \log x_n}{\sum f}$$

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Karakteristike:

- Geometrijska sredina je manja od aritmetičke sredine (izuzev kada su svi podaci serije međusobno jednaki).

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Karakteristike:

- Geometrijska sredina veća je od najmanje i manja od najveće vrijednosti u posmatranoj seriji. $x_1 < G < x_k$

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Karakteristike:

$$x_1 = x_2 = \dots = x_k \Rightarrow x_1 = G$$

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Karakteristike:

$$\frac{G}{x_1} \times \frac{G}{x_2} \dots \frac{G}{x_i} = \frac{x_{i+1}}{G} \times \frac{x_{i+2}}{G} \dots \frac{x_N}{G}$$

$$x_i < G < x_{i+1}$$

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Geometrijska sredina se koristi za :

- Izračunavanje stope rasta na osnovu lančanih indeksa (srednji tempo rasta vremenskih serija na osnovu lančanih indeksa)
- Procjenu brojnog stanja stanovništva između dva popisa

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Geometrijska stopa rasta

$$r_g = \left(\sqrt[N-1]{\frac{Y_n}{Y_1}} - 1 \right) \times 100$$

Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Godišnja stopa rasta stanovništva izražena u promilima

$$P_n = P_0(1+r)^Y$$

Srednje vrijednosti – Harmonijska sredina

Harmonijska sredina je recipročna vrijednost aritmetičke sredine recipročnih vrijednosti obilježja.

Slično kao i kod aritmetičke sredine i kod harmonijske sredine postoji:

- Prosta harmonijska sredina
- Ponderisana harmonijska sredina

Srednje vrijednosti – Harmonijska sredina

$$H = \frac{N}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} = \frac{N}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

Srednje vrijednosti – Harmonijska sredina

$$H = \frac{N}{\frac{f_1}{x_1} + \frac{f_2}{x_2} + \dots + \frac{f_k}{x_k}} = \frac{N}{\sum_{i=1}^k \frac{f_i}{x_i}}$$

Srednje vrijednosti – Harmonijska sredina

Harmonijska sredina ima smisla tražiti samo za ona obilježja čije su sve vrijednosti **različite od 0**.

Koristi se za izračunavanje srednjeg indeksa i u slučajevima kada su obilježja statističkih jedinica izražena u obliku tzv. recipročnih pokazatelja.

Npr. Vrijeme utrošeno za proizvodnju jedinice proizvoda je recipročna vrijednost produktivnosti.

Kod serije čiji podaci pokazuju recipročne odnose, ali njihove frekvencije nijesu iste, koristi se ponderisana harmonijska sredina.