

## Izračunate srednje vrijednosti

### GEOMETRIJSKA I HARMONIJSKA SREDINA

#### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

**Geometrijska sredina** je srednja vrijednost koja ne izravnava apsolutne razlike već proporcionalne promjene između podataka date serije.

Ona se dobija iz proizvoda a ne iz zbiru tih podataka.

Izračunava se tako što se vrijednosti obilježja pomnože, a zatim se izvadi korjen iz dobijenog proizvoda čiji je izložilac (eksponent) jednak broju posmatranih jedinica obilježja.

#### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina za negrupisane podatke

$$G = \sqrt[n]{X_1 \times X_2 \times X_3 \dots \times X_n}$$

$$G = \sqrt[N]{\prod X_i}$$

#### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Zbog činjenice da se geometrijska sredina dobija iz proizvoda vrijednosti obilježja njeno izračunavanje **nije moguće** ako je neka vrijednost serije **jednaka 0, ili je manja od 0**; njeni izračunavanje ima smisla samo kada su **vrijednosti obilježja veće od 0**.

#### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina za grupisane podatke

$$\log G = \frac{\log X_1 + \log X_2 + \dots + \log X_n}{N}$$

$$G = (\text{antilogaritam } G) = 10^{\log G}$$

$$\begin{cases} \text{ponderisana} \\ \text{geometrijska} \\ \text{sredina} \end{cases} G = \sqrt[f]{x_1^{f_1} * x_2^{f_2} * \dots * x_n^{f_n}}$$

#### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

$$\log G = \frac{f_1 \log x_1 + f_2 \log x_2 + \dots + f_n \log x_n}{\sum f}$$

### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Karakteristike:

- Geometrijska sredina je manja od aritmetičke sredine (izuzev kada su svi podaci serije međusobno jednaki).

### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Karakteristike:

- Geometrijska sredina veća je od najmanje i manja od najveće vrijednosti u posmatranoj seriji.  $x_1 < G < x_k$

### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Karakteristike:

$$x_1 = x_2 = \dots = x_k = G$$

### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Karakteristike:

$$\frac{G}{x_1} \times \frac{G}{x_2} \times \dots \times \frac{G}{x_i} = \frac{x_{i+1}}{G} \times \frac{x_{i+2}}{G} \times \dots \times \frac{x_N}{G}$$

$$x_i < G < x_{i+1}$$

### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Geometrijska sredina se koristi za :

- Izračunavanje stope rasta na osnovu lančanih indeksa (srednji tempo rasta vremenskih serija na osnovu lančanih indeksa)
- Procjenu brojnog stanja stanovništva između dva popisa

### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Geometrijska stopa rasta

$$r_g = \left( \sqrt[N-1]{\frac{Y_n}{Y_1}} - 1 \right) \times 100$$

### Srednje vrijednosti – geometrijska sredina

Godišnja stopa rasta stanovništva izražena u promilima

$$P_n = P_0(1+r)^t$$

### Srednje vrijednosti – Harmonijska sredina

**Harmonijska sredina** je recipročna vrijednost aritmetičke sredine recipročnih vrijednosti obilježja.

Slično kao i kod aritmetičke sredine i kod harmonijske sredine postoje:

- Prosta harmonijska sredina
- Ponderisana harmonijska sredina

### Srednje vrijednosti – Harmonijska sredina

$$H = \frac{N}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} = \frac{N}{\sum_{i=1}^k \frac{1}{x_i}}$$

### Srednje vrijednosti – Harmonijska sredina

$$H = \frac{N}{\frac{f_1}{x_1} + \frac{f_2}{x_2} + \dots + \frac{f_k}{x_k}} = \frac{N}{\sum_{i=1}^k \frac{f_i}{x_i}}$$

### Srednje vrijednosti – Harmonijska sredina

Harmonijska sredina ima smisla tražiti samo za ona obilježja čije su sve vrijednosti različite od 0.

Koristi se za izračunavanje srednjeg indeksa i u služajevima kada su obilježja statističkih jedinica izražena u obliku tzv. recipročnih pokazatelja.

Npr. Vrijeme utrošeno za proizvodnju jedinice proizvoda je recipročna vrijednost produktivnosti.

Kod serije čiji podaci pokazuju recipročne odnose, ali nihove frekvencije nijesu iste, koristi se ponderisana harmonijska sredina.