

Poslovna statistika

Priprema za kolokvijum

Od navedenih obilježja, zaokruži ona koja su atributivna:

- Pol,
- Visina,
- Porodice po broju studenta, djece,
- Broj saobraćajnih udesa,
- Potrošnja turiste,
- Prosječna ocjena
- Bračno stanje,
- Mjesto / destinacija boravka.

Harmonijsku sredinu ima smisla tražiti za sva obilježja, pa i ona čija je vrijednost 0.

Navedeno je:

- Tačno
- Netačno
- Niti tačno niti netačno

Godine starosti 5 zaposlenih u restoranu brze hrane su: 19 22 17 17 23. Odrediti geometrijsku sredinu!

$$G = \sqrt[5]{19 \cdot 22 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 23}$$

$$G = \sqrt[5]{2778446}$$

$$G = 19.44$$

Šta se desilo sa cijenom u 2007-oj i koliko ona iznosi, ako je 2005. bila na nivou od 5,6 eura, a index cijena iznosi 117 (2005=100)?

- 6,43
- 15,54
- 5,71
- 6,55

$$I_i = \frac{y_i}{y_o} 100 \Rightarrow 117 = \frac{y_i}{5.6} 100$$

$$\Rightarrow y_i = 117 \frac{5.6}{100} \Rightarrow y_i = 6.55$$

• Statistička obilježja se dijele u sledeće grupe: (zaokruži tačno)

- Ponderisana
- Atributivna
- Racionalna
- Pojmovna
- Vremenska
- Numerička
- Geografska ili prostorna
- Apsolutna

• U absolutne brojeve spadaju: (zaokruži **TAČNO**)

- Strukturni brojevi ◦ Odnosni brojevi
- Osnovni brojevi ◦ Indeksni brojevi
- Relativni brojevi ◦ Izvedeni brojevi

Na osnovu postojećih podataka, izračunati vrijednosti absolutnih frekvencija i nedostajuće relativne frekvencije.

x	f	p
0.5		0.18
1.5		0.22
2.5		0.28
3.5		
4.5		0.19
Ukupno:	189	

x	f	p
0.5		0.18
1.5		0.22
2.5		0.28
3.5		
4.5		0.19
Ukupno:	189	

$$p = \frac{f}{\sum f_i} \Rightarrow f = p \cdot \sum f_i$$

x	f	p
0.5	34	0.18
1.5	42	0.22
2.5	53	0.28
3.5		
4.5	36	0.19
Ukupno:	189	

$$p = \frac{f}{\sum f_i} \Rightarrow f = p \cdot \sum f_i$$

x	f	p
0.5	34	0.18
1.5	42	0.22
2.5	53	0.28
3.5	24	
4.5	36	0.19
Ukupno:	189	

$$p = \frac{f}{\sum f_i} \Rightarrow f = p \cdot \sum f_i$$

x	f	p
0.5	34	0.18
1.5	42	0.22
2.5	53	0.28
3.5	24	0.13
4.5	36	0.19
Ukupno:	189	

$$p = \frac{f}{\sum f_i} \Rightarrow f = p \cdot \sum f_i$$

• S obzirom na obuhvat statističke mase razlikuju se: (zaokruži netačno)

- Jednokratna i iscrpna statistička promatranja;
- Iscrpna i reprezentativna statistička promatranja;
- Jednokratna i reprezentativna statistička promatranja;
- Reprezentativna i dugoročna statistička promatranja;

• S obzirom na obuhvat statističke mase razlikuju se: (zaokruži netačno)

- Jednokratna i iscrpna statistička promatranja;
- Iscrpna i reprezentativna statistička promatranja;
- Jednokratna i reprezentativna statistička promatranja;
- Reprezentativna i dugoročna statistička promatranja;

Cijena robe »A« bila je 203 eura, a nakon smanjenja od 43,21% ona iznosi:

- 101,67
- 205,2
- 0,52
- 115.2837

$$G = 203 - 43,21\% \cdot 203$$

$$G = 203 - 87,7163 = 115,2837$$

Grupisanje jedinica mora biti iscrpno, a to znači

Ako se statističkim promatranjem obuhvate sve jedinice statističke mase koja je predmet statističkog ispitivanja, takvo se promatranje naziva iscrpno.

• Dati su podaci o proizvodnji cementa u periodu 1991-1995. godina:

Izračunati lančane indekse? Izračunati bazne indekse (1992=100)? Odrediti srednji godišnji relativni rast (srednji tempo rasta) proizvodnje cementa u posmatranom periodu?

Godina	Proizvodnja u 000 t
1991	6820
1992	7530
1993	7810
1994	8220
1995	9290

Godina	Proizvodnja u 000 t	LANČANI INDEKSI	INDEKSI 1992=100
1991	6820		
1992	7530		
1993	7810		
1994	8220		
1995	9290		

Godina	Proizvodnja u 000 t	LANČANI INDEKSI	INDEKSI 1992=100
1991	6820	-	
1992	7530	110,41	
1993	7810	103,72	
1994	8220	105,25	
1995	9290	113,02	

Godina	Proizvodnja u 000 t	LANČANI INDEKSI	INDEKSI 1992=100
1991	6820	-	
1992	7530	110,41	
1993	7810	103,72	
1994	8220	105,25	
1995	9290	113,02	

Godina	Proizvodnja u 000 t	LANČANI INDEKSI	INDEKSI 1992=100
1991	6820	-	90,57
1992	7530	110,41	100,00
1993	7810	103,72	103,72
1994	8220	105,25	109,16
1995	9290	113,02	123,37

$r_g = \left(\sqrt[N-1]{\frac{Y_n}{Y_1}} - 1 \right) \times 100$
 $r_g = \left(\sqrt[4]{\frac{9290}{6820}} - 1 \right) \times 100$
 $r_g = 8,03$

• U jednom muzeju anketirani su posjetioci po godinama starosti:

Godine starosti	Broj posjetilaca
10 – 20	235
20 – 30	317
30 - 40	326
40 - 50	253
50 - 60	143
Σ	

a) Na osnovu dobijenih podataka odredite prosječan broj godina posjetioca i to primjenom metode transformacije obilježja.

b) Na osnovu dobijenih podataka odredite geometrijsku sredinu.

Godine starosti	Broj posjetilaca	X'	d=x-x0	fd
10 – 20	235			
20 – 30	317			
30 - 40	326			
40 - 50	253			
50 - 60	143			
Σ	1274			

Godine starosti	Broj posjetilaca	X'	d=x-x0	fd
10 – 20	235			
20 – 30	317			
30 - 40	326			
40 - 50	253			
50 - 60	143			
Σ	1274			

Godine starosti	Broj posjetilaca	X'	d=x-x0	fd
10 – 20	235	15		
20 – 30	317	25		
30 - 40	326	35		
40 - 50	253	45		
50 - 60	143	55		
Σ	1274			

Godine starosti	Broj posjetilaca	X'	d=x-x0	fd
10 – 20	235	15	-91	
20 – 30	317	25	-9	
30 - 40	326	35	0	
40 - 50	253	45	-73	
50 - 60	143	55	-183	
Σ	1274			

Godine starosti	Broj posjetilaca	X'	d=x-x0	fd
10 – 20	235	15	-91	-21385
20 – 30	317	25	-9	-2853
30 - 40	326	35	0	0
40 - 50	253	45	-73	-18469
50 - 60	143	55	-183	-26169
Σ	1274			-68876

$$c = \frac{\sum fd}{\sum f} = \frac{-68876}{1274} = -54,06 \quad \bar{X} = Xo + c = 326 - 54,06 = 271,94$$

Godine starosti	Broj posjetilaca	X'	logX	flogX
10 – 20	235	15		
20 – 30	317	25		
30 - 40	326	35		
40 - 50	253	45		
50 - 60	143	55		
Σ	1274			

Godine starosti	Broj posjetilaca	X'	logX	flogX
10 – 20	235	15	1,18	
20 – 30	317	25	1,40	
30 - 40	326	35	1,54	
40 - 50	253	45	1,65	
50 - 60	143	55	1,74	
Σ	1274			

Godine starosti	Broj posjetilaca	X'	logX	flogX
10 – 20	235	15	1,18	276,38
20 – 30	317	25	1,40	443,15
30 - 40	326	35	1,54	503,37
40 - 50	253	45	1,65	418,26
50 - 60	143	55	1,74	248,87
Σ	1274			1890,03

$$\log G = \frac{f_1 \log x_1 + f_2 \log x_2 + \dots + f_n \log x_n}{\sum f} = \frac{1890}{1274} = 1,4835$$

$$G = 10^{1,4835} = 30.45$$