

# **KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU**

predavanja 2017/18

## **ELEMENTI KOMBINATORIKE**

**1. Permutacije**

**2. Varijacije**

**3. Kombinacije**

Preuzeto od : Vera Čuljak: VJEROJATNOST I STATISTIKA,  
Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2011

**P1-pomocni materijal**

# PERMUTACIJE: uređena n-torka od svih raspoloživih elemenata skupa

## A. bez ponavljanja:

- *Neka skup  $S$  ima  $n$  različitih elemenata. Svaka uređena  $n$ -torka elemenata skupa  $S$  zove se **permutacija bez ponavljanja** skupa  $S$ . Ukupan broj permutacija je:*

$$P(n)=n!$$

- obrazloženje: (prvi element možemo izabrati na  $n$  načina, drugi možemo izabrati na  $(n - 1)$  načina, treći na  $(n - 2)$  načina itd
- Primjer: Koliko ima svih četvorocifrenih brojeva sastavljenih od cifara skupa  $S=\{1,2,3,4\}$  takvih da se cifre ne ponavljaju?
- Rješenje – permutacije bez ponavljanja:  $n!=4!=4*3*2*1=24$

# PERMUTACIJE: uređena n-torka od svih raspoloživih elemenata skupa

## B. sa ponavljanjem:

- Neka skup  $S$  ima  $n$  elemenata od kojih je  $n_1$  jedne vrste,  $n_2$  druge vrste,  $n_k$   $k$ -te vrste,  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ : Uređena  $n$ -torka elemenata skupa  $S$  zove se ***n*-člana permutacija s ponavljanjem**. Broj  $n$ -članih permutacija s ponavljanjem je:

$$P_{sa\ ponavljanjem}_n(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

- obrazloženje: Pretpostavimo da su svi elementi u permutaciji sa ponavljanjem različiti i da imamo permutaciju bez ponavljanja od  $n$  elemenata. Ukupan broj tih permutacija je  $n!$ . U permutaciji s ponavljanjem možemo zamijeniti mjesta na kojima su elementi prve vrste na  $n_1!$  načina i pri tom se permutacija neće promijeniti. Slično zaključujemo i za elemente druge, ...,  $k$ -te vrste. Za svaku permutaciju s ponavljanjem postoji  $n_1! n_2! \dots n_k!$  permutacija bez ponavljanja u kojima se ne mijenja poredak različitih elemenata skupa  $S$ . Mijenjajući poredak različitih elemenata dobili bismo ukupan broj permutacija bez ponavljanja od  $n$  elemenata.
- Primjer: Koliko ima svih četvorocifrenih brojeva sastavljenih od cifara skupa  $S = \{1, 2, 3\}$  ako je dozvoljeno da se cifra 1 ponovi 2 puta?
- Rješenje – permutacije sa ponavljanjem:

$$P_4(2, 1, 1) = \frac{4!}{2! 1! 1!} = \frac{24}{2} = 12$$

# VARIJACIJA: uređena r-torka od nekih raspoloživih elemenata skupa

## A. bez ponavljanja:

- Neka skup  $S$  ima  $n$  različitih elemenata. Uređena  $r$ -torka ( $r \leq n$ ) elemenata skupa  $S$  zove se **varijacija  $r$ -tog razreda od  $n$  elemenata**. Broj svih varijacija  $r$ -tog razreda od  $n$  elemenata je:

$$V_n^{(r)} = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

- obrazloženje: Prvi element možemo izabrati na  $n$  načina, drugi možemo izabrati na  $(n-1)$  načina, treći na  $(n-2)$  načina,  $r$ -ti na  $(n-r+1)$  način, odnosno to je jednako:

$$n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1) \left[ \frac{((n-r)(n-r-1) \dots 1)}{((n-r)(n-r-1) \dots 1)} \right] = n! / (n-r)!$$

- Primjer: Koliko ima svih trocifrenih brojeva sastavljenih od cifara skupa  $S = \{1, 2, 3, 4\}$  takvih da se cifre ne ponavljaju ?
- Rješenje – varijacije bez ponavljanja:  $n! / (n-r) = 4! / (4-3)! = 24$

# VARIJACIJA: uređena r-torka od nekih raspoloživih elemenata skupa

## **B. sa ponavljanjem:**

- *Neka skup  $S$  ima  $n$  različitih elemenata. Uređena  $r$ -torka elemenata  $n$ -članog skupa  $S$ , ali tako da se elementi mogu i ponavljati ( $r$  može biti i veće od  $n$ ) zove se **varijacija s ponavljanjem  $r$ -tog razreda od  $n$  elemenata**.*

$$\text{Vsa ponavljanjem } n_n^{(r)} = n^r$$

- obrazloženje: prvi element možemo izabrati na  $n$  načina, drugi možemo izabrati na  $n$  načina, treći na  $n$  načina, itd.,  $r$ -ti na  $n$  načina jer je dozvoljeno ponavljanje elemenata iz skupa  $S$ .
- Primjer: Koliko ima svih trocifrenih brojeva sastavljenih od cifara skupa  $S=\{1,2,3,4\}$  takvih da se cifre ponavljaju ?
- Rješenje – varijacije sa ponavljanjem:  $n^r=4^3=64$
- Primjer: Listić sportske prognoze ima 10 parova. Svaki par može dobiti oznaku 0, 1 ili 2 (poraz, neriješeno, pobjeda domaćina). Koliko listića treba ispuniti da bi sigurno jedan listić bio dobitni?
- Rješenje:  $S = \{0; 1; 2\}$ ;  $n = 3$ . Listić je varijacija s ponavljanjem  $r = 10$ -og razreda od  $n = 3$  elementa. Broj varijacija je  $3^{10}=59049$

# KOMBINACIJE: r-torka od nekih raspoloživih elemenata skupa (nije važan raspored)

## A. bez ponavljanja:

- Neka skup  $S$  ima  $n$  različitih elemenata. Svaki  $r$ -člani podskup ( $r \leq n$ ) (redosljed elemenata u skupu nije bitan)  $n$ -članog skupa  $S$  zove se **kombinacija  $r$ -tog razreda od  $n$  elemenata**. Broj svih kombinacija  $r$ -tog razreda je od  $n$  elemenata je

$$C_n^{(r)} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{V_n^{(r)}}{r!}$$

- obrazloženje: Budući da u  $r$ -članom skupu redosljed nije bitan onda broj uređenih  $r$ -torki od  $n$  elemenata moramo podijeliti s brojem permutacija  $r$ -članog skupa. Prvi element možemo izabrati na  $n$  načina, drugi možemo izabrati na  $(n-1)$  načina, treći na  $(n-2)$  načina,  $r$ -ti na  $(n-r+1)$  način.
- Primjer: Loto ima 39 brojeva. Izvlači se slučajno 7 brojeva. Koliko različitih listića s kombinacijama 7 brojeva treba ispuniti da se dobije sigurna sedmica?
- Rješenje:  $S = \{1; 2; 3; \dots; 39\}$ ,  $n = 39$ . Listić je kombinacija 7-og razreda ( $r = 7$ ) od 39 elemenata. Broj kombinacija je

$$\begin{aligned} C_{39}^{(7)} &= \binom{39}{7} = \frac{39!}{7!(39-7)!} = \frac{39!}{7!32!} = \frac{39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 \cdot 32!}{7! \cdot 32!} \\ &= \frac{39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33}{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 15380937 \end{aligned}$$

# KOMBINACIJE: r-torka od nekih raspoloživih elemenata skupa (nije važan raspored)

## B. sa ponavljanjem:

- Neka skup  $S$  ima  $n$  različitih elemenata. Svaki  $r$ -člani podskup  $n$ -članog skupa  $S$  gdje se elementi mogu i ponavljati (redoslijed elemenata u  $r$ -torci nije bitan) zove se **kombinacija s ponavljanjem  $r$ -tog razreda od  $n$  elemenata**. Broj svih kombinacija s ponavljanjem  $r$ -tog razreda od  $n$  elemenata je:

$$Csa\ ponavljanjem_n^{(r)} = \binom{n+r-1}{r} = \frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}$$

- Primjer: Iz kutije u kojoj je 6 kuglica različite boje izvlačimo tri kuglice jednu po jednu s vraćanjem. Koliko uzoraka možemo dobiti ako redoslijed nije važan?
- Rješenje: kombinacije sa ponavljanjem (redosled nije bitan, a izvlace se samo 3 kuglice koje se vraćaju svaki put posle izvlacenja)

$$Csa\ ponavljanjem_6^{(3)}$$

# PODSJEĆANJE

## BEZ PONAVLJANJA

broj permutacija od $n$ elemenata	$P(n) = n!$
broj varijacija $r$ -tog razreda od $n$ elemenata	$V_n^{(r)} = \frac{n!}{(n-r)!}$
broj kombinacija $r$ -tog razreda od $n$ elemenata	$C_n^{(r)} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

## S PONAVLJANJEM

br. permutacija s pon. od $n$ el.	$\bar{P}_n(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$
br. varijacija s pon. $r$ -tog raz. od $n$ el.	$\bar{V}_n^{(r)} = n^r$
br. kombinacija s pon. $r$ -tog raz. od $n$ el.	$\bar{C}_n^{(r)} = \binom{n+r-1}{r}$



# PODSJEĆANJE

IZBOR - s vraćanjem

IZBOR: r-čl. uzorka iz n-čl. skupa različitih elemenata	
nije važan poredak	$\overline{C}_n^{(r)}$
važan poredak	$\overline{V}_n^{(r)}$

IZBOR - bez vraćanja

IZBOR: r-čl. uzorka iz n-čl. skupa različitih elemenata	
nije važan poredak	$C_n^{(r)}$
važan poredak	$V_n^{(r)}$