

TABELA II
Zajednica *Cisto-Ericetum arboreae rosmarinetosum*

Broj snimke: (Nr. der Aufnahme:)	1	2
Karakteristične vrste asocijacija: (Charakterarten der Assoziation:)		
Erica arborea L.	3.3	3.2
Cistus salvifolius L.	3.2	3.2
Agrostis byzantina Boiss.	+.1	.
Karakteristične vrste sveze Cisto-Ericion i reda Cisto-Ericetalia (uključivši i transgresivne karakteristične vrste asocijacija iste sveze): (Verbands- und Ordnungs-Charakterarten:)		
Rosmarinus officinalis L.	3.3	3.2
Cistus villosus L. ssp. villosus	2.2	3.2
Avenastrum convolutum (Presl) Fritsch	1.1	2.2
Juniperus oxycedrus L.	+.1	1.2
Dorycnium hirsutum (L.) Sér. var. italicum (Jord. et Fourr.) A. et G.	+.1	.2
Fumana ericoides (Cavan.) Pau	+.1	.1
(Pinus halepensis Mill. saden)		
Karakteristične vrste razreda Quercetea ilicis (uključivši i transgresivne karakteristične vrste zajednica reda Quercetalia ilicis): (Klassen-Charakterarten:)		
Myrtus communis L.	2.2	.2
Arbutus unedo L.	1.2	.1
Lonicera implexa Ait.	1.1	.1
Quercus ilex L.	+.1	.1
Viburnum tinus L.	+.1	.1
Smilax aspera L.	+.1	.1
Pistacia lentiscus L.	.2	.
Rubia peregrina L.	.	.1
Pratilice: (Begleiter:)		
Schoenus nigricans L.	3.2	2.2
Mahovine (Bryophyta) coll.	3.2	2.2
Inula hirta L.	2.1	1.1
Sesleria autumnalis (Scop.) Schultz	+.1	.1
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. coll.	+.1	.1
Carex glauca Murr. var. cuspidata (Host) A. et G.	+.1	.1
Satureia montana L.	+.1	.1
Astragalus vegliensis Sadl.	+.1	.1
Inula spiraeifolia L. f. simplex Rohl.	.2	.
Coronilla emeroides Boiss. et Sprun.	+.1	.
Tanacetum cinerariaefolium (Vis.) Schultz.-Bip.	+.1	.
Linum tenuifolium L.	+.1	.
Scleropoa rigida (L.) Gris.	+.1	.
Centaurium umbellatum Gilib.	+.1	.
Hieracium florentinum All. coll.	+.1	.
Carex halleriana Asso	.2	.
Helichrysum italicum G. Don	.	.1
Sanguisorba muricata (Spach) Greml.	.	.1
Teucrium montanum L.	.	.1
Plantago holosteum Scop. ssp. holosteum	.	.1
Bromus erectus Huds. coll.	.	.1