

Virtuelni obilazak šume hrasta  
trojanca na Gorici, upoznavanje  
florističkog sastava i strukture



Quercetum trojanae, ranoproljećni aspekt



Quercetum trojanae, kasniji proljećni ili ljetnji aspekt



Sprat žbunastih i zeljastih biljaka



Sprat željastih biljaka - dominacija kostrike



O kojem aspektu je riječ?

**Asocijacija: Quercetum trojanæ**sveza: *Carpinion orientalis*red: *Quercetalia pubescenti-petraeae*klasa: *Quercetea pubescentis*

Redni broj snimka: 1

Autor: D.S.

Datum: 03\_04\_2018 (ocjena 1); 18\_05\_2018 (ocjena 2)

Lokalitet: Podgorica, brdo Gorica

GPS: 42° 26' 56" E19° 16' 36"

Nadmorska visina (m): 86

Ekspozicija: /

Nagib (°): /

Geološki supstrat: krečnjak

Tip zemljišta: crvenica

Površina snimka (m<sup>2</sup>): 200

Ukupna pokrovnost vegetacije (100%), sprat drveća (65%), sprat

grmlja (15%), zeljaste biljke (100%), mahovine 3%

Pokrovost zemljišta/stijena: 5% stijene

Vrsta	Ocjena 1	Ocjena 2
Sprat drveća	5%	(65%)
<i>Quercus trojana</i>	1	3
<i>Quercus pubescens</i>	1	3
Sprat žbunja	10%	15%
<i>Carpinus orientalis</i>	2	2
<i>Cornus mas</i>	+	+
<i>Cupressus semperfiriens</i>	+	+
<i>Fraxinus ornus</i>	+	+
<i>Paliurus spina-christi</i>	+	+
<i>Phillyrea media</i>	+	+
<i>Pinus halepensis</i>	+	+
<i>Rosa canina</i>	+	+

Sprat zeljastih biljaka	95%	100%
<i>Ruscus aculeatus</i>	4	4
<i>Asparagus acutifolius</i>	1	1
<i>Bellis perennis</i>	1	1
<i>Carex obliense</i>	1	1
<i>Carduus pycnocephalus</i>	1	1
<i>Cyclamen hederifolium</i>	1	.
<i>Geranium purpureum</i>	1	1
<i>Hedera helix</i>	1	1
<i>Lamium purpureum</i>	1	+
<i>Lonicera implexa</i>	1	1
<i>Oenanthe pimpinelloides</i>	1	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	1	1
<i>Quercus pubescens</i>	1	3
<i>Stipa bromoides</i>	1	2
<i>Anemone hortensis</i>	+	.
<i>Asphodelus microcarpus</i>	+	+
<i>Carex divulsa</i>	+	1
<i>Carpinus orientalis</i>	+	1
<i>Crataegus monogyna</i>	+	+
<i>Filipendula hexapetala</i>	+	+
<i>Galanthus reginae-olgae</i>	+	.
<i>Galium aparine</i>	+	+
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	+	1
<i>Pinus halepensis</i>	+	+
<i>Ranunculus neapolitanus</i>	+	+
<i>Rhagadiolus stellatus</i>	+	1
<i>Rumex pulcher</i>	+	+
<i>Scandix pecten-veneris</i>	+	+
<i>Stellaria media</i>	+	+
<i>Tamus communis</i>	+	1
<i>Vicia nigra</i>	+	+
<i>Viola odorata</i>	+	.

Sprat zeljastih biljaka	95%	100%
<i>Briza maxima</i>	.	+
<i>Bromus sterilis</i>	.	1
<i>Celtis australis</i>	.	+
<i>Clematis flammula</i>	.	+
<i>Clematis vitalba</i>	.	+
<i>Lactuca viminea</i>	.	+
<i>Platanthera bifolia</i>	.	+
<i>Poa sylvicola</i>	.	+
<i>Rosa canina</i>	.	r
<i>Vicia dasycarpa</i>	.	+

- Uporediti sastav i strukturu ranoproljenog i kasnijeg proljećnog aspekta flore zajednice hrasta trojanca na Gorici.
- Opisati floristički sastav i strukturu šume hrasta trojanca na Gorici.