

MATEMATIKA U RAČUNARSTVU

4. domaći zadatak

1. Funkcija $f(x)$ je data tabelarno. Odrediti njen integral u granicama od 0 do 3:
 - a) primjenom pravougaonih pravila, gornjeg i donjeg
 - b) primjenom trapeznog pravila
 - c) primjenom Simpsonovog pravila.
- d) Poznato je da su vrijednosti funkcije odredene sa maksimalnom absolutnom greškom od 0.05. Odrediti kolika je maksimalna absolutna, a kolika maksimalna relativna greška učinjena računanjem integrala Simpsonovim pravilom (dio zadatka pod c). Vrijednosti x-a su tačne, to jest nema greške pri njihovom određivanju.

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
f(x)	1.1	1.2	2.3	1.5	1.0	0.8	0.5

2. Funkcija $f(x)$ je data tabelarno. Izvršiti interpolaciju ove funkcije Lagranževim polinomom. Sračunati vrijednost $f(1)$.

x	-2	0	2	4
f(x)	1	2	3	4

3. Funkciju $f(x)$ čije su vrijednosti date u tabeli aproksimirati linearom funkcijom. Prikazati grafički aproksimaciju i stvarne vrijednosti funkcije.

x	-2	-1	0	1	2
f(x)	-5	-2	1	4	8

4. Za funkciju $f(x)$ iz zadatka 2 odrediti približnu vrijednost prvog i drugog izvoda u tački $x = 0$.
5. Data je funkcija $f(x)=\sin(x)+3*\cos(2x)+5*\sin(4x)-5\cos(4x)$. Odrediti period, osnovnu frekvenciju i kružnu frekvenciju funkcije f. Naći koeficijente razvoja funkcije f u kompleksni Furijeov red. Nacrtati amplitudski spektar funkcije.
6. Funkcija $f(t)$ je realna i periodična sa frekvencijom $f=1/\pi$. Poznati su koeficijenti njenog razvoja u kompleksni Furijeov red za pozitivne indekse: $F_0=1$, $F_1=2j$, $F_2=-1+j$, $F_n=0$ za $n>2$. Odrediti ostale koeficijente Furijeovog razvoja funkcije f, nacrtati amplitudski spektar funkcije i odrediti izraz koji opisuje funkciju $f(t)$ u vremenskom domenu.