

Post-hoc testovi



PREDAVANJE BR.5

Prisjetimo se...



- Ukoliko se pokaže da je ocjena sistemske (faktorske) varijanse dovoljno veća od ocjene slučajne varijanse, tako da se sistemska varijansa ne može tretirati kao posljedica djelovanja slučajnih faktora, odbacujemo nullu hipotezu što znači da se subpopulacije definisane kategorijama kategoričke varijable međusobno razliku.
- Međutim, još uvijek ne znamo koje se grupe međusobno statistički razlikuju!
- U te svrhe upotrebljavaju se naknadni testovi za višestruka poređenja, npr. Duncanov, Tuckeyev, Scheffeov itd.

Metodi višestrukih komparacija



- Tukey-ov test je zasnovan na kriterijumu T
- U slučaju kad uzorci imaju jednak broj elemenata, kriterijum T se određuje po formuli:

$$T = Q_\alpha \sqrt{\frac{V_R}{n}}$$

Q – kritična vrijednost iz tablica Tukey-evog testa

V_R – rezidualna varijansa (varijacije unutar grupa)

n – veličina pojedinačnog uzorka

Metodi višestrukih komparacija



- Tukey-ev test omogućuje simultano upoređivanje parova aritmetičkih sredina
- Koliko ima parova?

$$\frac{g(g-1)}{2}$$

- Postupak: izračunato T se poredi sa absolutnom razlikom aritmetičkih sredina uzoraka
- Ako je T manje, zaključujemo da se odgovarajuće aritmetičke sredine populacija među sobom razlikuju

Metodi višestrukih komparacija



- C.W.Dunnett (1955) – izradio tablice slične t-tablicama, ali se većim kritičnim t-vrijednostima što je broj grupa bio veći
- Bonferroni-jevim prilagođavanjem se nastoji smanjiti vrijednost α za svaki statistički test tako da ukupna greška I vrste ostane 0.05 ($\alpha_{kor} = \frac{\alpha}{n_l}$)
- Ova prilagođavanja nijesu bez mana (npr. povećava se rizik greške II vrste...)

Metodi višestrukih komparacija



- Scheffeova metoda – najviše se preporučuje jer je relativno strožija od drugih postupaka
- Za svaki par aritmetičkih sredina, izračunati

$$F = \frac{(M_a - M_b)^2}{\frac{PK_{un}(N_a + N_b)}{N_a N_b}}$$

- Iz tablica se očita granični F , kao u analizi varijanse
- Očitana granična vrijednost se pomnoži sa $(g-1)$, pa se ta nova granična vrijednost (F') upoređuje sa izračunatom
- Ako je $F < F'$ razliku smatramo statistički značajnom

Intenzitet razlika – veličina efekta



- Značajnost nam kaže da li ima ili nema razlike
- Intenzitet - kolike su razlike?
 - Da li su razlike BITNE (velike) ili ne?

1) Fišerov koeficijent (η^2)

- $0 < \eta^2 < 1$
- U kom procentu možemo uspešno predvidjeti zavisnu varijablu, ako znamo nezavisnu (kojoj grupi ispitanik pripada)
- Npr: ako $\eta^2=0.8$ znači da 80% ukupnih razlika potiče od razlika između grupa

$$\eta^2 = \frac{SK_{iz}}{SK_{tot}} = 1 - \frac{SK_{un}}{SK_{tot}}$$

Intenzitet razlika – veličina efekta



Kvadrirana omega (ω^2)

$$\omega^2 = \frac{SK_{iz} - ss_{iz} PK_{un}^2}{SK_{tot} + PK_{un}^2}$$

- uvek daje niži rezultat od η^2
- I za η^2 i za ω^2 važi:
 - do 0.05 je mali efekat
 - od 0.06 do 0.13 je srednji efekat
 - preko 0.13 je veliki efekat

Intenzitet razlika – veličina efekta



3) Koenova mera

$$f = \sqrt{\frac{\eta^2}{1 - \eta^2}}$$

- $0 < f < \infty$
- Veličina efekta se tumači:
 - mali efekat: $f < 0.25$
 - srednji efekat: $0.25 \leq f < 0.39$
 - veliki efekat: $f \geq 0.40$

Sjetimo se primjera sa prošlog časa



Pretpostavimo da nas interesuje da li postoji statistički značajna razlika u rezultatima između 3 metoda nastave statistike, odnosno da li se metodi nastave međusobno razlikuju po uticaju na uspjeh studenata. Metode nastave klasifikovane su na sljedeći način: A1-standardni način rada, A2-studentima se unaprijed daje materijal za nastavu sa odgovarajućim problemima koji se kasnije raspravljaju na času, a A3-osim dobijenog materijala, studenti imaju priliku da razrađuju primjere na računarima. Slučajnim izborom, formirane su jednake grupe od po 5 studenata. Nastavu u sva tri slučaja izvodi isti Profesor. Rezultati pismenog ispita su dati u narednoj tabeli:

Metod nastave

| A1 | A2 | A3 |
|----|----|----|
| 35 | 38 | 42 |
| 25 | 40 | 39 |
| 38 | 36 | 45 |
| 26 | 35 | 38 |
| 36 | 31 | 46 |

Primjer 1



ANOVA

uspjeh

| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| Between Groups | 253.333 | 2 | 126.667 | 6.281 | .014 |
| Within Groups | 242.000 | 12 | 20.167 | | |
| Total | 495.333 | 14 | | | |

Multiple Comparisons

Dependent Variable: uspjeh

Tukey HSD

| (I) metoda | (J) metoda | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|------------|------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| 1 | 2 | -4.000 | 2.840 | .368 | -11.58 | 3.58 |
| | 3 | -10.000* | 2.840 | .011 | -17.58 | -2.42 |
| | 2 | 4.000 | 2.840 | .368 | -3.58 | 11.58 |
| 3 | 1 | 10.000* | 2.840 | .011 | 2.42 | 17.58 |
| | 2 | 6.000 | 2.840 | .129 | -1.58 | 13.58 |

*: The mean difference is significant at the 0.05 level.

Primjer 1



$$M_1 = 32$$

$$M_2 = 36$$

$$M_3 = 42$$

$$g = 3$$

$$\frac{g(g-1)}{2} = \frac{3*2}{2} = 3$$

$$T = Q_d \sqrt{\frac{V_R}{n}} = 3,75 \sqrt{\frac{20,17}{5}} = 7,57$$

$$|M_1 - M_2| = 4 < 7,57$$

$$|M_1 - M_3| = 10 > 7,57 \quad \rightarrow \text{metode}$$

$$|M_2 - M_3| = 6 < 7,57$$

Zadatak 1



Jedan proizvođač igračaka želio je da ustanovi da li boja neke igračke utiče na njenu atraktivnost, pa je na 4 uzorka od po 10-oro djece mjerio minute koliko se pojedino dijete zadržalo u igri tom igračkom. Dobio je sljedeće rezultate:

| Crveni | Žuti | Zeleni | Plavi |
|--------------|------|--------|-------|
| 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 8 | 3 | 3 |
| 2 | 7 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 8 | 2 | 1 |
| Σy | 34 | 24 | 25 |
| Σy^2 | 156 | 300 | 79 |

Zadatak 1



$$\Sigma\Sigma y = 133 \quad \Sigma\Sigma y^2 = 603$$

$$SK_{TOT} = \Sigma\Sigma y^2 - \frac{(\Sigma\Sigma y)^2}{N} = 603 - \frac{133^2}{40} = 160,775 \quad SS=39$$

$$SK_{IZ} = \sum \frac{(\Sigma y_j)^2}{N_j} - \frac{(\Sigma\Sigma y)^2}{N} = \left(\frac{34^2}{10} + \frac{50^2}{10} + \frac{24^2}{10} + \frac{25^2}{10} \right) - \frac{133^2}{40} = 43,475 \quad SS=4-1=3$$

$$F = \frac{PK_{IZ}}{PK_{UN}} = \frac{14,492}{3,258} = 4,448 > F_t \rightarrow H_1$$

$$SK_{UN} = SK_{TOT} - SK_{IZ} = 117,3 \quad SS=40-4=36$$

$$F_{0,05;3;36} \approx 3,5$$

$$\mu^2 = \frac{43,775}{160,775} = 0,27$$

$$f = 0,61$$

$$M_1 = 3,4 \quad M_2 = 5 \quad M_3 = 2,4 \quad M_4 = 2,5$$

$$|M_1 - M_2| = 1,6 \quad |M_2 - M_3| = 2,6 \quad |M_3 - M_4| = 0,1$$

$$|M_1 - M_3| = 1 \quad |M_2 - M_4| = 2,5$$

$$|M_1 - M_4| = 0,9$$

$$Q_d = 3,79 \quad g = 4$$

$$T = Q_d \sqrt{\frac{V_R}{n}} = 3,79 \sqrt{\frac{3,258}{10}} = 2,163$$

Zadatak 1



ANOVA

Minuti

| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| Between Groups | 43.475 | 3 | 14.492 | 4.448 | .009 |
| Within Groups | 117.300 | 36 | 3.258 | | |
| Total | 160.775 | 39 | | | |

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Minuti

| | (I) Boja | (J) Boja | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|-----------|---------------|---------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| Tukey HSD | crveni slonić | žuti slonić | -1.600 | .807 | .214 | -3.77 | .57 |
| | | zeleni slonić | 1.000 | .807 | .607 | -1.17 | 3.17 |
| | | plavi slonić | .900 | .807 | .683 | -1.27 | 3.07 |
| | žuti slonić | crveni slonić | 1.600 | .807 | .214 | -.57 | 3.77 |
| | | zeleni slonić | 2.600* | .807 | .014 | .43 | 4.77 |
| | | plavi slonić | 2.500* | .807 | .019 | .33 | 4.67 |
| | zeleni slonić | crveni slonić | -1.000 | .807 | .607 | -3.17 | 1.17 |
| | | žuti slonić | -2.600* | .807 | .014 | -4.77 | -.43 |
| | | plavi slonić | -.100 | .807 | .999 | -2.27 | 2.07 |
| | plavi slonić | crveni slonić | -.900 | .807 | .683 | -3.07 | 1.27 |
| | | žuti slonić | -2.500* | .807 | .019 | -4.67 | -.33 |
| | | zeleni slonić | .100 | .807 | .999 | -2.07 | 2.27 |

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Zadatak 2



Pretpostavimo da želimo eksperimentom da utvrdimo efekte učenja engleskog jezika pomoću četiri različite nastavne metode namijenje savladavanju početnog programa ovog stranog jezika. U tu svrhu formirano je nasumičnim izborom iz iste (studentske) populacije 4 nezavisne grupe iste veličine (po 6 studenata). Članovi svake grupe učili su isti program različitim metodama. Poslije 6 mjeseci učenja, svi ispitanici su dobili test znanja. Metodom analize varjanse, utvrditi da li ima statistički značajnih razlika između bilo koje dvije mjere prosjeka. Drugim riječima, kojim se metodama učenja postiže značajno bolji prosjek znanja. Izračunati intenzitet razlika preko Fišerovog i Koenovog koeficijenta. Dati tumačenje.

Zadatak 2



| Xi1 | Xi2 | Xi3 | Xi4 | | (Xi1) ² | (Xi2) ² | (Xi3) ² | (Xi4) ² | |
|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| I | II | III | IV | | I | II | III | IV | |
| 78 | 63 | 75 | 78 | | 6084 | 3969 | 5625 | 6084 | |
| 91 | 65 | 93 | 46 | | 8281 | 4225 | 8649 | 2116 | |
| 97 | 44 | 78 | 41 | | 9409 | 1936 | 6084 | 1681 | |
| 82 | 77 | 71 | 50 | | 6724 | 5929 | 5041 | 2500 | |
| 85 | 65 | 63 | 69 | | 7225 | 4225 | 3969 | 4761 | |
| 77 | 76 | 76 | 82 | | 5929 | 5776 | 5776 | 6724 | |
| 510 | 390 | 456 | 366 | 1722 | 43652 | 26060 | 35144 | 23866 | 128722 |

Σ

Zadatak 2



$$SK_{TOT} = 128722 - \frac{1722^2}{24} = 5168,5$$

SS=24-1=23

$$SK_{IZ} = \left(\frac{510^2}{6} + \frac{390^2}{6} + \frac{456^2}{6} + \frac{366^2}{6} \right) - \frac{1722^2}{24} = 2128,5$$

SS=4-1=3

$$SK_{UN} = 3040$$

SS=24-4=20

$$F = \frac{PK_{IZ}}{PK_{UN}} = \frac{709,500}{152,00} = 4,668$$

$$F_{0,05;3;20} = 3,86 \rightarrow H_1$$

$$\mu^2 = \frac{SK_{IZ}}{SK_{TOT}} = \frac{2128,5}{5168,5} = 0,41$$

$$f = 0,70$$

$$M_1 = 85 \quad M_2 = 65 \quad M_3 = 76 \quad M_4 = 61$$

$$|M_1 - M_2| = 20$$

$$|M_2 - M_3| = 11$$

$$|M_3 - M_4| = 15$$

$$|M_1 - M_3| = 9$$

$$|M_2 - M_4| = 4$$

$$|M_1 - M_4| = 24$$

$$Q_{4,20} = 3,96$$

$$T = Q_d \sqrt{\frac{V_R}{n}} = 3,96 \sqrt{\frac{152}{6}} = 19,9$$

Zadatak 2



ANOVA

Rezultati

| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| Between Groups | 2128.500 | 3 | 709.500 | 4.668 | .012 |
| Within Groups | 3040.000 | 20 | 152.000 | | |
| Total | 5168.500 | 23 | | | |

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Rezultati

Tukey HSD

| (I) Metoda | (J) Metoda | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|------------|------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| 1 | 2 | 20.000* | 7.118 | .049 | .08 | 39.92 |
| | 3 | 9.000 | 7.118 | .595 | -10.92 | 28.92 |
| | 4 | 24.000* | 7.118 | .015 | 4.08 | 43.92 |
| 2 | 1 | -20.000* | 7.118 | .049 | -39.92 | -.08 |
| | 3 | -11.000 | 7.118 | .431 | -30.92 | 8.92 |
| | 4 | 4.000 | 7.118 | .942 | -15.92 | 23.92 |
| 3 | 1 | -9.000 | 7.118 | .595 | -28.92 | 10.92 |
| | 2 | 11.000 | 7.118 | .431 | -8.92 | 30.92 |
| | 4 | 15.000 | 7.118 | .185 | -4.92 | 34.92 |
| 4 | 1 | -24.000* | 7.118 | .015 | -43.92 | -4.08 |
| | 2 | -4.000 | 7.118 | .942 | -23.92 | 15.92 |
| | 3 | -15.000 | 7.118 | .185 | -34.92 | 4.92 |

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Measures of Association

| | Eta | Eta Squared |
|--------------------|------|-------------|
| Rezultati * Metoda | .642 | .412 |

DZ br.1




$M_1 = 16,92$ $M_2 = 17,90$ $n > 30$
 $SD_1 = 4,94$ $SD_2 = 4,21$
 $N_1 = 48$ $N_2 = 56$

$H_0: \mu_1 = \mu_2$
 $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

$$t = \frac{M_1 - M_2}{SD_{M_1-M_2}} = \frac{-0,98}{0,9} = -1,08$$

$$SD_{M_1-M_2} = \sqrt{\frac{SD_1^2}{N_1} + \frac{SD_2^2}{N_2}} = \sqrt{\frac{4,94^2}{48} + \frac{4,21^2}{56}} = \sqrt{0,81} = 0,9$$



Ne možemo odbaciti H_0 . Ove dvije grupe nemaju statistički značajno različit prosječan uspjeh na testu verbalnih sposobnosti.

DZ br.2



$$t = \frac{p_1 - p_2}{SD_{p_1-p_2}} = \frac{0,72 - 0,78}{0,06} = -1$$

$$SD_{p_1-p_2} = \sqrt{\frac{p_1 q_1}{N_1} + \frac{p_2 q_2}{N_2}} = \sqrt{\frac{0,72 * 0,28}{100} + \frac{0,78 * 0,22}{100}} = \sqrt{0,002 + 0,001} = 0,6$$

$$p_1 = \frac{72}{100} = 0,72$$

$$q_1 = 0,28$$

$$p_2 = \frac{78}{100} = 0,78$$

$$q_2 = 0,225$$

Ne možemo odbaciti H_0 . Zadatak na testu nije statistički značajno teži za djecu od devet godina u odnosu na onu od deset.